

四生丸 良方 治吐血衄血陽盛於陰血熱妄行

生荷葉

生艾葉

生栢葉

生地黄

各等分

右研爛丸如雞子大每服一丸水三鍾煎至一鍾瀝過溫服

藕汁散 濟生方 治吐衄不止

生藕汁

生地黄汁

大薊汁

各三合

生蜜

半匙

右件藥汁調和令勻每服一小鍾不拘時服

雙荷散

聖惠方

治卒暴吐血

藕節

七箇

荷葉頂

七箇

右同蜜搗細水二鍾煎八分去滓溫服或研末蜜調下

枇杷葉散

治暑毒攻心嘔吐鮮血

方見中暑

○已上數方治內實吐血之劑

小建中湯

桂枝

甘草炙三錢

大棗三箇白芍六錢

生姜一錢

阿膠

炒一合

右咬咀水煎

荊芥散

荊芥穗

半兩

甘草一兩

桔梗二兩

右咬咀姜煎食後服

大阿膠丸

和劑方

治肺虛客熱咳嗽咽乾多唾涎沫或有鮮血

勞傷肺胃吐血嘔血並皆治之

麥門冬

去心半兩

茯苓

栢子仁

百部根

杜仲炒

丹參

貝母

防風

各五錢

遠志

人參

各二錢五分

茯苓

乾山藥

熟地黃

阿膠

五味子

各一兩

右為末煉蜜九如彈子大每服一丸水煎六分和杏服

必勝散

和劑方治男子婦人血妄流溢或吐或咳衄血

小薊

并根

人參

蒲黃

當歸

去芦

熟地黃

川芎

烏梅

去核各一兩

右咬咀每服四錢水一鍾煎七分溫服不拘時

龍腦雞蘇元

治膈熱咳嗽或吐血衄

見火類

茯苓補心湯

治心虛為邪氣所傷吐血

見咳血

是齋白朮散

簡易方

治積熱吐血咳血若因飲食過度負重有

傷脾胃而吐血者最宜服之惟忌食熱麪煎燂一切發風之物

白朮

二兩

人參

去芦

白茯苓

去皮

黃芪

蜜浸各一兩

山藥

百合

去心各半

甘草

炙半

柴胡

前胡

各二升半

右吹咀每服三錢水一鍾姜三片棗一枚煎六分溫服。

歸脾湯 治思慮傷脾不能統攝心血以致反行或吐血下血

見健忘

天門冬湯 濟生方治思慮傷心吐血衄血

遠志

去心甘草水煮

白芍藥

天門冬

去心

麥門冬

去黃芪去芦

藕節

阿膠

蛤粉炒

沒藥

當歸

生地黄

各一升

人參

甘草

炙各五升

右吹咀每服四錢水一鍾姜五片煎六分不拘時溫服。

加味理中湯

乾姜

炮

人參

白朮

各二兩

甘草

葛根

各五升

右吹咀每服三錢水一鍾煎七分溫服不拘時

麥門冬飲子 按粹方治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐

人參五斤五味子五斤紫苑半斤黃芪一斤芍藥

甘草各五斤當歸身各五斤麥門冬各五斤

右吹咀作二服水煎食後服之

團參丸治吐血咳嗽服涼藥不得者

人參黃耆飛羅麩各一兩百合五斤

右為末滴水為丸如梧子大每服三十九茅根湯下

辰膠散經驗方治大人小兒吐血

阿膠炒蛤粉各一兩辰砂少許

右為末鷓節搗汁和蜜調下食後服

側栢散 治內損吐血下血因酒太過勞傷於內血氣妄行其
出如湧泉口鼻皆流須臾不救服此即安又治男子婦人九
竅出血

側栢葉

一兩五
不蒸乾

人參

去蘆一兩

荆芥穗

一兩燒灰

右為末每服三錢人飛羅麩三錢拌和汲水調粘相似啜服
一方一治吐血

用生地黃五斤搗汁生蜜二斤半以瓦錫器盛貯於鍋內重
湯桑柴火煮三日三夜取出入人參末四兩茯苓末六兩令
勻不拘時候以熱湯點服一名瓊玉膏

一方

栢葉一握乾姜三片阿膠二挺炙水二鍾煎至一鍾去渣

頓服。

芩薊湯濟生方治一切失血過多眩暈不甦。

芩薊

當歸

盧酒湯各等分

右父咀每服四錢水二鍾半煎至七分溫服不拘時

四物湯

見補損

治失血過多加栢葉煎服

埋中湯

見中寒

蘓子降氣湯

見痰

○已上諸方治內虛吐血之劑。

一方治酒色傷心肺口鼻俱出血。

用荊芥燒灰置地上出火毒為末每服三錢陳米湯下。

一方治大人吐血及傷酒食醉飽低頭掬重損傷吐血至多。

汗血妄行。口鼻血出。但聲未失者。投之無不効。

百草霜

即鍋底上黑灰。外人家者妙。

右為末。每服三錢。米飲調下。或井花水調下。三服即愈。若鼻衄。用一捻吹入鼻中。立効。

一方 治吐血。○皮肉破處。及灸瘡出血。百般用藥不止。搽半錢。或字立止。

一方 用好墨為末。每服二錢。以白湯化阿膠清調服。

一方

用血餘燒灰為末。每服三錢。冷水調下。

○如鼻衄。以竹管吹入鼻中。即止。

一方 治吐血咯血。

用藕節搗汁飲之。

方

用栢葉瓦上焙乾爲末每服三錢食後米飲調下。

方

用大黃末每服一錢以生地黃汁一合水半鍾煎四五沸溫服卽愈。

方

治飲酒過多蘊熱胸膈以致吐血衄血。

葛花

二兩

黃連

四兩

右爲末以大黃末熬膏子丸如梧桐大每服一百丸溫湯下或煎服亦可。吐衄症若脈滑數難治。

○已上諸方止血涼血之劑。

○廣按氣

屬陽喜動者也屬陰喜靜者也

若夫動靜有常則氣血調均陰

陽和順何病之有哉今也六淫侵于外七情戕于內動過

於靜陽勝乎陰則氣有餘而血不足也丹溪曰氣有餘便

是火火性急暴燔灼經絡則血沸騰而錯經妄行為咳血

嘔血咯血衄血溺血下血之所由也况血為氣之依附若

是血敗散枯涸則氣失依附而發越矣不死何待可不畏

哉治療大法以苦甘寒藥散火涼血為君以辛味藥開鬱

利氣為臣以升提藥俾復其位為佐使或以酸澁藥止塞

其源或以甘溫藥收補其後如此病之不愈者未之有也

又按丹溪正法吐血條已兼咳嘔咯衄四者附方嘔血衄

血宜用

咳血 四十五

丹溪心法

○咳血 火升 痰盛 身熱多是血虛四物湯加減用

戴云咳血者嗽出痰內有血者是嘔血者嘔全血者是咯血者每咳出皆是血瘀癆衄血者鼻中出血也溺血者小便出血也下血者大便出血也雖有名色分六俱是熱証但有虛實新舊之不同或妄言爲寒者誤也

入方

青黛

瓜蒌仁

訶子

海粉

山梔

咳血

石爲末以蜜同姜汁凡噙化效甚者加杏仁去皮尖後以八

物湯加減調理

附諸方

黃芪散 治咳成勞

甘草 四錢

黃芪

麥門冬

熟棗

桔梗

白芍 各五錢

右咬咀每服五錢水煎

茯苓補心湯

三因湯

治心氣虛耗不能藏血以致面色黃瘁五

心煩熱咳嗽唾血

及婦人懷妊惡阻嘔吐亦宜治之

半夏

湯泡七次

前胡

白茯苓

人參

各七錢五分

紫蘇

枳殼

麸炒

桔梗

甘草

乾薑

陳皮

各五錢

當歸

一兩二錢

熟地黄

一兩五錢

白芍藥

二兩

川芎

七錢五分

風邪咳血

右呖咀每服四錢水一鍾姜三片棗一枚煎七分食後溫服

鷄蘇丸

抄粹方

治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血衄血

鷄蘇葉

八兩即金平薄荷

黃耆

防風

荊芥

各一兩

桔梗

川芎

甘草

菊花

生芩

各半兩

片腦

五分

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸用麥門冬去心煎湯送下又治肺損吐血日漸乏力衰弱行步不得促嗽痰涎飲食不美或發寒熱小便赤澀加車前子三錢用桑枝剉炒香煎湯嚼下

經効阿膠丸

濟生方

治嗽血唾血

當歸地黃湯

宣明方

治嗽血衄血大小便血或婦人經候不調

月水過多喘嗽

並見癆瘵

人參芎歸湯

直指方

治溫勞少血津液內耗心火炎燥熱乘肺

金咳嗽咯血及血不榮肌肉動輒毛寒咳嗽

當歸

川芎

白芍藥

各五

人參

半夏

製

橘紅

阿膠

炒

赤茯苓

細辛

北五味

甘草

炙各二錢五分

右吹咀每服八錢水二鍾姜三片煎一鍾食後溫服

一方治咳嗽

用新綿燒灰半錢食後好酒調服

一方

用栝葉瓦上焙乾為末每服三錢食後米飲調下

嘔血 四十六

丹溪心法

○嘔血火載血上錯經妄行。脉大發熱喉中痛者是氣虛用
參芪蜜炙黃栢荆芥當歸生地黃用之。嘔血用韭汁童便姜
汁磨鬱金同飲之其血自清。火載血上錯經妄行用四物湯
加炒山梔童便姜汁服。又方山茶花童便姜汁酒服。又鬱
金末治吐血入姜汁童便良。又一方用韭汁童便二物合用
鬱金細研和服。又方治吐血或衄血上行用鬱金如無用山
茶花代姜汁童便和好酒調服即止。後以犀角地黃湯加鬱金
怒氣逆甚則嘔血暴痺內逆肝肺相搏血溢鼻口但怒氣致
血証者則暴甚故經曰抑怒以全陰者是也。否則五志之火動

嘔血

甚火載血上錯經妄行也用柴胡黃連黃芩黃芪地骨生熟苳
白芍以水煎服虛者以保命生地黄散再加天門枸杞甘草等
分水煎服

附諸方

一方治嘔血

黃栢案灸

右搗為末煎麥門冬湯調二錢匕立瘥

聖惠方治嘔血

側柏葉或晒乾或陰乾或瓦焙乾

右為末不計時以米飲調下一錢匕下

保命生地黄散治諸見血無寒吐血衄血下血弱血

生地黄 熟地黄 枸杞子 地骨皮 天門冬去心

縉黃耆 白芍藥 甘草炙 黃芩各等分

右吹咀每服一兩水三鍾煎至一鍾去滓食前通口服脉微

身涼加減每一兩加官桂五分

大薊散濟生方治飲啖辛熱傷於肺經嘔血出血名曰肺疸

大薊根洗 犀角鎊 升麻 桑白皮炙 蒲黃炒

杏仁去皮尖各一兩 甘草炙五 桔梗炒一兩

右吹咀每服四錢水一鍾姜五片煎至八分溫服不拘時

戊集

咯血 四十七 附痰涎血

丹溪心法