

千金翼方



千金翼方卷第二十四 瘡癰

宋明奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

明翰林院檢討國史纂修官王肯堂重校

內閣撰文中書舍人加四級金蘭華布閱校刻

癰疽發背第一

疔濕第六 蟲附

鼠瘻第二

腸痔第七 脫肛附

癰疽第三

疥癬第八 漏瘡附

惡核第四

代指第九

丹疹第五

濕熱瘡第十 惡瘡反花瘡禿瘡附

癰疽發背第一



凡發背及癰疽腫已潰未潰方

取香豉三升少與水和熟搗成羅泥俵腫作餅子厚三
上有孔勿覆孔上布鼓餅以艾列其上炙之使溫溫熱
勿令破肉也如熱痛急易之癰疽當便減快得安或一日
度炙之若先有瘡孔孔中汁出即差

癰腫發背腫并諸毒腫方

榆白皮

栝樓

婦人月布洗取汁

貨鼠土

各半兩并金鼠土

右五味搗和作泥封之一日漸消五

日全差若壞封四畔差

有癰腫無聊賴發背及癰癰已疼痛方

蒸糜穀更透熨之即愈

一云蕎薇殼更炙熨之

癰疽發腹背陰隱處通身有數十癰方

取牛糞乾者燒末以雞子白和塗乾則易差正

又方

以牡蠣粉大醋和塗即愈

占斯散主消腫癰疽消膿方

末占斯人參乾薑

一云乾薑地黃

桂心細辛厚朴敗醬

防風桔梗枳椇甘草

各一兩

右一十一味搗篩為散酒服方寸匕藥入咽覺藥流入瘡中

若癰疽灸之不能發膿者可服之瘡未壞者去敗醬已發膿



南京中医药大学图书馆版权所有

內敗醬服藥日七夜二以多為善若病在下當膿血出此
為腸癰也諸病在裏惟服此藥即覺其力痛者即不痛
治諸瘡及疔瘡瘡已潰便早愈醫人不知用此藥發背無
不治者惟服此耳若始覺背上有不好而渴者即勤服之
藥力往覺渴止便消散若雖已壞但日夜服之勿住佳也服
之腫自消散不覺去時欲長服者當去敗醬婦人乳癰宜選

服

一方無
杜心

腫癰潰男發背女發乳及五痔方

蝟皮

燒

蜂房

燒各
一具

蜀椒

升

乾薑

各一
兩

厚朴

二兩
半

附子

炮法

桂心

皮

當歸

續斷

續斷

藁本

藁本



地榆皮各五

右十一味搗篩為散酒服方寸匕日三加

薤七枚益良

治骨疽百方治不差方

可於瘡上以次灸之二日一夜無不愈

又方

久瘡不愈差而復發骨從孔出者名為骨疽取一死烏雌雞
淨去肉取骨熬令成灰取三家牛狗木刮取屑三家炊簞各
一兩皆別熬成灰合瘡中碎骨當出數十片愈

鼠瘻第二

論一首方一十
一首灸法參首

論曰一切癰疽皆是瘡癰根本所患癰之後膿汁不止得冷即



是鼠瘻是以漏方次之大須急救之

治鼠瘻方

馬齒草

五升切

檲白皮

一筋淡五升煮取一升澄清

麝香

半臈乾之研末

杏仁

半升油熬令黑搗如膏

右四味以簪器貯之合和以三四重

密繫口病已成瘡者以泔清煎減半洗作貼子塗藥貼著瘡

上日三易之若未作瘡如癰癰子者以艾一升熏黃如棗大

乾漆如棗大三味末之和艾作炷灸之三七壯止

治諸漏方

以新兒屎百日以來皆收置密器中五六日取塗瘡孔中



南京中醫藥大學圖書館版權所有

取鯁魚腸切作五段火上煖之先洗瘡拭乾以腸貼之冷即
易之從旦至夜乾止覺癢開看蟲出即差

又方

取雞子三顆米下蒸半日出取黃熬令黑先拭瘡汗令乾以
藥肉瘡孔中不過三度

又方

以臘月豬脂以紙維結取內瘡孔中日五度夜三度

風漏及鼠漏方

赤小豆 白斂 牡蠣 黃耆

右四味等分擣篩為散酒服方寸匕日三

蟻漏方

取陵鯉甲貳拾枚燒為末豬膏和傅

又方

取半夏一枚屑之以鴨膏和傅之

漏方

鍛落鐵屑 狗頰車連齒骨

炙

虎糞

鹿角甲半取毛

各三兩干

金云鹿皮合毛燒為灰

右四味搗篩為散以豬膏和內瘡孔中須臾

易之日五六度

治鼠漏方

死鼠

一枚中形者

亂髮

一雞子大

右二味以臘月豬膏纔得沒之微

火煎之鼠髮消盡膏成以塗瘡上又以酒服半分許鼠從
中出

寒熱瘰癧方

連翹 黃連 苦參 栝樓 土瓜根 芍藥 恆山 各一兩

龍膽 二兩 狸頭骨 一枚 炙

右九味搗篩為散酒服五分七日三 千金無 狸骨

治身體瘰癧及常有細瘡又口中有瘡薔薇丸方

薔薇根 兩 黃蘗 黃耆 黃芩 芍藥 苦參 白欬

栝樓 防風 龍膽 鼠李根皮 石龍芮 各二兩

梔子仁 兩 右一十三味搗篩為末鍊蜜和丸如梧子飲服

十五丸日三

千金無黃葉

頸漏

搗生商陸根作餅子如大錢厚三分貼漏上以艾炙之熱則易之可灸三四升艾便差

一法

葶藶子

二合一升

右二味搗大爛熟作餅之如上以一餅子

當孔上貼以艾炷如小指大灸上三壯一易三餅九炷日三

隔三日一灸

一法

凡是瘰癧有結核作癰癰者以獨頭蒜去兩頭足之如前法



南京中医药大学图书馆版权所有

日炙三度差

一法

七月七日未出時採麻花五月五日取艾等分合作

漏上百莊

治癰方

馬齒草

陰乾

臘月淳麻燭燼

右二味等分搗細篩以臘月豬

脂和之先以煖泔清洗瘡拭乾塗之

又方

解木皮一尺闊六寸去黑皮細切以水一斗煮取去五升去滓內白糖十挺煎取一升分三服以銅器中貯之若吐吐著



北京中医药大学图书馆版权所有

器中看之

人參散主寒熱瘰癧在頸脉下如杏李方

人參 乾薑 白芷 甘草 各一兩

右四味搗篩爲散

飲服方寸七日三少小半七以意增減

又方

狸骨 五分 烏頭 十分炮 黃蘗 一兩

右三味搗篩爲散先食酒服一錢七日三

又方

連翹 黃連 芍藥 苦參 土瓜根 龍膽 當歸 各半兩

右七味搗篩爲散先食以溫酒服錢五七日三稍加至方寸



北京中醫藥大學圖書館版權所有

七千金無當歸有枯
蔓恆山為八味

又方

取桃枝上不落子擣末以大醋和傳之

鼠乳方

常思根拭去土勿洗以附本繫之一日一夜便斷消

療疽第三

方八首

療疽秘方世所不傳神良無比

千金分兩異

升麻

乾地黄

枳實

各三兩

大黃

三兩半

前胡

三分

犀角

一兩半

麝香

射干

甘草

炙各半兩

右九味以水九升煮取三升分三服以差為度不限劑數

豬蹄湯主療疽諸疽十指

赤痛癢已潰方



南京中医药大学图书馆版权所有

豬蹄

一具治如食去

白芷

芎藭

黃芩

細辛

當歸

藁本

藜蘆

炙一
本無

莽草

甘草

各一兩

右一十二味以水三斗煮豬蹄取

斗去蹄肉諸藥煎取五升洗潰瘡

損湯主癰疽潰爛欲作未成或如桃李核或如雞子赤炊方

黃芩

黃連

大黃

當歸

芒硝

甘草

右六味以水六升煮取三升去滓還鑊中內芒硝一沸貼布

帛中以棉腫上數百遍

癰疽浸淫多日漸大方

胡粉

一分

黃連

蘭茹

甘草

各二兩



南京中醫藥大學圖書館版權所有

右四味搗篩爲散以粉瘡上日三

瘰癧著手足肩背累累如米起色白刮之汁出愈而復發

黃耆

半兩

欬冬花

升麻

各一兩

赤小豆

附子

炮去皮

苦參

各一分

右六味搗篩爲散酒服半錢七稍增至一錢七日三服

又方

取虎矢白者以馬矢和之暴乾燒灰以粉之

又方

千金分
兩異

龍骨

胡粉

燒

滑石

各三分

青本香

二兩

右四味搗篩爲散以米粉一升和之稍稍粉之日四五

瘰癧方



南京中医药大学图书馆版权所有

竈室塵

竈突中墨

竈釜下土

各一升

右三味以水九升煮三沸取汁以洗瘡日三四度

惡核第四

論一首方
一十三首

論曰凡惡核似被射工毒初得無定處多惻惻然痛時有不痛者不痛不憂不憂則救遲救遲則殺人是以宜早防之此尤忌牛肉雞豬魚驢馬等肉初如粟或如麻子在肉裏而堅似炮長甚速初得多惡寒須更即短氣取茱萸五合作末水一升和之絞取汁頓服之以滓傳之須臾更服此汁令毒氣散不入腹入腹則致禍切慎之

江南毒氣惡核射工中人暴腫生瘡五香散方

