

亥 23

1

共 4 册

王旭高醫書六種

上海千頃堂書局印



513
038

吳縣陸晉笙訂正
無錫周小農錄校

王旭高醫書六種

上海
馬路
三
千頃堂書局印行



南京中醫藥大學圖書館藏
88字圖書1885

退思集類方歌註

醫方證治彙編歌訣

增訂醫方歌訣

醫方歌括

薛氏濕熱論歌訣

西溪書屋夜話錄



王旭高先生類方歌註序

退思集類方歌註醫方證治彙編歌訣二書吾邑王旭高先生所著也先生名泰林字旭高晚號退思居士江陰柳寶貽嘗選刊先生醫案稱先生讀書上自軒岐下迄國朝諸家無不精心灌注於古書則研求古訓於後人書則必分別疑似所著有西溪書屋夜話錄醫方歌訣串解環溪草堂醫案諸書均未梓行云今醫案經方君耕霞柳君穀孫選刊流行於世其餘數書屢求不得民國五年冬華君松巖惠余稿本一束云已藏弃多年先是東房橋有先生之門人年老忽發狂易以鈔錄各書沉之水中華君僅撈得方歌二種殘缺不完余不諳詩韻乃郵寄魯省陸君晉笙處託為補正據謂首尾尚幸完善僅少梳子豉湯前一頁即照傷寒金匱方補之詳閱退思集類方本徐靈胎氏傷寒類方化裁編輯以金匱方後人方附麗之分為二十四類其醫方歌訣亦本蘭臺軌範通治方而作故所註多遵徐書而博採羣書間有先生新註及自製數方附見去取頗屬審慎註釋亦極明白余尤佩其雖一以仲聖方為宗而能集仲聖以下醫方之長

絕不拘泥一家言觀其治案可知也惟此書尚非定本故上有王先生所批此方宜入某類宜改從某註某方可刪等語又如麻黃湯類之神朮散註云此方有大無神朮散叔微神朮散俱編入平胃散類瀉心湯類之進退黃連湯註云崔氏八味丸編入腎氣丸類今無此二類梔子豉湯下註有餘義見卷四雜說云云亦經散佚又小青龍湯下註尚著有古方餘論則不止柳氏所謂三種可知年愈遠而書愈有闕惜哉惜哉乃蓄意訪求知先生故里去余家僅數十武先生裔孫某君云高祖昆季五人旭高最少享高壽無嗣故歿後無紹其業者門弟子各走一方無從追考其著述六十年來散佚無一存矣則是二書雖非全璧亦足覘王先生學問之一斑也吾鄉故老每稱良醫必舉旭公道咸之間固享大名於蘇浙者何其著述竟無存耶且此本得之沉水之餘字跡有剝落之處急謀付梓以廣流傳復以少時所錄西溪書屋夜話錄一篇醫方歌括及增訂醫方歌訣又薛氏濕熱論歌訣各一卷均是先生所編著者合為一冊洵屬醫學家之要書不可再使抱殘守缺湮沒不彰此付刊之舉不容或緩者已

民國十年冬月

無錫周鎮小農別署伯華謹識於惜分陰軒

退思集類方歌註序

近來醫家北方尚多用仲景方而動輒得咎南方竟謂古方不宜於今實則莫名其妙畏縮而不敢用此非仲景方之不善乃不善用其方斯覺不善耳觀王君斯編以仲聖祖方為主以後賢化裁而出之方為輔歸類編歌便於誦記并於每方註明宜忌加減照此用之自然絲絲入扣恰合病情是編計分二十四類散帙一束周君小農珍藏之本寄來囑為整理殘闕校閱訛字披誦之下想見王君伏案功深於此道真三折肱矣如或付梓其餉遺於後學豈淺鮮哉

中華民國九年午月吳縣陸錦燧識

退思集類方歌註目錄

麻黃湯類

一麻黃湯

二麻黃加朮湯

三麻黃杏仁甘

草石

四麻黃杏仁薏

草甘

五越脾湯

六越脾加朮湯

七越脾加半夏湯

八大青龍湯

九小青龍湯

十小青龍加石膏湯

十一甘草麻黃湯

十二麻黃附子湯

十三麻黃附子細辛湯

十四麻黃連翹赤

湯小豆

十五麻黃升麻湯

十六厚朴麻黃湯

附一心欬湯

旭高

十七射干麻黃湯

十八古今錄驗續命湯

附二千金續命湯

附一定喘湯

附張元九味羌活湯

附五潔大羌活湯

附藏神朮散

附方局神朮散

附八衛生家寶神白散

附後葱豉湯

附垣麻黃人參芍

附二節再造散

附景岳麻桂飲

望岳大溫中飲

桂枝湯類



北京中醫藥大學圖書館藏

一桂枝湯

二桂枝加桂湯

三桂枝加芍藥湯

四桂枝加大黃湯

五桂枝加附子湯

六桂枝加黃芪湯

七黃芪桂枝五物湯

八桂枝加厚朴杏仁湯

九桂枝去桂加苓芍藥湯

十桂枝加芍藥生薑人參新加湯

十一桂枝加葛根湯

十二桂枝去芍藥湯

十三桂枝去芍藥加附子湯

十四桂枝加芍藥湯

十五桂枝甘草湯

十六半夏湯及散

十七芍藥甘草湯

十八芍藥甘草附子湯

十九桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

二十桂枝甘草龍骨牡蠣湯

二十一桂枝龍骨牡蠣湯

二十二建中湯互見通治方

二十三黃芪建中湯互見通治方

附千金當歸建中湯互見

二十四桂枝芍藥知母湯

附二地高桂枝黃芪鼈甲湯新製

桂麻各半湯類

一桂枝麻黃各半湯

二桂枝二麻黃一湯

三桂枝二越脾一湯

四桂枝去芍藥加麻附細辛湯

五柴胡桂枝湯

葛根湯類

一葛根湯

二葛根加半夏湯

三葛根黃芩黃連湯



附二節柴葛解肌湯

附二陽仲升麻葛根湯

附三景岳歸葛飲

瓜蒂散類

瓜蒂散

附二和三聖散

附二綱目參蘆散

附三錢燒鹽探吐方

附四丹溪倒倉法

附五外臺霹靂散

附二嚴用稀涎散

附三通關散

附二和甘草常山散

附一聖散

附三王晉吐蠱散

附二景岳吐法

梔子湯類

一梔子豉湯

二梔子生薑豉湯

三梔子甘草豉湯

四梔子乾薑湯

五梔子厚朴枳實湯

六枳實梔子豉湯

七梔子大黃湯

八梔子栝皮湯

附一豉薤湯

附二叔微越桃散

白虎湯類

一白虎湯

二白虎加人參湯

三白虎加桂枝湯

附一陳蒼朮白虎湯

四竹葉石膏湯
互見通治方

附一瀉黃散



北京中醫藥大學圖書館藏

附三景玉女煎互見通治方

承氣湯類

一天承氣湯

附二河間當歸承氣湯

六抵當湯及丸

八大陷胸丸

士附子瀉心湯

附三陳氏百勞丸

附五本溫脾湯

附和子木香檳榔丸

附聖轉舌膏

十棗湯類

一十棗湯

備急丸類

二小承氣湯

四大黃甘草湯

附代抵當丸

九麻仁丸互見通治方

士大黃附子湯

士大黃牡丹湯

附五千金溫脾湯

附聖垣枳實導滯丸

附聖河間防風通聖散

附二河間三花神佑丸

三調胃承氣湯

五桃仁承氣湯

七大陷胸湯

十大黃黃連瀉心湯

士大黃蟬蟲丸

附四節菴黃龍湯

附七聖濟檳榔丸

附十局涼膈散

附三固控涎丹



一 備急丸

二 三物白散

附 方 感應丸

附 二 景 岳 太平丸

柴胡湯類

二 小柴胡湯

二 柴胡加芒硝湯

三 柴胡加龍骨牡蠣湯

四 柴胡桂枝乾薑湯

五 柴胡去半夏加栝樓根湯

六 四逆散

七 大柴胡湯

附 二 和柴胡飲子

附 古 清鎮丸

附 三 景 岳 一柴胡飲

附 四 景 岳 二柴胡飲

附 五 景 岳 三柴胡飲

附 六 景 岳 四柴胡飲

附 七 景 岳 五柴胡飲

附 生 濟 清脾飲

瀉心湯類

一 半夏瀉心湯

二 生薑瀉心湯

三 甘草瀉心湯

四 乾薑黃連參黃芩人參湯

五 黃連湯

附 二 進退黃連湯

附 二 丹 溪 左金丸

附 三 氏 汪 左金加陳米湯

附 四 戊 巳 丸

附 五 連 附 六 一 丸

附 六 氏 指 香連丸

附 七 治痢四神丸

附 八 治噤口痢方

附 九 明 宣 斷下丸

六 小陷胸湯



七厚朴生薑甘草半夏人參湯

〔八〕旋覆代赭湯

黃芩湯類

一黃芩湯

〔二〕黃芩加半夏生湯薑

〔附二機要〕黃芩芍藥湯

〔附三機要〕白朮芍藥湯

〔附三潔古〕芍藥湯

〔附四河間〕導滯湯

〔附五姜氏〕東風散

〔附〕治痢奇方

五苓散類

一五苓散

〔附〕辰砂五苓散

〔附〕蒼朮五苓散

二茵陳五苓散

〔附三〕春澤湯

〔三〕豬苓湯

四茯苓甘草湯

〔五〕茯苓桂枝甘草大棗湯

〔六〕苓桂朮甘湯

〔附五河間〕桂苓甘露飲

〔附五和〕桂苓甘露飲

〔附五河間〕六一散

〔附〕清六散

〔附八〕溫六散

〔附九〕三生益元散

〔附〕大橘皮湯

理中湯類

一理中湯

〔二〕桂枝人參湯

〔三〕桂枝附子湯



四朮附湯

五甘草附子湯

六甘草薑朮湯

七甘草乾薑湯

八吳茱萸湯

九附子粳米湯

十大建中湯

附二聖濟吳茱萸湯

附二局方連理湯

附三功佳行枳實理中丸

附四東垣治中湯

附五景岳理陰煎

附景岳六味回陽飲

四逆湯類

一四逆湯

二通脈四逆湯

三通脈四逆加豬膽汁湯

四四逆加人參湯

五茯苓四逆湯

六白通湯

七白通加人參汁湯尿豬膽

八當歸四逆湯

九當歸四逆加吳茱萸湯

十乾薑附子湯

十一真武湯

十二附子湯

附二潔古漿水散

附二卷節回陽返本湯

附二氏喻附薑附白通湯

附二氏喻附薑湯

附二氏喻附薑歸桂湯

附二氏喻附薑歸桂參湯

附二氏喻辛溫平補湯

附二氏喻甘寒補氣湯

附二活人益元散

附二卷節回陽救急湯

附二景岳四維散



北京中醫藥大學圖書館藏

烏頭湯類

一烏頭湯

二天烏頭煎

三烏頭赤石脂丸

瓜蒌薤白湯類

一瓜蒌薤白白酒湯

二瓜蒌薤白半夏湯

三枳實薤白桂枝湯

當歸羊肉湯類

一當歸生薑羊肉湯

附二千金當歸羊肉湯

附二韓祇和羊肉湯

附三天真丸

附四養老書

羊肉粥見通治方

防己湯類

一防己茯苓湯

二防己黃芪湯

三木防己湯

四防己椒目葶藶丸

五防己地黃湯

附二陳防己飲

甘桔湯類

一甘桔湯

附二紫苑湯

二排膿散

三排膿湯

附二蘇頌甘草黑豆湯

百合湯類



一百合地黄湯

二百合知母湯

三百合滑石代赭湯

四百合雞子黃湯

五百合洗方

六栝樓牡蠣散

黃連阿膠湯類

一黃連阿膠湯

附一海藏黃連阿膠湯

附二扁鵲駐車丸

炙甘草湯類

一炙甘草湯

互見通治方

附一金匱生脈散

互見通治方

附二喻氏資液救焚湯



退思集類方歌註

無錫王泰林旭高編輯

吳縣陸晉望錦燧重訂
無錫周鎮小農錄校

傷寒金匱方

後漢張仲景夫子著傷寒金匱兩書為後世醫方之祖其方治病雖千頭萬緒而條理不紊方中之藥少者僅一二味而

又無所不包括多者至二三十味而又無一味不緊切所以謂之方祖此卷所輯皆其方也間附後世數方使人從流溯源知夫鎔古之新之妙學者能於此卷諸方精思而熟讀之應變無窮矣

麻黃湯類一

一麻黃湯

治太陽病風寒在表頭項強痛身疼腰痛骨節疼痛發熱惡寒惡風無汗胸滿而喘其脈浮緊或浮數者宜此發汗若脈浮弱汗自出或尺脈微遲者俱不可服若風寒濕三氣成痺及冷風哮喘嗽最效也

麻黃

三兩桂枝二兩杏仁七十箇甘草炙一兩以水九升先煮麻黃減二

升去上沫納諸藥煮取二升半溫服八合覆取微汗不須啜粥

二麻黃加朮湯

治濕家身煩疼麻黃湯原方加白朮四兩

麻黃發汗之峻劑

監以桂草斯無弊麻黃開竅發汗性最猛烈故以桂枝

使其劫陰脫營如馭馬防其放逸

麻黃入肺杏仁入心發汗必通營與衛

耳非作聖之心何能周顧如此麻黃入肺杏仁入心發汗必通營與衛

治太陽初病必從心營肺衛立方也

一



中國醫藥大學圖書館藏

杞不須啜粥恐留滯。不須啜粥。恐留滯。黃之性也。減去大棗與生薑。恐礙杏麻升降制。

仲景發汗方中。每加薑棗。此不用者。以生薑橫散解肌。礙麻黃之上升。大棗緩中膩膈。礙杏仁之下降。故耳。其精切又如此。要知麻桂

性辛溫。仲景原為風寒製。無論傷寒與中風。衛實麻黃表虛桂。衛實。麻黃。表虛。桂。治

湯治表虛。在有汗無汗。後人妄用治溫暑。無怪下咽人即斃。方。麻黃桂枝二

上分。不在風寒上分也。即病之正傷寒。而設後人誤以傷寒初病在太陽。頭項強痛。此經系。

之治溫暑。無怪乎下咽即斃也。傷寒初病在太陽。頭項強痛。此經系。

為太陽。經的症。發熱惡寒無汗喘。脈浮而緊。麻黃諦。以上為麻黃湯的症。要訣。麻

惡寒。甘草和諸藥。無一寸關浮弱。表虛。尺遲微。裏誤汗亡陽禍不細。若浮

遲之脈。誤用麻黃。三氣成痺。用亦靈。風寒濕三氣成痺。非麻桂溫通關節。

必召亡陽之禍。冷風哮喘還堪濟。冷風哮喘。由風寒客於背俞。屢止屢作。用此散。

黃加朮湯。濕家身體煩疼。諸。濕外感者。陽必寒濕在表。汗之宜。麻朮相須。

功益。擗。麻黃得朮。自不至於過汗。求得麻黃。併可發散。方中白朮加海藏。

神求從此例。發散方中。加白朮。潔古謂之開鬼門。王海藏安常辨論頗精。

明。王安常著。潮洄集。活人加減休拘泥。朱肱活人書。載夏至後用麻黃湯。

辨傷寒溫熱甚悉。暑濕何見之。不明。可見此乃傷寒第一方。讀書勿被書瞞蔽。書須識正旨。眼