

長樂陳修園

冬拾捌本

時方妙用

瘰癧 瘰癧
眩暈 泄瀉
眼目 鶴膝風

五淋癰閉 遺精 赤白濁 自汗盜汗

耳聾 脚氣

嘔吐噦呃怔忡 婦人科 婦人雜病

傷寒

疝氣 積聚

延陵吉置

時方妙用卷三

雷氏疏陳念祖修圖

男

元罪道然靈石

全校字

癰癰

普明子曰癰癰者肝病也肝主筋肝經血燥有火則筋急而生癰癰多生於耳前後者膽之部位膽與肝相表裏其初起卽宜消癰丸消散之不可用刀針及敷潰爛之藥若病久已經潰爛者外貼普救萬全膏內服消癰丸並消遙散自無不愈更宜戒惱怒斷煎

妙及發氣開氣諸物免致膿血淋漓。漸成虛損。患此者。可毋戒歟。

雞消癰丸

此方奇效。治愈者不可勝計。予亦刻

方。曾送矣。

元參蒸牡蠣煅

貝母

去心

共爲末。煉蜜爲丸。每服二錢。開水下。日二服。

愚按。曹明著醫心悟一書。遂未亡本。用之鮮效。唯

此丸平。神奇。當其實之。但耳前後爲少陽部。

立。渠云用之部位者。

誤也。故改正之。

眩暈

內經云上。眩。又云腎虛則高搖髓海不足則腦
轉耳鳴皆指不足而言仲景論眩以痰飲爲先丹溪
宗河間之說亦謂無痰不眩無火不暈皆指有餘而
言前聖後賢何其相反至此不知此症不離於肝經
云諸風掉眩皆屬於肝此風非外來之風指厥陰風
木而言厥陰風木與少陽相火同居厥陰氣逆則風
生而火發故河間以風火立論也風生必挾木勢而
尅土上病則聚液而成痰故仲景以痰飲立論丹溪

以痰火立論也。然一身聚邪之處，卽爲偏虛之處。頭爲諸陽之會，相火得以逆行上僭者，非上焦之虛，而何腎爲肝母，腎王藏精，精虛則髓海空而頭重。故內經以上虛及腎虛髓海不足立論也。言虛者言其病根，言實者言其病象，其實一以貫之也。

脈數熱多

脈滿血少

弦爲肝風

滑實痰積

虛小氣虛

大爲病進

眩暈脈

弦熱或寒熱往來宜

消遙散加半夏天麻

鈎藤主之

四十

眩暈脈數或滑實大小便閉胸脇作痛耳聾耳鳴
多怒肝經實火宜

當歸蘆薈丸○此法從喻嘉言寓意草醫吳涿官
之母一案得來

一眩暈脈濇及精氣不足欲勞其上必泄其根宜

六未地黃湯倍地黃去丹皮澤瀉加細辛炙甘草
各一錢川芎二錢枸杞子三錢肉蓯蓉三錢半水

煎服

四十

一脈虛細弱小是氣虛宜

補中益氣湯加天麻半夏釣藤五

一脈弦而滑眩暈而嘔逆爲痰飲宜澤天小麻白朮
二錢水煎服或用二陳湯加天麻合此二味

一實火眩暈不可當宜大黃酒炒三遍研末茶調下
二三錢

一虛眩諸藥不效宜鹿茸五錢酒煎去滓入麝香少
許服綠鹿茸生於頭以類相從也

一眩暈虛諸藥不效及虛人愈後調理俱宜

正元丹仁

桂附八未九五

眼目

眼目一症。古有五輪八廓及七十二症之辨。其實不足憑也。業是科者庸妄固無論已。而高明之士於實症則曰風曰火。於虛症則曰肝血少。曰腎水衰。言之親切有味。而施治則無毫少效。且以增病。余歷數交遊。凡目痛者無不因醫而致瞽。即有一二倖免者。原爲輕淺之病。卽不服藥亦愈。於醫固無與也。蓋此症除風火赤目外。阻等症外。而一切目視無光及昏黑倦視等症。皆爲陽虛。心肺爲上焦之陽。心屬火。火能

燭物肺屬金。金能鑑物。二臟之陽不宜。則火不能燭。金不能鑑。醫者不知。以補血之藥滋肝。以補水之藥滋腎。下焦之陰愈盛。則上焦之陽愈虛。且令下焦陰氣上加於天。白晝如夜。燭火有光。陰雲四合。龍雷飛騰。原欲滋陰以降火。其實滋陰以助火。火盛則遂增出赤腫紅絲。勞內羞明。諸火象漸成癰疾矣。子非耑業此道。不敢多言。請向醫者而詢其所服何藥。所點何藥。使得前車之鑒。今於眼科所未載。外搜出數方。以救逐流之弊。

水能制火也

耳聾

腎開竅於耳。固也。而腎脈却不能上頭。腎與心交。假道於心之膈。以上耳中之穴曰聽宮。小腸之經脈貫之。爲司聽之神。所以腎虛其形如珠。皮膜包裹真水。若真水破其耳立聾。有爲大聲所振而聾者。皮膜破也。或聾或不聾者。心腎不交也。宜磁硃丸交媾水火。有先耳鳴而後聾者。腎虛不能閉藏。陰氣室塞於陽竅也。宜六味丸去丹皮。重加磁石。再加五味子。龜板膠爲丸。令陰氣自盛於本宮。不觸於陽竅。若感冒暴

豐經不外少陽一經足少陽膽脈達耳輪手少陽三焦脈入於耳邪氣壅實聽宮爲其所掩宜消遙散去白朮加黃芩半夏生薑玉竹大棗主之如風火交煽宜防風通聖散肝火熾盛宜蘆薈當歸丸尺脈弱者宜桂附地黃丸尺脈數者宜大補陰丸二丸俱加磁石菖蒲茯苓之類神而明之存乎其人非可以不傳昔

浮大爲風 洪數爲火 洪大而實爲風火 尺數爲陰火 遲濡爲腎虛

疝氣

疝者小腹墜。凡爲腫爲痛是也。其名有七。曰寒疝。囊冷結硬如石。陰莖不舉。或控墜。久而痛。曰水疝。腎囊腫痛。陰汗時出。或腫狀如水晶。或囊痒而搔出黃水。曰筋疝。陰經腫脹。或潰。或膿。或重。急筋縮。或出白物。曰血疝。狀如黃瓜。在小腹兩旁橫骨兩端。約中。俗云便癰。曰氣疝。上連腎。區下及陰囊。或因號哭忿怒。則脹。罷則氣散。曰狐疝。臥則入小腹。行立則出小腹。曰癰疝。陰囊腫。絀如升如斗。不痒不痛。然亦不必拘者。

經云任病爲病男子內結七疝女子帶下瘕聚
足厥陰肝病丈夫瘕疝婦人少腹腫大抵任病肝病
居多小腸病亦多各經亦間有之治之之法統以二
陳湯加澤瀉爲首答白朮桂枝小茴香朮通金鈴子主
之余少時初用疑爲偶效後屢試屢驗方知其調氣
之功甚鉅張景岳先得我心景岳云病名疝氣非無
謂也蓋寒有寒氣熱有熱氣濕有濕氣逆有逆氣陷
有陷氣在陽分則有氣中之氣在陰分則有血中之
氣從寒熱虛實施治俱當兼用氣藥余此方化勝朮