

醫統正脈全書

三五



類證活人書卷十八

無求子著

痛風門

痛風之脈與形証 形神如故飲食如常脈來洪滑浮
弦急數有力而痛甚者實也形神萎弱飲食減少其
脈虛弦濇數或微弱無神或虛搏空弦酸疼無力二
便不調者虛也

痛風治法 治痛風當分別新久虛實及屬風屬火或
有濕熱亦能流注經絡關節爲痛新者營衛之氣血



未虧當以治病爲主若痛久而精神不足者以清補兼之濕熱勝者宜燥濕清熱風火甚者宜滋燥養血大補肝陰蓋治風先治血血行風自滅若過用風藥寒燥之劑反有耗血遏火之患矣

通治痛風主方

當歸

三錢

秦艽

二錢

防風

一錢五分

川芎

羌活

各一錢

車前子

黃芩

枳殼
各五分

水煎午後臨睡服

治痛不外乎順氣治風必先于涼血氣順則血活而

脉絡通血涼則火清而風息痛則不治而自治 如
重感風寒使內之濕火鬱而不散者加羌活桂枝各
五分去黃芩車前服芎蘇散 如外復感暑濕者加
蒼朮一錢五分白朮澤瀉黃柏各一錢去川芎黃芩
枳殼服勝濕丹 血脈凝閉不通而痛甚者加紅花
一錢五分桃仁一錢桂枝五分去黃芩車前服祛風
越痺酒及活絡丹 病久血枯者加牛膝一錢五分
製何首烏二錢服活絡丹或加味史國公藥酒 病
久氣虛者加白朮三錢人參一錢五分減當歸一錢



五分清黃芩枳殼服祛風越痺酒兼加味虎潛丸

如勞倦內傷及房勞體虛之人加人參三錢知母一

錢五分牛膝一錢去羌活黃芩服滋陰百補丸及滋

陰百補酒或加味史國公藥酒 如寒濕風濕之痰

其脉濡軟而微滑者加白朮一錢五分半夏二錢陳

皮蒼朮各一錢去當歸黃芩車前服祛風越痺酒或

加味史國公藥酒及四妙散活絡丹薏苡丸 血虛

血熱風熱內盛者服涼血省風藥酒若大便秘結不

利者服搜風順氣丸



芎蘇散 見胃風門

勝濕丹 見濕門
表濕條

祛風越痺酒 見中風門
中經條

活絡丹 見中風門
中經條

加味史國公藥酒 此方專治肥人素有濕痰風痰而

氣虛不能導引以致淫溢流注于經絡關節之處為

疼痛為酸麻手足舉動不利行步痿蹇難前口眼喎

斜涕唾縱橫言語蹇澁舌音不清筋骨拘攣難于轉

運此酒合四妙丹兼服大効

虎骨

烏稍蛇

白花蛇

晚蠶沙

白殭蠶

全蝎

清風藤

海風藤

油松節

白茄根

防風

漢防己

羌活

獨活

川萆薢

桂枝

麻黃

明天麻

大南星

製半夏

歲靈仙

廣橘紅

枳殼

製何首烏

枸杞子

生地黃

熟地黃

川芎

當歸

牛膝

牡丹皮

五茄皮

杜仲
各等分

黃芪

白朮
二種加倍

剉碎貯絹



囊以滾酒衝入泥固外加厚紙密封放甯處過黃

梅後開用每酒一茶杯調入桑枝膏五七匙不拘

時溫服若早晚空心各吞四妙丹一服餘時不必

加味虎潛丸 卽滋陰百補丸加虎骨二兩五錢羌活

獨活各一兩

方見內傷門勞
煩內傷陰虛條

滋陰百補丸

見內傷門勞
煩內傷條

滋陰百補藥酒

大補氣血調和營衛溫經舒絡壯骨

益髓

熟地黃

生地黃

製首烏

枸杞子



沙苑蒺藜

鹿角膠

各三兩

當歸

胡桃仁

桂圓肉

各二兩半

牛膝

肉蓯蓉

白芍藥

人參

白朮

葳蕤

龜板膠

白菊花

五茄皮

各二兩

黃芪

瑣陽

牡丹皮

杜仲

地骨皮

知母

各二兩五錢

黃栢

肉桂

各一兩

剉碎囊貯以滾酒衝入

大壘泥固外加厚紙密封放窖地過黃梅開用早

晚隨量熱飲

四妙散

治濕痰風痺筋骨拘攣氣虛體肥經絡酸麻



疼痛

川黃柏

茅山蒼朮

先以米泔水潤透切片晒乾用

向東桑皮

三種各分爲二分以一分用童便以一分用酒各浸透晒乾炒微黃色

陳胆星

已上各等分爲細末每服二三錢早

晚空心卽以藥酒吞服

蓍蕒丸

風寒濕三氣着而成痺以致血脉凝滯肢體

麻木腰膝酸疼二便燥結無論痛風痛痺濕痰風熱

宜于久服預防中風痿痺之病

蓍蕒草

不拘多寡去梗取葉晒乾陳酒拌透蒸過晒乾再拌再蒸如法九次晒燥爲細末收

貯聽用

蜜丸早空心溫酒吞服四五錢

涼血省風藥酒 血虛內熱熱極生風或外感厲氣稽

留經絡內則疼痛外生瘡癰氣實火旺飲食如常二

便秘結者常服

生地

熟地

歸身 各二兩

川芎

杜仲

白蒺藜

各一兩半

羌活

一兩

金銀花

一兩五錢

蘇葉

荊芥

防風

白芷

蟬壳

陳皮

枳壳

蛇壳



連翹

川連

黃芩

黃柏

粉甘草

各五錢

白菊花

一兩

白蘚皮

五錢

製何首烏

一錢

剉碎袋貯滾酒衝入大壺封固密窰泥地過徽用

空心隨量溫服

桑枝膏

滋腎益陰祛風潤燥肝虛血少風熱內盛者

宜之

青桑皮

取朝東者尤妙不拘多寡剉碎晒一周時用

河井水各半熬膏至滴水成珠不散畧用熟白蜜收貯早晚空心調史國公酒內服

搜風順氣丸

見中風門中
臟緩症條



班疹門

班疹之脉與形証 身熱無汗煩渴燥悶或痛或痒如

雲若錦腹痛胸滿二便秘結六脉浮洪有力或浮數

有力者係手陽明大腸足陽明胃二經風熱爲病所

謂陽班也若內熱自汗渴不欲飲心煩身躁胃弱脾

泄喜濕惡熱色白而不紅但痒而不痛六脉遲緩微

弱或虛數無力者手太陰肺足太陰脾手少陰心足

少陰腎經之陰火內亢爲病所謂陰班也疹形雖與

班異而致病之因受病之臟腑及所現之脉與形証



無不同蓋班有陰陽則疹亦有陰陽自在醫者審其症之陰陽虛實脉之無力有力可也

班疹治法

兩陽合明其火自盛兼有食積致生積熱

故班疹之因必歸過于胃與大腸也火盛則血熱而金燥蓋心爲火臟主血脉肺爲金臟主皮毛火聚胸中肺受薰蒸心火愈熾或熱極反兼風化或客風鼓動內火其病發于心肺二經所謂陽班陽疹必先清散風熱于表疎導積熱于內表裏和解以救炎炎之勢如二便秘結急宜利之若脾腎之陰虛火盛不能



歸經固藏發越于上而心肺受其薰灼而病亦有因
風致火或因熱極生風而發所謂陰班陰疹初則亦
宜清解使其透發寬其胸膈解其煩躁次則察脉之
大小虛實脾胃之實與不實大便之結與不結或清
補或溫補

通治陽症班疹主方

生地 三錢

防風

荊芥 各一錢五分

川黃連 五分

黃芩

桔梗 各一錢

牡丹皮

犀角屑 各五分

甘草 三分

水煎不拘時服

血中伏火必先涼血和血故以生地爲君而丹皮佐之
芩連瀉心肺之火佐桔梗以開鬱結犀角清心家之熱毒而甘草佐之荊防用以解散內外之風邪
外感重者加羌活一錢川芎薄荷各五分暫去芩連生地
如陽明胃家熱毒煩渴燥熱無汗背寒斑疹黑紫色者速加石膏一兩連翹一錢五分玄參一錢
犀角五分去防風桔梗 傷寒邪熱入胃舌胎黃黑
有刺二便不通譫語狂熱者加大黃五錢芒硝三錢
枳實二錢去生地防風丹皮 傷寒陽明失表煩渴

