

渴

潔古論渴有三種 一者實熱積於心脾煩躁大渴
引飲宜白虎湯謂不因吐瀉大病忽然而作 二者
因久病或取轉過度致脾虛引飲宜白朮散 三者
因患濕熱病熱結膀胱小便不利大渴引飲有表裏
證者宜五苓散主之 百問云小兒唇紅如丹卽發
渴紅甚焦黑則危篤若三焦虛煩作渴者用三黃湯
傷寒後唇口焦者用白虎湯竹葉湯瀉痢作渴者用
四苓散之類常治暑積心脾煩渴引飲者用白虎湯

下利脾虛作渴用七味白朮散熱結膀胱小便祕渴者用五苓散上焦虛熱者用四君子湯膏粱積熱者用清胃散脾胃積熱者用瀉黃散中氣虛熱者用異功散腎水虛熱者用六味丸其餘疳證發熱各詳本證胎稟所致者當各審其因若誤用寒涼降火脾胃復傷則腹脹而爲敗證矣

實熱

白虎湯

發熱

三黃湯

黃芩

黃連

黃檗

各等分

右水煎服

聖惠黃連散 治小兒心肺積熱渴不止咽喉乾痛

黃連 去鬚

射干

川升麻

白茯苓

麥門冬 去心

玄參

甘草 炙微赤

桑根白皮

黃芩 各半兩

石件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞入青

竹葉七片煎五分去渣入蜜半合更煎一兩沸放

溫時時與兒呷之

麥門冬散 治小兒心肺熱壅口渴不止

麥門冬 去心

梔子仁

犀角 屑

知母

甘草 炙

黃芩 各半兩

右爲散每服一錢水一盞入竹葉七片煎五分不計時候服亦可量兒大小分減服

聖惠銀飲子 治小兒熱渴不止

銀 伍兩

石膏

寒水石

蠶蛹鹽 各貳兩

右件藥以水三升入銀石三味煎至一升去銀石次下蛹鹽煎至七合去滓每服半合不計時候溫溫服之量兒大小加減

蘇蘇根散 治小兒熱渴不止煩悶

蘇蘇根 叁分

黃芩

知母 各半兩

右件藥搗羅爲散每服一錢以水一小盞入小麥
粟米一百粒煎至五分去查不計時候溫服量兒
大小以意加減

又方

蓴蓴根

參分

黃芩

半兩

小麥

半合

右件以水三盞煎取一盞去查不計時服量兒大
小加減

又方

生葛汁

竹瀝

各貳合

右件汁相和令勻不拘時服半合量兒大小加減

茅先生胡黃連散

治小兒諸渴及疳渴解諸般熱

胡黃連

麥門冬

乾葛

玄參

甘草

枇杷葉

炙去毛

右各等分爲末每服一錢水七分一盞生薑一片同煎五分後放蜜三五滴同煎至四分溫服

虛熱

聖惠蘆根散

治小兒壯熱不止

蘆根

黃耆

人參

甘草

炙

麥門冬

知母

各半兩

右件麤羅爲散每服一錢以水一小盞入竹葉七片粟米一百粒煎至五分去渣不計時候溫服量

兒之大小以意加減

嬰孺麥門冬湯

治小兒夏天服藥大下後胃中虛

熱渴欲飲水

麥門冬

甘草

龍骨各肆分

枳實

黃芩

茯苓

人參各叁分

右以水四升煮取一升半爲三服服此湯後渴不差取水芹煮濃汁飲之間湯服之甚者恣意與之服

蘆根飲子

治小兒壯熱渴兼吐不止

生蘆根

切伍分

淡竹青皮

人參

各捌分

桔梗

伍分

知母

拾分

粟米

叁合

右以水五升煮之一升半量兒大小與之服

𦔻𦔻湯

治小兒熱渴或吐下後虛熱渴

𦔻𦔻

伍分

黃芩

叁分

知母

蘆根

各貳分

生米

貳合

麥門冬

叁合

右切以水五升煮二升如飲漿水度服之

脾虛

錢氏白朮散

人參

切去頭

白朮

木香

白茯苓

去皮

甘草

剉炒

藿香葉

各壹兩

乾葛剉

右爲麤末每服一錢至二錢水一盞煎至五分溫服如飲水者多煎與之無時

海藏云治發渴四君子加乾葛枇杷葉

先以棗湯煮過炙乾用

各等分入木瓜少許同煎服亦治虛渴法也

暴熱

五苓散

方見驚

小方脉論小兒渴病喫水太多腹脹泄瀉此病得之心藏熱心與小腸合小腸亦受熱小腸既熱其氣上行奔胃口致孩子喫水其水待奔小腸被小腸氣熱滲泄不及轉入大腸如治之先下淋藥後下涼心藏

藥然後止渴乃効 按此亦五苓散證也

小方脉論治渴先下淋藥方

鬱金

滑石

各壹兩

旱蓮子

半兩

藥 右件爲末每服半錢煎葱湯調下急進三服凉心

小方脉論欲止渴次凉心藏藥方

烏賊魚骨

海浮石

各壹兩

蒲黃

炒半兩

右末每半錢用枇杷葉煎湯下

黃疸

錢乙論黃相似云身皮目皆黃者黃病也身疼體背
強大小便澀一身盡黃面目指爪皆黃小便如屋塵
色看物皆黃渴者難治此黃疸也二證多病於大病
後別有一證不因病後身微黃者胃熱也大人亦同
又有面黃腹大食土渴者脾疸也又有自生而身黃
者胎疸也古書云諸疸皆熱也深黃者是也若淡黃
兼白者胃怯胃不和也難知云色如熏黃乃濕病
也一身盡痛色如橘子黃者黃病也身不痛乾

黃燥也小便自利四肢不沉重渴而引飲者梔子檳皮湯 濕黃脾也小便不利四肢沉重似渴不欲飲

者大茵陳湯 大便自利而黃者茵陳梔子黃連三

物湯 往來寒熱一身盡黃者小柴胡加梔子湯

潔古云陽黃則大小便赤澀身熱是脾土與心火相

搏為陽病法當先利小便後下大便 陰黃則清便

自調面目及身黃四肢冷是脾虛不能制腎水當用

益黃散下使君子丸 益黃散方見脾史 凡治黃病

腹脹當用茵陳蒿湯調下五苓散若欲利小便去大

黃欲利大便則加大黃之類 有陽證可服謂面赤飲

水者是也 湯氏云身疼髀背疼大小便澀皮膚面
目齒爪皆黃小便如屋塵色利者易治澀者難治宜
服五苓散加茵陳煎湯調又宜服導赤散加茵陳煎
或身熱宜服小柴胡湯甚者服承氣湯 曾凡黃病
者不可一槩而論標本不同證治亦異乃脾胃氣虛
感受濕熱鬱於腠理淫於皮膚蘊積成黃熏發於外
故有此證或脾胃虛弱內因癥癖攻之而成然疳瀉
亦主皮黃髮堅肚大青筋肌肉消瘦外無色澤身必
發黃此又本於疳病而作致有是證治法若感濕熱
而得身黃如煙熏之色以咬咀五苓散加麻黃水薑

煎投汗之即愈或用茵陳蒿湯調下五苓散亦好

若得於瘡癖者其形如黃土相類以醒脾散

慢驚

化

癖丸

積

醒脾快胃磨積理疳胃氣既和飲食倍進運

化精微榮養百骸灌溉臟腑五色各見於本部精華

乃形於面貌其黃自除

薛經曰中央黃色入通於

脾故黃疸者脾之色也夫人身之神貴於藏而默用

見於外則內虛矣其證皆因脾氣有虧運化失職濕

熱留於肌膚發而爲疸錢仲陽所謂身痛背彊二便

澀滯遍身面目爪甲皆黃是也小便便褐色者難治癰

法宜固脾爲先如專用剋伐寬中澹泄利水之藥則

鮮有不至危者矣若初生及百日半年之間不因病

而身黃者胃熱胎黃也腹大食土爲脾疳兼作渴飲

冷者用瀉黃散脾小便不利者茵陳湯病後發黃肢

體浮腫者用白朮散胃清便自調肢冷嗜卧者益黃

散脾身澹黃白者調中丸腹及補中益氣湯虛加茵

陳身熱臍滿肌膚面目皆黃者加減瀉黃散辨其所

以若閉目壯熱多哭不已大小便赤澀口中熱氣者

廼妊娠厚味胎毒之候也母子並服生地黃湯胎黃仍

忌酒麪五辛熱物設不自慎悞傷脾土急則變爲驚

風吐瀉緩則肢體浮腫小便不利眼目障閉多成疳

疾矣又有脾虛發黃者當於脾胃中求之

陽黃諸方

茵陳湯

治陽明病發熱汗出者此為熱

越不能發也但頭汗出身無汗齊頸而還小便不利渴引水漿者此為瘀熱在裏身必發黃傷寒七八日身黃如橘色小便不利腹微滿者宜此

茵陳蒿

嫩者壹兩

大黃

叁錢半

梔子

大者叁枚

右剉散以水壹大盞先煎茵陳減半次內二味煎捌分去滓溫服日三服小便當利如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便中去也量大小加減

梔子檄皮湯

治傷寒身黃發熱

梔子 捌枚

黃蘗 壹兩

甘草 半兩

右剉散每服貳錢水壹盞煎陸分去滓溫服

犀角散 治小兒黃疸一身盡黃

犀角 兩 鎊壹

茵陳

乾葛

升麻

龍膽草

生地黄 各半兩

寒水石 朱錢半

右剉散水煎服 一方治小兒忽發黃面目皮肉

盡黃葛根搗汁和蜜服

連翹赤小豆湯 治小兒傷寒發黃身熱

麻黃 去節

連翹

甘草