

亥21

46(2)112

金匱要略淺註 方四五六七八九十全

陳脩園醫書二種



金匱要略淺註卷四

漢張仲景原文

閩長樂陳念祖修園著

男元犀

蔚古愚校字

奔豚氣病證治第八

中醫藥大學圖書館版權所有

師曰心者君主之官也神病則非有心病而腎之水  
明出焉心不可病心病輕有氣凌之則爲奔豚有之火化而生內癰則爲心病而胃之燥土從少陰  
少陰之熱氣驚怖有心病而腎之陰水不交火邪此四部病皆從驚發得之蓋以驚則傷心凡心傷而致  
而煽動則爲驚怖有於離火而旣濟則爲吐膿有之風木乘亦謂之驚可也非驚亦謂之驚無不可也此一節爲奔豚證之開端類及吐膿等證四部同出一源概以驚字括之蓋言皆  
心病也師不明言心病而言驚發者原爲中人以上告語後之註家或附會其說或闕疑以待恐斯道  
日晦吾不得不急起而明之

師曰上既以奔豚合四部而指其所從得矣今請專言奔豚之病奔豚病有物渾淪從下少腹起上衝咽喉從上乘於心而欲死則氣  
衰復還於腎止皆從驚心恐傷腎得之推之凡有所傷於心者皆可作驚觀也有所傷於腎者皆可  
而止皆從驚心恐傷腎得之作恐觀也蓋以心腎之氣本自交通一受傷則無復限制矣此

言痛發於心腎爲奔豚之本證也

然腎處於下焦與肝相通所謂乙癸同源是也奔豚其氣之逆上而衝胸木邪犯腹必痛肝臟有邪其氣然肝腎之氣並善上逆今請言肝邪之發爲奔豚本氣則通於少陽則爲往來寒熱以奔豚湯主之此言奔豚之由肝邪而發者當以奔豚湯暢肝氣而去客邪也第此爲客邪

立法若肝臟本病發作以烏梅丸爲神劑此卽金匱之正面處尋出底面也

### 奔豚湯方

- |       |      |         |                    |       |    |
|-------|------|---------|--------------------|-------|----|
| 甘草    | 芍藥   | 當歸      | 黃芩                 | 芍藥各二兩 | 半夏 |
| 生薑各四兩 | 生葛五兩 | 甘李根白皮一升 | 右九味以水一斗煮取五升溫服一升日二夜 |       |    |

一服

奔豚證有腎氣乘外寒而衝發汗後燒針令其再汗針處被寒塞襲腰裏火鬱肺中以致核起而赤者必發奔豚氣從少腹上至心灸其核上各一壯與桂枝加桂湯主之此爲旣成奔豚而出其正治之方也尤在涇云此腎氣乘外寒而動發爲奔豚者發汗後燒針復汗陽氣重傷於是外寒從針孔而入通於腎腎氣乘外寒而上衝於心故須灸其核上以杜再入之邪而以桂枝湯外解寒邪加桂內泄腎氣也

### 桂枝加桂湯方

- |      |    |       |      |       |           |
|------|----|-------|------|-------|-----------|
| 桂枝五兩 | 芍藥 | 生薑各三兩 | 甘草三兩 | 大棗十二枚 | 右五味以水七升微火 |
|------|----|-------|------|-------|-----------|

煮取三升去滓服一升

奔豚證有腎侮心虛而上發汗後腑下悸者以發汗傷其心液心欲作奔豚以茯苓桂枝甘草大棗湯主逆者試約其證而出其方氣虛而腎氣亦動欲作奔豚以茯苓桂枝甘草大棗湯主

之此爲欲作奔豚而出其正治之方也程氏曰汗後臍下悸者陽氣虛而腎邪上逆也臍下爲腎氣發源之地茯苓泄水以伐腎邪桂枝行陽以散逆氣甘草大棗助脾土以制腎水煎用甘瀉水者揚之無力全無水性取其不助腎邪也

### 茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓半斤 甘草二兩 大棗十五枚

桂枝四兩

右四味以甘瀉水一斗先煮茯苓減二

升納諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

作甘瀉水法取水二斗置大盆內以杓揚之上有珠子五六千顆相逐取用之也

### 胸痹心痛短氣病脈證并治第九

師曰病有最虛之處卽爲容夫欲脈當先取其太過之不及如關陽脉微是陽氣虛與前之陽脉微也關後之陰脉弦是陰邪乘於陽

位卽胸痹而心痛所以然者責其上焦氣極虛也本矣然單虛不爲痛今陽脉微虛知其在上焦究所以

胸痹心痛者以其陰中弦乃陰中之寒邪乘上焦之虛而爲痹爲痛是故也此言胸痹心痛之病皆由

虛處容邪從其脈象而探其病源

其間亦有不從虛得者當分別觀之平人又無新邪寒熱乃忽短氣不足以息者當是痰飲食積碍其升虛當姑另備一審因察病之法如無病之平人又無而發寒熱然此不責其虛其實也此另出實證與上節對勘而愈明也

人之胸中如天陽氣用事陽氣

蓋諸陽受氣於胸而轉行於背氣

塞其前後陰

一虛諸陰寒得而乘之則爲

胸痹之病

不行則阻其上下往來之路而爲

喘息欬唾

陽之位則爲胸

背痛且不特喘息欬唾而豆

更審之脈寸口之脈沉而遲

則上所言陽關上之陰微之意也

關上脉

小緊數

卽上所言陰弦之

關也陽氣失權諸陰反得而

佔之法當通其胸中之陽以

括壅薤白白酒湯主之

此詳胸痹之證脈凡言胸痹皆當以此繫之但微

有參差不同故首揭以爲胸痹之主證主方耳其云寸口脈沉而遲卽首節陽微之互辭關上小緊數

卽首節陰弦之互辭但關居陰陽之界緣陰邪盛於真陰之本位由尺而上溢於關故於關上見之亦卽首節太過不及於陰陽分其上下之意而不必拘拘於字句間也

### 括壅薤白白酒湯方

括壅實一枚 薤白半斤 白酒七升 右三味同煮取二升分溫再服

胸痹

證上已詳言不復

不得臥

是有痰飲以爲之援也此心痛徹背者

爲胸痹證

再贅今又加氣上

證與支飲證相類而惟

心痛徹背者

所獨以

括壅薤白半夏湯主之

此承上而言不得臥及心痛徹背爲痹甚於前而前方亦宜加減也

### 括壅薤白半夏湯方

括壅實一枚 薤白三兩 半夏半升 白酒一斗 右四味同煎取四升溫服一升日三服

更有病勢胸痹病

之最急者胸痹加

心中痞

爲

不法氣結聚

在胸

滿脇下之氣逆

而擔心

而又及於心中牽

及脇下爲留爲結爲逆爲搶可謂陰邪之橫行無忌矣此際急興問罪之師以枳實薤白桂枝湯主之抑或務爲人參湯亦主之此言胸痹已甚之證出二方以聽人之臨時擇用也或先後相間用之惟在臨時之活潑尤在涇云心中痞氣氣痹而成痞也脇下逆搶心氣逆不降將爲中之害也是宜急通其痞結之氣否則速復其不振之陽蓋去邪之實卽以安正養陽之虛卽以逐陰是在審其病之久暫與氣之虛實而決之

### 括薑薤白桂枝湯方

枳實四枚 薤白半斤 桂枝一兩 厚朴四兩 括薑實一枚 捣右五味以水五升先

煮枳實厚朴取二升去滓納諸藥煮數沸分溫三服

### 人參湯方

人參 乾薑 白朮各二 桂枝 甘草各四 右四味以水九升煮取

五升納桂枝更煮取三升溫服一升日三服

更有病勢胸痹病胸中時氣之塞息之出入亦短氣此水氣滯而爲病若水之稍緩者則氣順矣若氣盛於水橘枳生薑湯亦主之氣開則者則胸中氣塞橘枳生薑湯亦主之氣通矣尤在涇云此亦氣閉氣逆之證視前條爲稍緩矣二方皆下氣散結之劑而有甘淡苦辛之異亦在酌其強弱而用之

茯苓杏仁甘草湯方

茯苓三兩 杏仁五十個

甘草一兩 右三味以水一斗煮取五升溫服一升日三服不差更服

橘枳生薑湯方

橘皮一斤

枳實三兩

生薑半斤

右三味以水五升煮取二升分溫再服

又有本臟病而殃及他臟者不可不知 胸痹爲手少陰之君火衰微以致足少陰之陰氣上緩急者乙癸同氣而及於肝肝主通身之筋今筋時見 痘急者病也以薏苡附子散主此言胸痹之兼證也

薏苡附子散方

薏苡仁十五兩

大附子三兩

右二味杵爲散服方寸匕日三服

若胸痹之外病有心中悶痛或痰飲客氣諸逆心懸而空如空中痛以桂枝生薑枳實湯主之 此下不言胸痹是不必有胸痹的證矣

桂枝生薑枳實湯方

桂枝

生薑各二兩

枳實五兩

右三味以水六升煮取三升分溫三服

上言心痛徹背尙有休止之時故以括要連連痛而不休則爲陰寒邪甚浸浸乎烏雍白白酒加半夏湯平平之劑可治今則心痛徹背背痛徹心陽光欲熄非雍白之類所能治也以

頭赤石脂丸主之 此言心痛牽引前後陰邪僭於陽位必用大劑以急救也

烏頭赤石脂丸方

烏頭一分

蜀椒

乾薑各一兩

附子半兩

赤石脂一兩

右五味末之蜜丸如

梧子大先食服一丸日三服不知稍加服

附方

九痛丸治九種心疼

附子三兩

生狼牙

巴豆去皮熬  
研如膏

乾薑

吳茱萸

人參各一兩

右六味

未之煉蜜丸如梧子大酒下強人初服三丸日三服弱者二丸 兼治卒中惡腹脹口不能言又治連年積冷流注心胸痛并冷衝二氣落馬墜車血疾等皆主之忌口如常法

按痛雖有九而心痛不離於寒故以薑附爲主而降濁

去風逐滯  
補虛次之

腹滿寒疝宿食病脈證治第十

趺陽爲胃脈微弦微弦爲陰象也 脉其脈微弦陰加於陽其 法當腹滿 若不滿者其陰邪

不從外得而下攻

必便難 或兩胠疼痛此虛寒

從內生其氣

欲從下而上也此證不當以溫中藥服之以散內結 可散表當以溫之藥服之以陰寒也 此言趺陽微弦爲中寒而腹滿也其實病根在下

所謂腎虛則寒動於中是也與上一篇首節參看自得 脉音區腋下脇也

趺陽脈微弦固爲虛證然病者腹滿按之不痛爲虛不可下也痛者爲實可下之胃實者舌下有黃胎若古黃而未經下者

下之黃胎自去 此言虛實之辨法而並及治法也

虛而生寒證不拒按腹滿時減復如故此爲虛

當

與溫藥

此承上節而申言虛寒之證治也 尤在

涇云腹滿不減者實也時減復如故者腹中寒氣得陽而暫開得陰而複合也此亦寒從內生故曰當

與溫藥

又虛有實象之病者面瘦黃若燥而渴者熱實也今

燥而不渴

腹滿

中均寒

實

實證當不下利若下利則是虛寒之極反有實象

同蓋彼主乎內

不止也是虛寒胃氣死

此言真虛反有實象假實不可以直攻真虛不能以遽挽也

微弦脈見於趺陽與見於寸口者不同以趺陽

寸口脈弦者

弦爲寒而

主痛其人

自脇下拘急而痛

與兩胠疼痛不

主胃病從內生寸口主榮衛病從外至也若

寸口脈弦者

弦爲寒而

主痛其人

自脇下拘急而痛

與兩胠疼痛不

而此主乎外也主乎內者其人痛而兼便難

主乎外者其人

痛而

自脇下拘急而痛

與兩胠疼痛不

而此主乎外者其人

之別也

塞有內外之別上雖詳之於脉更當辨之於所見之證曰喜欠曰清夫惟取證於素始得其不易  
欲睡而喜欠者陰引陽入也睡覺而喜欠其爲陰盛引陽也奚疑又嘗觀年老之人清涕出者其人爲  
欠者陽引陰出也今其人爲中寒家而喜欠其爲陰盛引陽也奚疑又嘗觀年老之人清涕出者寒盛所致也今其人爲中

寒家清涕出其爲陽氣虛發者非中寒也乃爲外寒所寒不能留而寒也奚疑若發熱色和者搏雖有清涕出亦因其善嚏而自出矣此以中寒家立論以明

### 中寒證而並及外寒之輕證也

上言善嚏果何取於嚏乎蓋嚏者雷氣之義也陰盛則陽伏陽一得氣而奮發在天爲雷在人爲嚏也若中素寒其人下利以裏虛不振也若欲嚏不能是欲奮發却彼陰留而中止陰氣盛也故知此人肚中寒此承上節善嚏二字言中氣虛寒之人欲嚏不能嚏也中寒之中是平聲尤氏作去聲讀誤也傷寒金匱無中寒二字不可不知宋元後註家附會此二字不知遮蔽多少聰明人耳目

若夫瘦人形氣虛弱難禦外邪忽而繞臍痛必有之外入風冷風冷入內則穀氣留滯不行醫者不曉以溫藥助脾之行而反以寒下之下雖藥推蕩其穀氣而寒性反增其氣必犯上衝卽不上衝者亦必竊據流連心下則痞此言素虛人一傷風冷風冷由是正乃益虛邪乃無制其氣必而爲衝卽不上衝者亦必竊據流連心下則痞此言素虛人一傷風冷其腹滿雖爲積滯法宜溫行不宜寒下以致變也

茲試言諸病腹滿爲裏發熱爲表邪表裏之證之方治病腹滿實發熱邪相持至於兩解以厚朴七物湯主之此言腹滿發熱而出表裏兩解之方也但發熱疑是中風證風能消穀傷寒

### 云能食爲中風可以參看

### 厚朴七物湯方

厚朴半斤 甘草

大黃各三

大棗十枚

枳實五枚

桂枝二兩

生薑五兩

右七味以水一斗煮取四升溫服八合日三服嘔者加半夏五合下利去大黃寒多者

加生薑至半斤

雖然表裏之辨猶易也而虛寒欲

下上之旨最元妙而難言何也 腹中爲陰部下

寒氣逆也陰部有寒氣則爲雷鳴寒盛而且從下胸中脇逆滿兼

吐是陰邪不特自肆於陰部而陽位亦任其橫行而無忌所謂腎虛則寒動於中急以附子粳米湯主之此言寒氣之自下而上僭中上之陽必虛惟恐胃陽隨其嘔吐而脫故於溫煖胃陽方中而兼補腎陽也

附子粳米湯方

附子一枚 炮

半夏

粳米各半升

甘草一兩

大棗十枚

右五味以水八升煮米

熟湯成去滓溫服一升日三服

上用厚朴七物湯以其痛而不發熱止  
發熱尙有表邪也今腹痛而是大便閉者  
證也通則不痛以厚朴三物湯主之此節合下二節皆言  
實則可下之證也重在氣滯一邊

厚朴三物湯方

厚朴八兩

大黃四兩

枳實五枚

右三味以水一斗二升先煮二味取五升納大黃煮取

三升溫服一升以利爲度

**湯**此亦言實則可下之證但以邪在心下故以大柴胡湯爲的方可見古人用方斟酌盡善不差一毫以手按辨其虛實既言不復再贅矣若按之心下滿痛者雖云其結尙高與腹中滿爲有形實邪也實當下之宜大柴胡痛不同而旣已拒按若此此爲之實也則

大柴胡湯方

柴胡 半斤

黃芩

芍藥各二兩

半夏 半升

枳實四枚

**大黃**一兩

大棗枚

生畫五兩

右八味以

二升煮取

去滓再煎

卷一

**前言**腹滿時減  
當與溫藥矣若

滿而不減

責其減者

自足

謹之屬不滅者當

宜大承氣

滿在腹部與在心下者不同故用大承氣湯以急攻之此三方均是下藥當分別於幾微而用之

**大承氣湯方** 見瘧

至若寒痛而救心胸中事今有上衝於皮膚而突起出見似之形有頭足上下俱痛而手不可觸近者此虛而有實象也以大建中湯主之此言心胃本陽氣用大寒與正氣相湊胃陽爲寒不能飲食據於腹中作滿氣與寒氣上滯而爲痛逆則爲嘔所療則治另有方法

受寒引動下焦之陰氣上逆而痛甚也方中薑參飴糖建立中氣而椒性下行者溫起下焦之陽以勝

上瀾之陰也

大建中湯方

蜀椒二合炒去汗

乾薑四兩

人參一兩

右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一升微火煎

取二升分溫再服如一炊頃可飲粥二升後更服當一日食糜粥溫覆之

虛寒則溫補之實熱則寒下之固也然有陰寒成聚之證治之者當知法外有法 脇下偏痛發熱若脈數大熱邪實也今按其脈緊弦此陰聚也雖有發熱亦是陽氣被鬱所致若非溫藥不能已其以當寒若非下藥不能去其結所以溫藥下之宜大黃附子湯 此承上節而言陰寒中不無實證溫藥

中可雜以下藥也

大黃附子湯方

大黃三兩

附子三兩

細辛一兩

右三味以水五升煮取二升分溫三服若強人煮取二

升半分溫三服服後如人行四五里進一服

寒氣厥逆赤丸主之 此言厥逆而未言腹滿痛者從所急而救治也

徐忠可云四肢乃陽氣所起寒氣格之故陽氣不順接而厥陰氣衝滿而逆故以烏頭細辛伐內寒芩半以下其逆上之痰氣真朱爲色者寒則氣浮故重以鎮之且以護其心也真朱卽硃砂也 沈自南

云本經凡病僅言風寒不言暑濕燥火何也蓋以寒濕燥屬陰同類以濕燥統於寒下風暑火屬陽同

類以濕燥統於風下所以僅舉風寒二大法門不言燥濕火暑之繁也

### 赤丸方

烏頭二兩 炮 茯苓四兩 細辛一兩 半夏四兩 右四味末之內真朱爲色煉蜜爲丸如

麻子大先食飲酒下三丸日再夜一服不知稍增以知爲度

寒結腹中因病久疊聚如山犯寒卽發謂之寒疝其初亦止

腹滿而脈弦而緊弦緊皆陰也但弦之陰從內生緊之陰從外得

弦則衛氣不行卽惡寒而瘞

其外之緊則不欲食陰入而痹其胃之陽也衛陽與胃陽並衰而內寒與外陽也

寒交盛由是陰反無畏而上衝陽反不治而下伏謂爲邪正相搏卽爲寒疝寒疝繞

臍痛若發作之時是陰寒內動或則迫其汗而上出或離脫也故

手足厥冷見其脈沉緊者沉爲裏緊爲寒

以辛甘辛溫之品散結以救陽大烏頭煎主之此言寒疝之總證總脈而出其救治也

### 大烏頭煎

烏頭大者五枚熬去皮不必咀

右以水三升煮取一升去滓納蜜一升煎令水氣盡取一升強人服七合弱人

服五合不差明日更服不可一日更服

然大烏頭煎祛寒則有寒疝之爲寒多而餘而補血則不足也若寒疝血虛者其

腹中痛及脇痛裏急者以血虛則脉不榮寒多則脉絀急故也以當歸生薑羊肉湯

主之此治寒多而血虛者之法養正爲本散寒爲次治寒疝之和劑也

當歸生薑羊肉湯方

當歸三兩 生薑三兩

羊肉一斤

右三味以水八升煮取三升溫服七日三服若寒多

加生薑成一斤

痛多而嘔者加橘皮二兩白朮一兩加生薑者亦加水五升煮取三升二合服之

寒疝有裏外俱病之證

腹中痛逆冷陽絕於裏也

手足不仁若身疼痛攻其內邪氣牽制不服所以

灸刺諸藥皆不

能治裏外交迫孰可抵當

惟當有烏頭桂枝湯之兩顧可以

主之此言寒疝之表裏兼劇而出其並治之方也

烏頭桂枝湯方

烏頭五枚

右一味以蜜二升煎減半去滓以桂枝湯五合解之合得一升

解之者溶化也合得一升以烏頭所煎之蜜五

合加桂枝湯五升

後初服五合不知卽服三合又不知復加至五合其知者也

知效如醉狀塞方解也得吐者塞

已伸爲中病

由此觀之寒疝之證不外於寒而寒中之虛實固所當辨寒

病按

其脈數爲寒疝

而數中仍不離變脉乎本脈之

緊乃弦之狀

易明而狀如弓弦

按之不移而掩其眞面目也若脈弦數者數雖陽脉而見之於

當下其寒若脈緊大

而遲者必心下堅

遲爲在藏病應心下奚疑而堅爲陰象脈大爲而與緊脉並見卽爲陰者因以斷陽中興大爲陽脉而相反其義何居而不知脈大陽而

所竊附於此

之曰陽中

有陰可下之此言脈緊爲寒疝主脈又有數而弦大而緊俱是陽中有陰是寒疝之脈之變其云當下

其寒想卽大黃附子湯也 尤在涇云脈數爲陽緊弦爲陰陰陽參見是寒熱交至然就寒痛言則數反從弦故其數爲陰凝於陽之數非陽氣生熱之數矣如就風瘧言則弦反從數故其弦爲風從熱發之弦而非陰氣生寒之弦者與此適相發明也故曰脈數弦者當下其寒緊而遲大而緊亦然大雖陽脈不得爲熱正以形其陰之實也故曰陽中有陰可下之

附方

外臺烏頭湯治寒痼腹中絞痛賊風入攻五藏拘急不得轉側發作有時令人陰縮手足厥逆卽大烏頭煎

外臺柴胡桂枝湯治心腹卒中痛者

柴胡四兩 黃芩 人參 茯苓 桂枝各一  
甘草三兩 半夏二合 大棗十二枚 右九味以水六升煮取三升溫服一升日三服

此證由風邪乘侮脾胃者多然風氣通於肝此方提肝木之氣驅邪外出而補中消痰化熱宣通榮衛次之沈自南謂加減治胃脘痛如神

外臺走馬湯治中惡心痛腹脹大便不通

巴豆二枚去皮心熬 杏仁一枚 右二味以綿纏槌碎熱湯二合捻取白汁飲之當下老小量之通治飛

尸鬼擊病 沈自南云中惡之證俗謂絞腸烏痧卽臭穢惡毒之氣直從口鼻入於心胸腸胃藏腑壅塞正氣不行故心痛腹脹大便不通是爲實證似非六淫侵入而有表裏虛實清濁之分故用巴豆極熱大毒峻猛之劑急攻其邪佐杏仁以利肺與大腸之氣使邪從便出一掃盡除則病得愈若緩須臾正氣不通榮衛陰陽機息則死是取通則不痛之義也

問曰人病則食自少若以食少而誤認爲宿食往往以查麵枳朴消導見其沉滑而患之頗久則寸口脈浮而大飲食不節則陰受之不然其穀氣積而壅盛則反濁且中氣阻滯而水穀不滑反濁之精不能下逮其尺中亦微而濁故於微知其所以受有宿食以大承氣湯主之脈數而滑者有餘之象也此脉斷當於關部宿食脉似濁中知傷者由於有宿食而不知因宿食下之則愈宜大承氣湯久利而不欲食者是脾傷不下利之初不欲食者此有宿食所謂傷食則能食也若下利卽當下之宜大承氣湯此三節言宿食可下之證參各家說脾胃者所以化水穀而行津氣不可或止者也穀止則化絕氣止則機息化絕機息人事不其頓乎故必大承氣速去其停穀去則氣行氣行則化續而生以全矣若徒用平胃散及穀芽麥芽山楂神麴之類消導克化則宿食未得出路而生氣積日消磨豈徒無益而又害之醫者當知所返矣