

風濕相搏骨節煩疼風寒濕相搏于骨節之間而煩疼也掣者
骨節之所痛甚不得屈伸近之則觸其相搏之勢而劇也汗出
者風傷衛也短氣者寒濕閉塞而氣促也小便不利者為濕閉
也惡風不欲去衣者風寒傷外衛之氣血故畏寒不能興藉
乎衣也身微腫者濕沁于皮肉而腫也故用甘草附子湯以解
之

甘草附子湯

甘草

附子

白朮

桂枝

芍藥

甘草

附子

白朮

桂枝

芍藥

六升者取三升去渣溫服一升日三服初服得微汗則解能食
汗出復煩者服五合恐一升多者服六七合妙

附子桂枝以解風寒白朮以沁濕甘草者所以健脾而崇土也
故初服微汗得解而能食如汗出復煩者風寒雖退而濕未除
也若仍用一升恐桂附之性太過不能無碍于煩故減半服五
合雖多止可六七合也後用桂去朮用朮去桂此桂朮並進者
因有汗故也

傷寒八九日風濕相搏身體煩疼不能自轉側不嘔不渴脉浮虛
而澁者與桂枝附子湯主之若其人大便鞭小便自利者去桂枝
白朮附子湯主之

傷寒八九日上行風下流濕與寒相搏于皮膚間則身體

煩疼至不能轉側與不嘔不渴病在皮肉不在內也脉虛浮者氣分弱也澁者血亦枯也此因風寒濕鬱于肌膚故用桂枝附子湯辛熱善走之藥且攻且補則風寒濕自去營衛自和也若大便鞭濕在中焦也倘小便不利便有洩瀉之患今小便利而惟大便鞭則氣因濕滯且虛弱矣豈能下利白朮和中益氣且為燥濕要味故去桂而加之也

桂枝附子湯 桂枝四兩 附子炮三枚 甘草炙二兩 生姜三兩 大棗十二枚 右

五味以水六升煮取二升去渣分溫三服

桂枝以祛風附子以散寒炙甘草所以和中而安內崇土而

制溫也。附用三枚，則勇猛精進，攻補崇而邪去速矣。

白朮附子湯

白朮

四兩 附子炮三枚

甘草

炙二兩 生薑

三兩

大棗

十二枚

右五味以水六升，煮取二升，去渣，分溫三服。

邪在中焦，故去表藥，加白朮生津，可以益胃祛濕。而身體煩不能轉側，邪由經絡者，仍非附子不除也。生薑助附子，大棗助甘草，乃不易之道耳。以上四節太陽風寒濕之傷寒也。

傷寒身熱發黃者，梔子檨皮湯主之。

熱病兼濕，熱熱蒸鬱，身故熱發黃，乃濕土之色也。故用梔

子檨皮湯以清越之。

半內接濕也
外有寒...傷寒

梔子槲皮湯

梔子十五枚

槲皮一斤 甘草二兩

生一兩

右三味以水四升煮

取一升半去渣分溫再服

梔子清心去熱槲皮苦寒燥濕甘草和中補土合三味蓋輕清以越之也

傷寒八九日身黃如橘子色小便不利腹微滿者因陳蒿湯主之

濕熱鬱內至八九日身黃如橘子色之黃赤濕熱

實甚熱氣化熱傷而小便不利胃經瘀塞而腹微滿若因

陳梔子大黃上下分消高者越而下者奪未易一且平復也

因陳蒿湯 因陳六兩梔子十四枚大黃二兩右三味以水一斗先煮因

陳減二升內二味煮取三升去渣分溫三服

茵陳以清表梔子以清內外夾清但色黃赤如橘子小便不利而腹微滿大腸已見壅塞若非大黃下奪大便行小便亦利不能速清也越人云陽盛之症下之則愈正古法也以上二節太陽濕熱之傷寒也

濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則噦胸滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胸中有寒渴欲得水而不能飲則

口燥煩也

太陽中濕則膀胱經行之地俱病故頭汗出背強心陽不舒欲

得被向火也。中有寒熱相并之勢。當去熱或去寒。然後行逐水之功。則病乃愈。若下之早。則氣益逆。而噦或胸滿。小便不利。舌上如苔矣。蓋濕滯則氣化不行。而火熾。故以丹田有熱。胸中有寒。為斷。必至欲飲而不能。口燥煩矣。因有熱。故欲飲。因有寒。故不能。寒熱相并。陰陽不調。燥煩不亦宜乎。

傷寒瘧熱在裡。身必發黃。麻黃連翹赤小豆湯主之。

瘧熱在裡者。內有濕熱。外寒束之。濕熱不得透越。瘧發而成黃也。故用麻黃連翹赤小豆湯。散外寒。以清濕熱。

麻黃連翹赤小豆湯

麻黃

去節

連翹

赤小豆

升

杏仁

去皮

炙

四十九粒

甘草

炙二兩

生姜

二兩

大棗

十二枚

生梓白皮

升一

右八味

以潦水一斗

先煮麻

再沸去查

內諸藥

煮取三升

分溫三服

半日服盡

麻黃

生薑

以散寒

連翹

梓皮

以清熱

赤豆

以燔濕

大棗

甘草

以

扶土

杏仁

一以利氣

化潦水

早潦之

水土氣

重所以

制濕也

半

日盡

三服者

以溫熱

在內

寒在

外

內外俱

病陰陽

龐雜

治不可

緩也

以上二

節內

溫熱

外寒

之物

寒也

大陽病

發熱

汗出不

惡寒者

名曰柔

痊宜括

萎桂枝

湯

柔痊者

風寒傷

而不能

轉運也

風性漂

悍輕捷

不如寒

邪之促

急

風為陽

邪故汗

以下太陽濕流因
命之傷寒

括萎桂枝湯 括萎根三桂枝三甘草二芍藥三生薑三

大棗十二右六味以水七升微火煮取三升去渣遶寒溫服

一升服已歔熱粥一盃以助藥力

此方即桂枝湯加花粉也桂枝以治風花粉以潤肺之氣化

行則水道通溫自下逐而和矣

瘥為病胸滿口噤卧不着席脚掌急必介齒可與大承氣湯

風為陽邪通于肝主筋濕為陰邪通于脾主肌肉風濕兩

傷則肌肉筋皆緊急而短矣肝不散精脾不健運故胸滿口者

脾之合凡濕乘脾故口噤脾病則肉痛脾病則筋痛故卧不着

席溫傷筋則突短故脚攣急介兩開也齒乃骨之飲溫熱傷骨
病故齒開大承氣湯清熱下湧之方可者僅可而未善之詞
言亦可一試也

大承氣湯

大黃

兩四

厚朴

半兩

枳實

枚五

芒硝

三合

右四味

以水一斗

先煮枳朴取五升去渣內大黃煮取二升去渣內硝更上火一
二沸分溫再服得下餘勿服

燥屎在中焦壅滯津液乾枯邪熱閉結非大黃之苦寒不足

潤下非芒硝之鹹寒不足更堅厚朴以治胸中之逆氣枳實以

洩中滯氣四味合用無不更堅不通上下大氣承順無阻故

名大承氣湯蓋瀉徑實熱之方此借以清風熱之陽邪越人云

陽盛陰虛下之而愈也

大陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛症宜葛根湯

剛症者寒濕傷筋而強急也寒主閉故無汗濕化熱故發熱寒在皮毛故反惡寒也

葛根湯

葛根四兩麻黃三兩桂枝三兩芍藥三兩甘草二兩生薑三兩大棗

十二枚右七味以一斗先煮麻黃葛根減二升去上沫內諸藥煮

取三升去查溫服一升覆取微似汗不須歠粥餘如桂枝將息

及禁忌

寒濕傷筋，屬風木，故主桂枝湯以養筋，加葛根以祛濕，麻黃以散寒，濕散而筋平，瘥自安矣。

太陽病其瘥，身體強，几然，脈反沉遲，此為瘥。括萎桂枝湯主之。

太陽病瘥，頭痛項強，發熱惡寒，瘥也。身體強，寒集太陽也。其脈應浮緊而反几然，沉遲者，寒且虛矣。筋脈既虛，而又有太陽之寒，瘥則血不養筋而瘥，故用桂枝以解肌散寒，芍藥和血，甘草姜枣和中，括萎甘緩潤下，甘則補肺而滋肝，潤則養血而舒筋，肝肺和平，筋血滋潤，則瘥自安。服藥而汗不出，飲熱粥以

助之不用葛根湯者以脉遲也

氣冲口噤不治太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛症葛根

湯主之

太陽外寒束于外故無汗寒則傷肺氣化不行故小便少肺金下降之令不行氣反上逆冲胸矣口合于脾寒則口噤舌乃聲樞寒則強而不能語也筋脉瘕勁急強硬之狀已著故欲作剛症也用葛根湯以散太陽寒濕

身重惡寒

病者身熱足寒頭項強急惡寒時頭熱面赤目赤獨顫動搖卒口噤背反張者瘕病也若發其汗者寒濕相得其表亦虛即惡寒甚

濕流關節

發其汗已其脉如蛇

身○熱○足○寒○溫○症○也○溫○傷○于○下○故○足○寒○頭○項○強○急○惡○寒○太○陽○中○寒○
溫○而○徑○行○之○地○強○急○也○頭○熱○面○目○赤○者○赤○乃○水○道○為○寒○溫○所○閉○
不○能○流○通○以○制○火○上○炎○于○頭○面○也○頭○搖○口○噤○背○反○皆○筋○脉○緊○
急○之○狀○寒○溫○傷○筋○故○急○促○而○為○瘧○溫○傷○于○裡○寒○傷○于○表○犹○各○居○
其○所○未○相○得○也○若○發○其○汗○則○寒○溫○相○得○橫○行○于○腠○理○而○表○益○虛○
故○外○衛○疎○而○惡○寒○甚○汗○發○之○後○其○脉○當○如○蛇○無○筋○身○肥○而○形○
軟○既○傷○筋○而○復○虛○其○表○筋○氣○微○弱○故○脉○大○無○力○如○蛇○肥○軟○也○
夫瘧脉按之緊如弦直上下行脉經曰瘧家其脉伏堅直上下

症者緊之故，其脉緊如弦。其弦脉者，肝脉也。肝主筋，故筋症起。其脉緊如弦，直上直下，弦之甚也。脉經古書名，伏主痛，症必痛也。故脉伏，而堅直上下，弦緊也。

太陽病發汗太過，因致症。暴致腹脹大者，為欲解。其脉如故，反伏弦者，症。

發汗太過，致津液橫流，水氣不由氣化而出，因由于骨節間而傷筋，因致症也。腹脹大病，傳脾矣。脾性緩，故能緩症之急。然必脉亦見緩，與症相應，乃若仍見伏弦之緊，脉腹雖脹大，為能緩其筋急，故仍症，症而不解也。

此春溫傷寒
溫病

太陽病發熱脉沉而細者名曰瘧為難治

太陽身熱溫瘧也脉沉細名溫痺則虛矣既虛而溫流關節成瘧治之不亦難乎故曰難治

瘧病有灸瘡難治

瘧瘧傷肝筋而成蓋肝木亢而火熾也有灸瘡則火氣與木氣相氣生內外蒸通故難治也以上十節太陽溫流關節之傷

寒也

太陽病發熱而渴不惡寒者為溫病

經曰冬傷于寒春必病溫又曰藏于精者春不病溫內經本神

論以精對神言精屬陰神屬陽也藏于精者真陰充足也水足
以制火故春不病溫冬傷于寒者冬月太陽寒水徑真陰不藏
而傷天六淫之燥火也冬月水王燥火不能為害至春日木王
之時木枯火焚火熱就燥火之邪發為溫病溫者熱也燥火
盛而真陰虛火盛故熱陰虛故渴也太陽本惡寒溫病、原燥
火故獨不惡寒也熱病論曰先夏至日為溫後夏至日為暑、
溫同病因時異名耳故同曰熱病以溫暑皆熱也惟因熱故不
病于水王之日而病于春夏木火之時也王叔和序例云乃寒
毒藏于肌膚至春變為溫病至夏變為暑病寒毒為陰何不病