

蘭室秘藏卷下

東垣老人 東垣老人陰

明 新安 明 新安 腎

○大便結燥門

○大便結燥論

金匱真言論云。北方黑色。入通腎。開竅於二陰。藏精於腎。又云。腎主大便。大便難者。取足少陰。夫腎主五液。津液潤。則大便如常。若饑飽失節。勞役過度。損傷胃氣。及食辛熱味厚之物。而助火邪。伏於血中。耗散真陰。津液虧少。故大便結燥。然結燥之病不一。有熱

燥有風燥有陽結有陰結。又有年老氣虛津液不足而結燥者。治法云。腎惡燥。急食辛以潤之。結者散之。如少陰不得大便。以辛潤之。太陰不得大便。以苦泄之。陽結者散之。陰結者溫之。仲景云。小便利而大便硬。不可攻下。以脾約丸潤之。食傷太陰。腹滿而食不化。腹響然。不能大便者。以苦藥泄之。如血燥而不能大便者。以桃仁酒製。大黃通之。風結燥而大便不行者。以麻子仁加大黃利之。如氣澀而大便不通者。以郁李仁枳實皂角仁潤之。大抵治病。必究其源。不可一槩用巴豆牽牛之類下之。損其津液。燥結愈甚。復

下復結極則以至導引於下而不通遂成不救噫可不慎哉

通幽湯

治大便難。幽門不通。上衝。吸門不開。噎塞。不便。燥秘氣不得下。治在幽門。以辛潤之。

炙甘草

紅花

已上各壹分

生地黄

熟地黄

已上各伍分

升麻

桃仁泥

當歸身

已上各壹錢

右都作一服。水二大盞。煎至一盞。去粗。調櫛榔細末五分。稍熱食前服之。

潤燥湯

升麻

生地黄

已上各貳錢

熟地黄

當歸稍

生甘草

大黃

煨

桃仁泥

麻仁

已上各壹錢

紅花

伍分

右除桃仁麻仁另研如泥外。剉如麻豆大。都作一服。水二盞。入桃仁麻仁泥煎至一盞。去粗。空心稍熱服。

潤腸丸

治脾胃中伏火。大便秘澀。或乾燥閉塞不通。全不思食。及風結血秘。皆令閉塞也。以潤燥和血疎風。

自然通利矣

桃仁

湯浸去皮尖

麻仁

已上各壹兩

當歸稍

大黃

煨

羌活

已上各壹錢

右除桃仁麻仁另研如泥外。搗爲極細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸。空心白湯下。如病人不大便。爲大便不通而澀。其邪盛者。急加酒洗大黃以利之。

如血燥而大便燥乾者。加桃仁酒洗大黃。

如風結燥大便不行者。加麻仁大黃。

如風濕而大便不行。加煨皂角仁大黃。秦艽以利之。

如脉澀覺身有氣澀而大便不通者加郁李仁大黃以除氣燥

如寒陰之病爲寒結閉而大便不通者以局方中半硫丸或加煎附子乾薑湯冰冷與之其病雖陰寒△之證當服陽藥補之若大便不通者亦當十服中與一服藥微通其大便不令結閉乃治之大法

若病人雖是陰證或是陰寒之證其病顯燥脉實堅亦宜於陽藥中少加苦寒之藥以去熱燥燥止勿加

如陰燥欲坐井中者其二腎脉按之必虛或沉細而

遲此易爲辯耳。知有客邪之病，亦當從權加藥以去之。

○ 麻黃白朮湯

△ 治大便不通五日一遍，小便黃赤，渾身腫，面上及腹尤甚。其色黃麻木，身重如山，沉困無力，四肢痿軟，不能舉動，喘促唾清水，吐噦痰唾白沫如膠，時躁熱發，欲去衣，須臾熱過振寒，項額有時如冰，額寒尤甚，頭旋眼黑，目中溜火，冷淚，鼻不聞香臭，少腹急痛，當臍中動氣，按之堅硬而痛。

青皮 去腐

酒黃連 已上各壹分 酒黃蘗

橘紅

甘草炙半

升麻已上各貳分

○黃芪

○人參

○桂枝

○白朮

厚朴

○柴胡

蒼朮

猪苓已上各參分

吳茱萸

白茯苓

澤瀉已上各肆分

白豆蔻

炒麴

已上各伍分

○麻黃不去節伍錢

杏仁肆箇

右㕮咀分作二服水二大盞半先煎麻黃令沸去

沫再入諸藥同煎至一盞去粗稍熱食遠服

△此證宿有風濕熱伏於榮血之中其木火乘於陽

道爲上盛元氣短少上喘爲陰火傷其氣四肢痿

在腎水之間。乃所勝之病。今正遇冬寒得時。乘其
肝木。又實其母。肺金尅木。凌火。是大勝。必有大復。
其證善恐。欠多嚏。鼻中如有物。不聞香臭。目視眊
眊。多悲健忘。少腹急痛。通身黃。腹大脹。面目腫。尤
甚。食不下。痰唾涕有血。目背瘍。大便不通。並宜此
藥治之。

升陽湯

一名升陽瀉濕湯

治膈咽不通。逆氣裏急。太便不行。

青皮

槐子

已上各
貳分

生地黃

熟地黃

黃蘗

已上各
參分

當歸身

甘草梢

已上各肆分

蒼朮

伍分

升麻

柒分

黃芪

壹錢

桃仁

拾箇另研

右咬咀如麻豆大都作一服入桃仁泥水二大盞煎至一盞去粗稍熱食前服

活血潤燥丸

治大便秘血秘常常燥結

當歸稍

壹錢

防風

叁錢

大黃

濕紙裹煨

羌活

已上各壹兩

皂角仁

燒存性去皮壹兩伍錢其性得濕則滑濕滑則

燥結自除

桃仁

貳兩研如泥

麻仁

貳兩伍錢研如泥

右除麻仁桃仁另研如泥外為極細末煉蜜為丸

如梧桐子大每服五十丸白湯下三兩服後須以
蘇麻子粥每日早晚食之大便日久不能結燥也
以磁器盛之紙封無令見風

潤腸湯

治大腸結燥不通

生地黃

生甘草

已上各壹錢

大黃

煨

熟地黃

當歸梢

升麻

桃仁

麻仁

已上各壹錢

紅花

叁分

右㕮咀水二盞煎至一盞去粗食遠溫服

○小便淋閉門

○小便淋閉論

難經云病有關有格。關則不得小便。又云關無出之。謂皆邪熱爲病也。分在氣在血而治之。以渴與不渴而辨之。如渴而小便不利者。是熱在上焦肺之分。故渴而小便不利也。夫小便者。是足太陽膀胱經所主也。長生於申。申者西方金也。肺合生水。若肺中有熱。不能生水。是絕其水之源。經云虛則補其母。宜清肺而滋其化源也。故當從肺之分。助其秋令。水自生焉。又如雨如露如霜。皆從天而降下也。乃陽中之陰。明秋氣自天而降下也。且藥有氣之薄者。乃陽中之陰。

是感秋清肅殺之氣而生可以補肺之不足淡味滲
泄之藥是也茯苓澤瀉琥珀燈心通草車前子木通
瞿麥扁蓄之類以清肺之氣泄其火資水之上源也
如不渴而小便不通者熱在下焦血分故不渴而大
燥小便不通也熱閉於下焦者腎也膀胱也乃陰中
之陰陰受熱邪閉塞其流易上老云寒在胸中遏絕
不入熱在下焦填塞不便須用感北方寒水之化氣
味俱陰之藥以除其熱泄其閉塞內經云無陽則陰
無以生無陰則陽無以化若服淡滲之藥其性乃陽
中之陰非純陽之劑陽無以化何能補重陰之不足

也。須用感地之水運而生。大苦之味感天之寒藥而
生。大寒之氣。此氣味俱陰。乃陰中之陰也。大寒之氣
人稟之生膀胱。寒水之運。人感之生腎。此藥能補腎
與膀胱。受陽中之陽。熱火之邪而閉其下焦。使小便
不通也。夫用大苦寒之藥。治法當寒因熱用。又云必
伏其所主。而先其所因。其始則氣同。其終則氣異也。

通關丸 一名滋腎丸

治不渴而小便閉。熱在下焦血分也。

黃蘗

去皮剉酒洗焙

知母

剉酒洗焙乾已上各壹兩

肉桂

伍分

右爲細末。熟水爲丸。如梧桐子大。每服一百丸。空

心白湯下頓兩足令藥易下行故也如小便利前
陰中如刀刺痛當有惡物下爲驗

清肺飲子

治渴而小便閉澀不利邪熱在上焦氣分

燈心 壹分

通草 貳分

澤瀉

瞿麥

琥珀 已上各伍分

扁蓄

木通 已上各柒分

車前子 炒壹錢

茯苓 去皮貳錢

猪苓 去皮叁錢

右爲麤末每服五錢水一盞半煎至一盞稍熟食
遠服或局方八正散五苓散亦宜服之

導氣除燥湯

治小便閉塞不通乃血澀至氣不通而竅澀也

茯苓

去皮

滑石

炒黃已上各貳錢

知母

細剉酒洗

澤瀉

已上各叁錢

黃蘗

去皮酒洗肆錢

右㕮咀每服五錢水三盞煎至一盞去粗稍熟空

心服

如急閉不拘時服

腎疸湯

治腎疸目黃甚至渾身黃小便赤澀

羌活

防風

藁本