

52

7447

精校
醫學入門

上海錦章圖書局
印行
七



編註醫學入門外集卷之六

婦人門

經候

經病百端血滯枯

婦人以血為主。天真氣降。壬癸水合。腎氣全盛。血脈流行。常以三旬一見。以象月盈。則

或內傷生。冷七情鬱結。為痰為瘕。凝積於中。曰血滯。或經時餘血一點未淨。或外被風寒。及濕。冷暑熱邪氣。動邪氣。感而津血衰。曰血枯。良方云。經後被驚。則血氣錯亂。妄行逆於上。則從口鼻而出。逆於身。則血相搏。變為水腫。恙怒。則氣血逆於腰腿。心腹背脇手足之間。重痛。經行則發。過期則止。怒極傷肝。則有眩暈。嘔血。羸歷血風。瘡瘍等病。加之經血滲漏。於其間。遂成窠穴。生瘡淋瀝。不斷。漏熱相搏。遂為崩帶。血結

於內。變為癥瘕。凡此變症。百出。不過血滯與枯而已。但血滯亦有虛熱。血枯亦有虛寒。故重則經閉不通。以帶枯分言。輕則經水不調。止言虛與熱而已。滯宜破。血枯補虛。血滯經閉。亦有虛熱。故重則經閉不通。以帶枯分言。輕則經水不調。止言虛與熱而已。滯宜破。血枯補虛。血滯經閉。因飲食熱毒。或暴怒。凝於積痰。直須大黃乾漆之類。推陳致新。俾舊血消而新血生也。若氣旺血枯。起於勞役。憂思。却宜溫和滋補。或兼有痰火。濕熱。尤宜清之。涼之。每以肉桂為佐者。熱則血行也。但不可純服峻藥。以虧陰道。至於耗氣益血之說。雖女科要法。但血為氣配。氣熱則熱氣寒。則寒氣升。則升氣降。則降。氣行則行。氣滯則滯。如果鬱火氣盛。於血者。方可單香附丸。散仰氣散。當加木香。枳殼。枳實。以開鬱行氣。

若氣亂。則調氣。冷則溫。氣虛則補。男女一般。陽生則陰自長。氣衰則血亦涸。豈可尚耗其氣耶。論者多泥叔和血旺氣衰。不知叔和論肝肺二脉。則宜肝旺於肺。其寔氣血平和。有孕故經曰。兩臟通和。但婦人見偏性。鄙婢妄志。不得伸。鬱怒無時。不起。故香附為女滯。因外感傷冷鬱。經行登廁。風寒入內。以致凝滯者。人仙鈞經曰。邪氣盛。則寔正氣奪。則虛。可不悟諸。滯因外感傷冷鬱。經行登廁。風寒入內。以致凝滯者。閉不通。或寒或暑。俱謂之熱。入血室。小柴胡湯。加生地。或黃芩。芍藥。湯。加生地。經行過食。生冷。或外被冷濕。以致瘀血凝結者。五積散。去麻黃。加牡丹皮。紅花。〇七情心氣鬱結。不行者。分心氣飲。去羌活。半夏。桑

皮。青皮。加川芎。當歸。香附。義木。玄胡。索。有火者。更加黃芩。或小調經散。單香附丸。也有感寒次宣疏。氣血盛寔。經絡過開。或時按痰者。單大黃。膏歸煎。枯傷勞食。或作池。內傷飲食。勞倦。損傷脾胃。氣弱體倦。發熱。腹痛。腸鳴。飲食減少。而不生血者。補中湯下。錢空。心水煎。或單蒼朮。膏。水。池。少食者。升陽益胃湯。無泄少食者。二陳湯。加白濕痰胃熱分肥癯。濕

木黃芪。便製香附。當歸。芍藥。壯丹。皮。麥門冬。山查。麥芽。因飲食積者。更加義木。枳殼。白濕痰胃熱分肥癯。濕粘住血海地位。經閉者。導痰湯。加川芎。黃連。不可服地黃。泥膈故也。如用須薑汁炒過。〇胃熱消渴。善食漸瘦。津液為熱燥渴者。宜瀉胃熱。四物湯。合調胃承氣湯。名玉燭散。再合涼膈散。名三和散。輕者小柴胡

婦人門 經候 上海錦章圖書局印行

湯合四物湯去人參半夏加天花粉○素虛形瘦口燥善食厚味鬱為痰火有潮者逍遙散加脫血入房
黃芩無薄荷四物湯加桃仁紅花或加味養榮丸大醫肥人多氣弱有濕痰瘦人多血怯有火脫血入房

胞氣竭○少年大脫血或醉後入房氣或產育過勞墮胎及多產育傷血或誤服汗下剋伐之不通天

概只如此○紅花當歸散紫葳散通經丸導經丸之類虛者只用當歸散以通之通後又須養血益陰使津

液流通苟不務氣血充和而惟以毒藥攻逼是求千金不調前後色何如○以期言之對期者性和血足

乞巧必死而後已○以上言經水不通以下言經水不調不調前後色何如○以期言之對期者性和血足

為害以色言之心主血陰從陽故以毒藥攻逼是求千金不調不調前後色何如○以期言之對期者性和血足

色紅為正雖不對期而色正者易調後期來少血不足○後期三五日者為血虛四物湯加參黃白朮陳皮

花肥人多痰二陳湯加南星蒼朮滑石芎歸香附○來少色和者四物湯點滴微開潮煩脈數者四物湯

去芎地加澤蘭葉三倍甘草許十味香附丸內寒血流來少或四日少五六日以上者四物湯加桃仁紅

花牡丹皮莢花先期來多血有餘○四物湯加黃芩柴胡香附肥人清海蒼莎丸加黃連白朮○來多或日多五六

日以上者內熱血散也○四物湯加蒼朮瘦人○或前或後氣血○一月再至當歸散調經散散單丹參散淋瀝

有火者固經丸肥人多痰者清海蒼莎丸○或前或後氣血○一月再至當歸散調經散散單丹參散淋瀝

不斷邪未疎○時行時止淋瀝不絕腹中作疼乃寒熱邪氣客於胞中留滯血海外疼也○如有積下利不定

腹痛者牛膝散或行或止心痛者失笑散經水適來適斷往來寒熱者先服小柴胡湯加地黃後以四物

湯和之有月事頻數者四物湯倍芍藥加黃芪有經行不止者四物湯加地榆阿膠荊芥熱者倍黃芩或

經丸風熱色紫甚則黑淡因痰滯濕糲糊○色紫者風也黑者熱甚也淡白者虛也或挾痰停水以混之也
生片色不變者氣滯也或風冷乘之也○色變紫黑者血熱也○大醫紫者四物湯加防風白芷荊芥黑者
四物湯加芩連香附淡白者古芎歸湯加參芪白芍香附有痰者二陳湯加芎歸如煙塵白芷荊芥黑者
芩防風蒼朮如豆汁者四物湯加芩連成塊者四物湯加香附玄胡○外症潮熱內腹痛○月水循環繼病不
索枳殼陳皮隨症選用○通用琥珀調經丸百子附歸丸黑附丸○外症潮熱內腹痛○月水循環繼病不
疼重則加之咳血汗喘或瀉有潮汗則血愈消耗有咳嗽則氣往上行瀉則津偏於後疼則積結於中是
以必先治病而後可以滋血調經就中潮熱疼痛尤為婦女常病蓋血滯積入骨髓便為骨蒸血滯積瘀
於中與日生新血相搏則為疼痛血枯不能滋養百骸則骨熱於外血枯胞經火盛或挾痰氣食積寒冷
外邪則為疼痛○潮熱有時為內傷為虛無時為外感為寔虛者大溫經湯熱者四物湯加柴芩經閉者
滋血湯骨蒸者大胡連丸六烏雞丸五心潮者四物湯加黃連胡黃連無汗者茯苓補心湯有汗者逍遙
散經前潮者血虛有滯逍遙散加牡丹皮桃仁玄胡索經後潮者血虛有熱逍遙散去柴胡換地骨皮加

芩甘草
水煎服

崩漏

崩漏有虛亦有熱熱則流通虛溜泄

血熱則流虛則溜凡非時血行淋瀝不已謂之漏下虛多房勞挾火

邪經行犯房及勞役過度損傷衝任氣血俱虛不能制約經血忽然暴下宜大補氣血大溫經湯最虛者

肝散一切虛症丙火散虛火涼血地黃湯生地黃湯補陰丸久者當歸部骨丸大小烏雞丸熱則飲食不調節

黃芩湯解毒四物湯涼血地黃湯膠艾四物湯加黃芩或單芩心丸四物坎離丸因經丸○有因飲食失節

火乘脾胃下陷顏容似無病者外見脾困倦煩熱不臥等症經水不時暴至或適來適斷只宜舉養脾胃

加以鎮墜心火之藥補陰瀉陽或四氣香相侵子宮為四氣相搏則血亦難停大舉風冷搏動者五積

自止升陽調經湯升陽舉經湯或因四氣香相侵子宮為四氣相搏則血亦難停大舉風冷搏動者五積

四物湯加荊芥○寒冷所乘及年老久崩者伏龍肝散加附子鹿茸阿膠蒲黃或為悲憂心痛切悲哀甚則

黃糯米糊丸服○暑月單芩心丸或益元散加百草霜○濕者升陽除濕湯或為悲憂心痛切悲哀甚則

絡絕則陽氣內動發則心下崩數泄血也宜備金散四製香附丸烏藥湯或橘歸丸○憂鬱因先富後貧

先順後逆心事不足鬱火旺於血脈之中宜四物湯加香附白朮各一錢地榆黃芪大參各五分升麻二

分甚者加棕櫚反酒調服○心痛甚者名殺血心痛小產勢急須宜止且行經曰陰搏陽謂之崩言屬熱

後血過多心痛者亦同用烏賊魚墨炒為末醋湯調服

故道淳滋妄行遽止便有積瘀凝成窠血不止又恐昏暈必先服五靈脂末一錢其性能行能止然後分

虛熱用調和氣血之藥一二貼後再服單五靈脂散去故生新如更不止烏紗帽散十灰散古黑神散單

帶下

帶下赤白皆濕熱臍腹痛甚濕熱結經曰小腹寬熱泄出白液寬者濕熱屈曲凝滯結於小腹自脫上而

頭昏目眩口苦舌乾咽嗌大便或閉或瀉小便便流皆熱症也如赤白崩漏一脈但不痛耳間有病者濕熱

涕穢甚則肚腹引痛婦人服食燥熱性行乖戾以致肝旺脾弱而生濕熱熱則流通古人有用導水丸下

之繼以淡劑參之或苦練丸大玄胡索散調之如膽腹病者暫以辛溫開導如大溫經湯補經固真湯龜柏羌活三益分三次服或白芷散單益母丸○白帶黃痰作孽

大帶不止者用地骨皮一兩生牛膝二兩黃芩三錢或蒼朮白帶并陽燥濕湯四炒固真丹○濕熱流注入膝腿直黃痰作孽

肥人多濕身黃脾緩陰戶如水或痛白帶并陽燥濕湯四炒固真丹○濕熱流注入膝腿直液下數丸候鬱積開服

虛加四物湯氣虛加參朮陳皮火動加黃柏滑久加龍骨赤石脂性燥加黃連腹痛如乾薑問有虛寒帶臭腥陰中冷痛何曾歇

建中湯去桂加當歸水煎吞苦練丸久不止臍腹引陰冷痛者東垣固真丸虛中有火者補經固真湯大烏雞丸常用氣虛四君子湯血虛四物湯有火加黃柏有寒加桂附○寒始因亡血復亡其陽之氣虛延

附帶下腥臭多悲不樂附桂湯腹痛陰冷者四物湯加桂外感風邪傳各經臍腹若傷肝經青如泥色心經赤如紅津肺經白如涕脾經黃如爛肝經黑如血

血宜胃風湯或五積散去麻黃主之通用單地榆散一種白淫思慮切思無窮所願不得意淫於外淫大同多憂思過度所致誠難治療宜平補銷心丹因思傷脾胃者四七湯下白丸或歸脾湯病悶少

謂白物淫如白精之狀不可誤作白帶過服熱藥約又有日夜流津如清米泔或如精膠者謂之白萌與白淫者沉香降氣湯因勞傷腎氣心腎不交者室女胎產法相同當風取涼故經水止而即患帶下宜琥珀

金鎖正元丹小兒絲子丸或喜丸或砥苓丸室女胎產法相同當風取涼故經水止而即患帶下宜琥珀砂砂丸○孕婦帶下全是濕熱宜苕菜楊皮丸○平時陰陽過多產後亡血及下虛風補衛調脾循故轍

邪乘虛入於胞絡宜暖宮丸加薑附吳萸或黃芪建中湯去桂加當歸水煎吞苦練丸補衛調脾循故轍凡崩中帶下或用升提如升陽調經湯或用收澀如伏龍肝散白芷散然暫止而終不止者蓋衛司開闔

而為解血之主脾胃為血海水液之會衛氣與胃氣俱虛則血液無所約制是以古方有用桂枝湯加附子以固衛氣者四君子湯加草果丁香木香以燉脾健脾者或用理中湯加陳皮半夏或單半夏丸

用芎歸煎湯下或補中益氣湯平胃散皆補衛厚脾使氣血日循故轍而不專於收澀以劫奪之也癥瘕與男子積聚條參看

癥瘕冷熱都是癥或因食積或鬱癥者堅而不走癥者堅而能移七癥八瘕經亦不詳雖有蛇或蟹肉以異於男子者皆因疾發及經水行時或飲食生冷以致脾虛與臟氣相結或七情氣鬱生痰皆必挾痰

血而後成形要知癥瘕症癰有癥腸胃食癥血癥食癥血癥種種不一盡皆痞塊之異名耳○經云大腸

醫學入門癥瘕

上海錦會圖書局印行

癥瘕冷熱都是癥或因食積或鬱癥者堅而不走癥者堅而能移七癥八瘕經亦不詳雖有蛇或蟹肉

以異於男子者皆因疾發及經水行時或飲食生冷以致脾虛與臟氣相結或七情氣鬱生痰皆必挾痰

血而後成形要知癥瘕症癰有癥腸胃食癥血癥食癥血癥種種不一盡皆痞塊之異名耳○經云大腸

移熱於小腸小腸移熱於大腸兩熱相搏則血溢而為伏瘕月事不和以此推之瘕瘕皆有熱者蓋瘕血亦有熱燥逼成况腸氣怒火益聚飲食濕熱拂鬱結成未可專以寒冷論也大聚虛冷者內灸散現珀丸
血四物湯加桃仁薑汁甚者和如蜀血根入玄胡粉下之故桂枝桃仁湯外以韭菜搗餅餅連芍藥川芎氣鬱散
甘草散單黃連丸小調中湯加貝母薑汁糊丸服○鬱氣白葱散蠅蟲散天承氣湯附黃連芍藥丸
飲潤下丸或二陳湯加香附枳壳腹痛經閉如懷胎面黃寒熱夢無數瘕瘕得冷則發腹痛文瀾胎痛
指梗瘕瘕食積者百芥丸海石丸
胎之狀邪氣甚盛令人恍惚夜多異夢寒熱往來四肢不舉陰中生瘡甚者小便淋瀝或兼帶下小腹重
痛面色黃黑入於子臟則絕產入於胞絡則經閉宜入參荊芥散小溫經湯通散通經丸
用○血與氣併心腹痛連腰脇背脊甚則搖擗經候不調謂之血瘀玄
胡索散手拈散失笑散單乾膝丸數症因痰瘀氣積者與上諸方通用瘕瘕病治頗相同
條筋脉急痛如臂如指如弦之狀名曰瘕瘕者偏斜在兩肋之間有腹脹不食亦可懼
時而痛名曰瘕皆陰陽不和飲食停滯冷氣相搏而成亦得冷則發腹脹不食亦可懼
腸覃可按血自通腸覃乃寒氣客於大腸與胃相搏犬腸為肺傳送肺主氣氣得熱則行得冷則凝凝則
移月事時下或多或少或氣病而血未病清氣散而濁氣結而為瘕覃延日久不已瘕肉乃生始如雞卵久則懷
也宜二陳湯加香附以開之或香粉丸石症塞胞經無路女子瘕瘕氣發則腹痛逆氣上衝乃胞中傷
胎月事不下乃先感寒氣而後血壅不流所致血瘕石瘕氣血瘕散
聚湯症瘕瘕香丹古硝黃膏石瘕見現丹主之或通經丸加紅花尤妙氣瘕血瘕堅如石水瘕腫滿俱難
治瘕者三虫聚而食血之象即瘕瘕之甚者壯腹急硬如石腫滿如水乃瘕結胞門或產後為水與血搏
通用四香散千金桃仁煎內消散蠅蟲煮肚法抱聖丸黃米丸單腹瘕瘕者大腹皮飲救之詳男科腫
脹調氣破血漸消除虛者還宜補脾胃善治瘕瘕者調其氣而破其血消其食而豁其痰聚其大半而止
之由名也愈後宜大小烏雞丸八珍湯交加散交加地黃丸調之凡攻擊之藥病
重病受病輕胃氣受之而傷矣或云待塊消盡而後補養則胃氣之存也幾希

胎前

胎前清熱與養血

婦人無病月事時下乃能受孕氣血充寔則可保十月保婉子母無虞若銜任不充偶

後受孕或孕後挾熱及七情勞役動火輕則胎動不安重則過三五七陽月必墮火能消物故也月分依
宜安胎丸常服以清其熱熱清則血循經而不妄行所以養胎也謬云胎前不宜熱良有以哉

經善調變。各經氣血多少虛實不調則胎孕不安。一足厥陰二少陽。夫人之有生也母之血室方開父之

精血乘冲氣自旋轉不息如蟻之蟻真若咬含受成一團團璇璣九日一息不停然後陰陽大定。黃相色外似蠶絲瑤瑤其中自然虛成一竅空洞虛圓與離子黃中一火相似而團圓之外氣自凝結為

胞衣初薄漸厚如彼米飲豆漿面上目結一皮中數日生從無入有精血日化從有入無九自半後又九

又九月二十七日即成一月之數。或自然凝成一粒如露珠然乃太極動而生陽天一生水謂之胚足感

陰脉所主也。此月經閉無潮無痛飲食稍異平日不可觸犯及輕率服藥。○又三十九日即成二月之數

此露珠變成赤色如桃花瓣子乃太極靜而生陰地二生火謂之脾足少陽脉所主也。此月腹中或動或

止能養胎而虛也。二三月月間忽心腹痛不安者用當歸三錢阿膠甘草各一錢蔥四莖煎服。二四胞絡

三焦訣。雄二器先就分明其諸全體隱然可悉。斯謂之胎乃太極之乾道成男坤道成女。手厥陰脉相火

所主胎最易動。古苓米湯或為丸類服最妙。如無惡阻等症胎有可疑者用驗胎法以川芎為末一錢五

更艾湯調服。服後腹中不覺動者則為經病。如覺微動者則為有孕。或因驚恐墮胎氣不和轉動不能

膈腹疼痛者溫酒調下二錢。如當歸尤妙。如胎不安及腰背痛不可忍者古桂續丸。○四月男女已分始

受水精以成血脉形像具六腑順成。手少陽脉所主。多心腹膨脹飲食難消甚者用平胃散換白朮加香

附烏約大腹皮如因驚恐動胎下墜小腹引腰脇小便疼痛下血者當歸湯四五。五脾六胃七肺金。五

個月忽心腹膨脹者用大棗十四枚炒黑鹽一錢燒赤為末取一撮酒調服之立愈。五脾六胃七肺金。五

始受火精以成陰陽之氣筋骨四肢已成毛髮始生足太陰脉所主。○六月始受金精以成筋口目皆成

足陽明脉所主。五六月胎不安者要胎飲固胎散。選用。○七月始受木精以成皮膚主如胎不安者單砂仁畧

常處者亦名阻病宜旋覆花散。八手陽明成數穴。能動右手手陽明脉所主。如胎不安者單砂仁畧

炒為末米飲下止痛行氣甚捷。但非八九。九腎十膀胱神氣完。九月胎受石精以成皮毛百節畢備三轉其

個月內不可多服如胎肥大者東胎丸。九腎十膀胱神氣完。身足少陰脉所主。○十月受氣足五臟六腑

衝通納天地氣於丹田使關節人神皆備足太陽脉所主。惟手少陰太陽經無所專主者以君王之

宮無為而已。此兩月素難產者達生散素肥感及奉養安逆太過者枳甘散素怯弱者益氣散生散。半產

須防三七月。半產多在三五個月及七個月內。若前次三個月而墮則下次必如期復然。凡半產後須多

防三月之墮。至四個月後再服八九貼。防過五月又至六。間有傷感并雜症。常感風咳嗽頭痛發熱參

蘇飲去半夏熱服令肌體微潤而已。風熱甚者雙解散去硝黃麻黃石膏。○感寒胸滿欲嘔苦腹滿痛犬

便清者大正氣散去半夏加異黃阿膠。○感暑眩冒煩渴尿赤驚惕嘔吐臍下苦急者香如散合古苓木

胎前。上海錦章圖書局印行。

湯或下味香茹散。感濕暖服身重者。平胃散。泄者。三白湯。加砂仁厚朴蒼木。內熱加黃芩。○內傷七情。氣滯不行者。紫蘇飲。○內傷勞役以後。小腹常墮。甚則子宮墮出者。氣陷也。補中益氣湯。如困房勞者。八。傷湯。加酒炒黃芪。為君。防風升麻。為使。○內傷飲食。胸膈滿痛者。平胃散。換白朮。加山渣。麥芽。黃連。○內。傷薑椒熱酒腥羶炙。燻以致胎熱。令母兩目失明。頭痛。腮腫。項強者。消風散。或四物湯。加芩連。荆防。○內。傷生冷。水血。或外又感寒。以致胎冷。不轉。臍腹絞痛。腸鳴。泄瀉者。宜從權。以理中湯。之。劑。治之。泄甚。如木。香。詞子。陳皮。白芍。藥米。中病即止。○因感傷。以致胎虛。寒者。八物湯。加吳茱。黃。阿膠。病原。謂風。冷。傷。於。下。臟。而墮者。此類間亦有之。非常法也。○雜病。與男子。一。同。但孕婦。服藥。忌。不。犯。則。不。動。胎。如。子。產。熱。多。清。脾。飲。去。半。夏。寒。多。人。參。養。胃。湯。去。半。夏。又。不。愈。者。勝。全。丹。截。之。胎。病。熱。者。古。芩。朮。湯。黃。芩。少。陽。天。胎。已。行。香。連。丸。傷。冷。瘧。痢。交。作。者。理。脾。飲。去。胎。驚。心。中。怔。忡。調。治。須。知。三。禁。法。婦。人。天。癸。未。行。屬。少。陽。天。癸。已。行。睡。臥。不。寧。熱。者。蘇。砂。安。神。丸。虛。者。定。志。丸。餘。可。類。推。

病治厥陰經者是祖化之源也。治無犯胃氣及上二焦為三禁。不可汗下利小便是也。汗則病滿下則傷脾。利小便則亡津液。舊以四物湯為主。如傷寒各經加減法。例莫若外感時氣。從四物湯合小柴胡湯。陰症四物湯合理中湯。古芩朮湯。傷寒最妙。雜病四物湯。四君子湯。二陳湯。加減間有服毒藥而不致胎動者。乃病邪重。胎元寔也。豈可視為常法。且陰陽調和者。不可妄服藥餌。三五月前。一毫辛散。滑利。禁用。七八月間。倘秘結者。乃散滑利。又當審其素慣墮胎及難產。斟酌用之。

胎動心腹腰作疼。甚則下血如經行。或因七情氣不順。或因外感風寒。經原挾風寒而受胎。或因喜怒不常。或因衝任二。致胎動。而母心腹作痛。甚則腰痛。下血。當安胎。而母自定。○胎動因七情氣逆。心腹脹滿。疼痛者。紫蘇散。因外感發熱。頭痛。嘔逆。胸脅脹滿者。安胎飲。如柴胡大腹皮。氣血虛者。安胎飲。倍參朮。服熱者。固胎飲。○腹。痛。服。安。胎。藥。不。止。者。須。辨。寒。熱。虛。實。寒。者。理。中。湯。加。砂。仁。香。附。熱。者。黃。芩。湯。血。虛。胎。痛。者。四。物。湯。或。平。胃。散。加。蘇。鹽。煎。湯。吞。二。宜。丸。氣。虛。痛。者。四。君。子。湯。加。芍。藥。當。歸。氣。寒。心。腹。作。痛。者。用。香。附。枳。殼。等。分。為。末。空。心。白。湯。下。○心。痛。寒。者。艾。葉。小。茴。川。練。等。分。空。心。水。煎。或。單。豆。蔻。丸。熱。者。二。陳。湯。去。半。夏。加。山。梔。黃。芩。○心。腹。痛。素。有。冷。氣。腹。痛。衝。心。如。刀。刺。者。四。物。湯。去。地。黃。加。茯苓。厚。朴。人。參。吳。茱。萸。桔。梗。枳。殼。甘。草。水。煎。服。心。腹。大。痛。氣。欲。絕。者。古。芩。歸。湯。加。茯苓。厚。朴。等。分。水。煎。服。單。方。用。鯉。魚。如。食。治。入。大。棗。十。四。枚。炒。鹽。一。錢。酒。少。許。煮。汁。飲。之。不。飲。酒。者。用。鯉。魚。和。梗。米。薑。葱。煮。粥。十。日。一。食。善。能。護。胎。長。胎。○腰。痛。最。為。緊。急。酸。痛。者。必。欲。產。也。因。七。情。者。紫。蘇。飲。加。杜。仲。續。斷。因。閃。倒。者。用。破。故。紙。二。錢。為。末。胡。桃。肉。一。個。研。勻。空。心。酒。調。服。素。虛。痛。者。青。娥。丸。腰。痛。如。折。不。能。轉。側。者。用。鹿。角。五。錢。火。煨。酒。淬。再。煨。再。淬。以。碎。為。度。研。末。酒。調。服。○胎。痛。下。血。者。膠。艾。湯。歸。湯。或。加。砂。仁。泰。荒。卷。柏。桑。螵。蛸。桑。寄生。杜。仲。下。血。腹。痛。難。忍。或。下。黃。汁。如。漆。如。豆。汁。者。用。野。苧。根。金。銀。花。根。各。五。錢。水。酒。各。半。盞。煎。服。下。血。產。門。痛。者。用。單。黃。連。末。一。錢。酒。調。服。或。因。

母病或壓墜。有因母病以致胎動者。但治母病而胎自安矣。如母有宿疾而胎不旺者。長胎白朮丸。有贏瘦。初。痰。氣。血。枯。竭。胎。終。不。可。保。者。用。牛。膝。四。分。木。香。桂。心。蟹。爪。各。二。分。為。末。空。心。溫。酒。調。服。

下之免害其分挽又用紅酒燒五兩清酒十盞煎二沸去渣分五服隔宿再服次早再服其子如紫令母
肥感無疾或麥芽神效煎服尋常古考歸湯最妙○孕婦或從高墜下重物所壓致動胎心小腹痛食下
胎即安胎家無所不治功同參朮如去血過多者古考歸湯加膠艾健脾胃養血總安胎通古考朮湯加
豆豉寒加葱白或乾生薑少許熱加天花粉寒熱加蘇胡項強加葱白濕熱腹痛加芍藥腹脹加厚朴下
血加艾葉地榆膠艾加杜仲驚悸加黃連煩渴加麥門冬烏梅思慮過加茯神痰喘加旋覆花半夏歸
役加黃芪氣喘去白朮加香附便燥加麻子仁素懷難產加枳殼蘇葉素懷墮胎加杜仲素血虛加芎歸
此安胎之聖藥也凡卒有所下急則一日三五服緩則五日十日一服常服安胎易產所生男女又无胎
毒蓋妊婦脾土運化遲滯則生濕濕則生熱故用黃芩清熱以養血白
木健脾以燥濕安胎九金匱當歸散散味養榮丸皆此方而推之也

胎漏下血腹不痛胎動不痛而下血者為胎漏血多為熱少為虛熱者下血必多內熱作渴者四物湯加白朮
片者三補丸加香附白芍○血虛來少者古膠艾湯或合四物湯長胎白朮丸○氣虛者四君子湯加黃
芩阿膠因勞役感寒以致氣虛下血欲墜者考歸補子湯或下血如月信以致胎乾乾子母俱損者用熟地
炒乾薑各二錢

惟有一犯房難救胎漏亦有犯房盛婦人月水當來者或因登廁風攻陰戶者雖不服藥亦
為末米飲調服惟有一犯房難救或無恙但作胎漏遠用滋約治之反墮惟犯房下血者乃真胎漏也八
物湯加膠艾救之**偶然尿血莫糊模**尿血自尿門下血胎漏自人門下血妊娠尿血屬胞熱者多四物湯加山梔
艾救之久者用龍骨一錢蒲
黃五錢為末酒調服

惡心阻食名惡阻或大吐或時吐瀉水惡聞食臭由子宮經絡絡於胃口故逢食氣引動精氣
肥人痰二陳湯加竹茹生薑熱加芩連

肥人痰因怒者單黃連丸茯苓煎湯下**亦有無陰并氣弱**無陰則嘔者陰脈必弱頭痛全不入食者八物
麥門冬厚朴竹茹日久水漿不入口吐清水者

或因胎動別症兼三四個月月病惡阻者多因胎動不安或
並加丁香惡聞食氣多困少起者覆花散

或單白朮為丸或單砂仁為末米飲下甚者紅丸子極効兼腰腹疼痛者保胎飲兼瘧痢口中無
味反會傷風冷者醒脾飲子兼傷食者二陳湯加砂仁香附

子煩燥悶亂心神火盛剋肺好生頃妊孕心煩燥悶謂之子煩多受胎四五個月間相火用事或應天令
單知母為末蜜丸淡寔大每三丸酒下日月未足欲產及難產者亦効君火盛者

或有停痰胸膈滯亦令單黃連丸心神不安者砂砂安神丸煩甚恐傷胎者單胎散切不可以虛煩約治

上海錦章圖書局印行

煩燥不宜人

或有積痰積飲滯於胸膈之間亦令煩燥胎動不安者用茯苓防風麥門冬黃芩等分竹葉減半水煎入竹瀝調服

子懸心腹脹滿痛胎氣湊心相火

謂之子懸宜紫蘇飲有鬱心腹脹滿甚者加義術及丁香少許不食

者古苓米湯倍

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

白木加荊約

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

唇爪俱青全以古為

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

引飲太過或泄瀉損傷脾胃脾虛不能制水血化為水所制宜五皮散倍加白木

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

為君氣喘小便不利者防已散濕熱盛者單山梔炒為末米飲調服或單山梔丸

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

個月腹大異常高過心胸氣逆不安胎中蓄水所致若不早治必然其子手足數短形

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

體殘疾或生下即死子母難保宜鯉魚湯服至腫消水散為度仍常煮鯉魚粥食之

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

胞漿大盛故下流

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

水出者謂之子氣宜天仙藤散如脚腰腫者腎著湯手

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

脚腫者用赤小豆桑白皮等分水煎服重者加商陸

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

娠孕中風名子癰只因體薄受風寒發則口噤痰涎壅有時昏暈胎難安

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

痰涎壅塞昏暈不識人時醒時作謂之鬼暈又曰子癰又曰瘧甚則角弓反張小續命湯如重者異羊角

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

湯輕者四物湯加葛根牡丹皮秦艽細辛防風竹瀝疫加貝母陳皮茯苓甘草或古芍活散如中風寒犯

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

獨身體盡疼乍寒乍熱胎不安常苦頭痛遠勝下寒時時小便白如米泔或青黃寒濕腰膝苦冷

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

痛目視荒疏者四君子湯去茯苓加當歸厚朴韭白薑煎入酒調服不省人事者單刺灸散

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

子淋溺遊膀胱熱

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

六君子湯

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

或腎氣丸甚則大小便閉結

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

茯苓等分為轉

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

末米飲調服轉

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

六君子湯去茯苓

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

法將妊婦倒豎起其胎不墜其溺自出

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

將出者搗葱白於臍上灸之立效如欲服藥與胎前不同

甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣絕誤藥子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

亦有虛有熱赤者屬熱古本木湯加山茱萸五味子少許白者屬虛安胎飲或雞膽旺散

子瘡腹鳴自笑悲

後即自能言。○腹中作鐘鳴或哭者多年空房下鼠穴中土為末酒下或乾薑之即止

○腹中兒啼者黃連煎濃汁哩之或青黛亦可。○有膿燥悲傷慘感發瘡動胎命必絕胎前患此者即止

死詳諸症濕痰風熱虛去邪保胎真口訣胎前患此者即止

濕痰度順氣疎風補虛或兼雜症飲食禁忌亦須知雞肉合糯米食令子生十白虫食大肉令子生無胎

去邪保胎二法並行十母俱安飲食禁忌亦須知雞肉合糯米食令子生十白虫食大肉令子生無胎

肝令子多允食蟹肉令子項短頭顱令子同桑椹食令子倒生心寒鮮魚同田雞食令子胎前患此者即止

消胎氣食驢馬肉過月難產豆醬合雀巢食鹽胎食山羊肉令子多病食鯽魚無鱗魚難產食諸般生

子驚風而天食雀腦令子患雀目勿妄服湯藥勿妄用針灸勿過飲酒漿勿舉重登高陟險心有大驚子

必顛癇勿多睡臥須時時少步動和血脈勿勞力過傷便腎氣不足子必解顛轉女求男皆古訣女陰陽

龜破不合衣母太溫食母太飽若脾胃不和榮衛虛損子必羸瘦多病戒之轉女求男皆古訣女陰陽

造化玄妙古法於胎成兩月之內以斧置孕婦床席下懸弓矢於壁蓋弓矢斧斤男子事也勿令人知此

意忍不信者令侍雜抱卵之時以斧置臬下盡是雄雞故胎教常令見王公大人亦此意也更佩雄黃一

二兩於孕婦身左或萱花亦可三法皆驗用其一可也○又後有月日時游胎殺雖不可泥然門戶床窻寔不可輕易移動求嗣者尤宜慎之

臨產

臨產切不可慌忙十月氣足胎元壯健者忽被腹痛或只腰痛須臾產下何俟於催此易生天災之妙喜

各試水雖臍腹俱痛發動露頂而腰不痛者切莫惶惶切禁洗母動手於腹上揣摩直待日子已到腹痛

陣密破水已後并腰痛眼中如火方可坐草須待兒頭直順且正逼近產門方可用力一送如坐草太早

用力太過產母困倦及至遲滯乃用催生之約凡難產皆孕後縱慾及驕恣全不運動又食生冷硬物疑

滯或接石女子交骨不開或腹大甚胎水未盡或臨產開雜之人驚恐產婦恐則精性精法則上焦關閉

則氣還下其脈而不行紫蘇飲最妙活血安胎未破漿如腹痛漿水未破止宜用古法歸湯以活其血或

氣是者瘦胎枳甘散氣弱者達生散產後血虛者散血虛者散血虛者散血虛者散血虛者散血虛者散血虛者散

散以固胎元切不可輕用峻藥徒涉水道反傷胎氣而破漿已久猶難下散血虛者散血虛者散血虛者散血虛者散

產愈難產母亦聽其眠食自如但不可過眠過飽耳破漿已久猶難下散血虛者散血虛者散血虛者散血虛者散

臨產

上海錦華圖書局印行

黑神散氣弱者四君子湯下名四君黑神散橫逆側產每加麝一厘此時如舟在砂上須湧水而後滑利可通服此藥後外用葱二斤搗爛鋪於小腹上用急水灘頭砂一斗炒熱將布紙於葱上輕壓暴探滑利

迅速要相當

惟生有露頂順正而生猶遲滯者恐外感風冷寒暑所阻夏月熱產則氣散血沸宜五苓散能下及服黑神散藥又多者用清油白芨等分醋肝煮汁調服或六一散七錢加葵子五錢為末每二錢熱服有產難口久水乾及觸犯惡氣心煩燥悶者兇胎九腰痛心煩者用人參乳香各二錢長砂五分為末雞子清調薑汁化開冷服○已上橫生露手逆露足徐徐推上任洗娘橫者兇先露手原因服藥身末雞子清調薑汁化開冷服○已上橫生露手逆露足徐徐推上任洗娘橫者兇先露手原因服藥身

當今產母安然仰臥洗母輕手徐徐推兇稍上漸漸以中指摩其肩推上至攀其耳而正方可用神聖固血生血須待兇身正直且順臨門服阿膠滑石葵子為末溫酒入蜜攪勻服之然後去衣分毫不得驚恐服藥時黑神散調健不辛用力太早致見逆來當令產母安然仰臥洗母徐徐推入去分毫不得驚恐服藥時黑神散調健不辛用力太早致見逆來當令產母安然仰臥洗母徐徐推入去分

轉門路正當然後用三退散調服方可用力送身坐產露聲高攀手坐者先露其臂當高處攀手中一

風足良久嘔面貼頂救盤腸盤腸者小腸先出急用熱水浸軟舊布蓋住小腸不可包托外用醋半

聖膏貼住母頭頂中心腸上即拭去內兼服歸參茂大補之藥加升麻防風以提之未有不收者又有

久而為風吹乾不能收者用磨刀水少許火上溫過以潤其腸後用好磁石煎湯一盞服之其腸自收

碍產兇肩臍帶絆碍者因兇身翻轉臍帶絆住其肩雖露正頂而不能生當令產母仰臥洗母輕推兇

近上徐徐引手以中指托起兇頭下其臍帶服固血藥仍須候兇身正順方可用力送

下露額側來墜脰尻側者因兇方轉身被產母用力一逼以致兇頭偏墜左腿忽偏墜右腿或露近上以

或露右額角兇頭偏墜一時多服藥歸黑神散令產母仰臥洗母徐徐推兇近上以

手正其頭直向人門然後推兇頭上若是兇頂後骨偏墜即令兇已露額當令洗母以綿衣炙令溫

煖用手於穀道外時輕按推兇頭上而正之服催生藥後即令產母用力送下此非洗母輕手巧妙不能

傷產驚然口翻當產誤用催生峻約傷母氣血急用安胎過日而產有種一年二年至四年五年而產

包丁燒存性入麝香一錢為末用秤銼燒紅滓酒調服一盞倉卒只以新汲水磨京墨服之墨水裹兇身

出或考歸益母草葵心皆能遂瘀以開產路○有坐草之時驚時口翻吐沫者霹靂丹○有屢石女

子交骨不開難產者龜壳散或苦甘歸胎死母舌黑非常外症指甲青黑眼閉不食口中極臭用平胃散加

歸湯○通用無憂散不麝散兇胎胎死母舌黑非常外症指甲青黑眼閉不食口中極臭用平胃散加

寔者犬黃備急丸或單鹿角為末葱煎湯調服香沈脈微者養正丹濃煎乳香湯下一百廿丸血乾或

東流水十盞煎至三盞去渣入阿膠三兩分二三次頓服能令生者安死者起
○通用露靈丹奪命丸外用如聖膏貼足心仍服催生藥及通關散或鼻即下
氣信古方。皆因用力太早產下不能更用力送出胞衣停久後外冷所乘則血滿脹胞而不出腹滿微痛
輕信洗母用手宜內服半膝湯催生五積散或用真血竭為末酒調
服甚者奪命丹外用如聖膏貼脚心昏暈微甚八味黑神散黑龍丹

產後

產後必先須逐瘀。正產體寔無病不葯可也但難產氣衰瘀血停留非葯不行古法一產後古者歸湯加
後上床仰臥不得側臥宜立膝不可伸足高枕厚褥四壁無風時以人為從心括至臍下如此三日又不
可太睡熱宜頻喚醒時置醋炭或燒漆乾與舊漆器以防血迷血暈夏月房中不可太熱亦不可人多氣
感以致熱過則氣耗散而不能送血又不飽時與白粥飲之日漸加與一月之內針線勞役當時不
覺大害月後必成毒勞手腳及腰腿酸痛亦不可脫衣洗浴強起離床太早以致外感身強角弓反張各
日尊風如交合陰陽令下部終身虛疾將息百日以過乃可須知產後百病皆血瘀消然後堪補助後方
虛火盛瘀血妄行而已矣間有內傷飲食外感風寒然亦必先逐瘀補虛為主

可行情補如左脈弱加補血藥右脈弱加補氣藥如不逐瘀逐瘀衝眩暈腹心疼去血過多眼花頭眩皆因
服參芪甘災停滯之劑有瘀血攻心即死者食肉太早亦然
湯入童便甚者加炒乾薑人參汗多加黃芪或八味黑神散單五靈脂散返魂丹。胃弱血虛發厥倉公
散白薇湯。臨產用力勞心氣虛白芍。火散血上昏暈或挾風邪者清魂散。被驚者抱胆丸。疎砂安神
丸。上作暈者。八物湯合二陳湯。去黑神散。四味散。失笑散。有寒熱者當歸散。虛寒心痛者桂心湯。感寒
者理中湯。七情心痛者木樨湯。食滯寒熱心腹痛者熟料五積散。加我木。小腹痛者名兜枕痛單
五靈脂散。或加桃仁。醋糊為丸。氣虛四君子湯下血虛四物湯下。產門臍下虛痛者天溫經湯。羊肉湯

○通用女金丹。血虛火動寒熱。產後血虛發熱。氣虛惡寒。氣血俱虛發熱惡寒。切不可發表。陰虛血
加味益母丸。煩短氣悶亂者人參當歸散。蒸乳發熱者四物湯加參芪白朮。天花粉發熱晝靜。內傷勞役漸虛。產後
夜劇者四物湯去芍藥量加柴胡。氣血俱虛寒熱者補虛湯。產後真不宜涼也。內傷勞役漸虛。產後
過度名曰尊勞。其症虛羸乍起乍臥。飲食不消。時有咳嗽。頭目昏痛。發渴盜汗。寒熱如瘧。腎肺拘急。宜十
全大補湯去芍加續斷牛膝。蜜甲桑寄生。桃仁。為末。搗腎一對。去脂膜。薑一片。聚三枚。水二盞煎至一盞
入前末二錢。葱三十。烏枚半。個。煎。五。德。同。水。食。滯。脾。家。瀉。且。吐。凡。寒。熱。有。腹。痛。者。為。瘀。血。如。腹。痛。脚。滿。
煎。空。心。服。○身。痛。寒。熱。者。當。歸。羊。肉。湯。腰。子。湯。食。滯。脾。家。瀉。且。吐。凡。寒。熱。有。腹。痛。者。為。瘀。血。如。腹。痛。脚。滿。
○身。痛。寒。熱。者。當。歸。羊。肉。湯。腰。子。湯。食。滯。脾。家。瀉。且。吐。凡。寒。熱。有。腹。痛。者。為。瘀。血。如。腹。痛。脚。滿。

上海華英書局印行

料五積散痛甚加我木嘔加砂仁瀉加羌附人參泄瀉不止臍腹痛者理中丸加肉豆蔻○挾熱腸痛者理中丸加肉豆蔻○挾寒腹痛者四

鳴小便清白不渴者四君子湯合五苓散加肉豆蔻炒白芍○挾熱身重腹脹者胃苓湯○嘔吐因敗血乘虛

入胃脹滿者六君子湯加酒炒黃連及木通少許或益元散○挾濕身重腹脹者胃苓湯○嘔吐因敗血乘虛

三白湯加乾薑陳皮黃芪滑石甘草煎服或成積痞者內炙散晚晚丸○霍亂吐瀉煩

渴肢冷者理中湯加陳皮麥門冬姜煎服或成積痞者內炙散晚晚丸○霍亂吐瀉煩

中帶表無過度產後外感離床太早或換衣襲風冷入於下部令人寒熱似瘧頭痛不歇血虛者古方黃

龍湯主之如體感發熱惡寒及瘧病者小柴胡湯合四君子湯或四物湯加大黃芒硝三分服即調補之產後傷

法曾誤服藥過多熱症大見久而便閉者柴胡破瘀湯或四物湯加大黃芒硝三分服即調補之產後傷

寒身痛筋攣虛渴因產走動氣血不盡流於遍身腰脚關節痛者五積散去麻黃加人參附子湯

桃仁木香等分薑煎服○產後諸風痙攣筋無力者血風丸或煎服○煩渴氣虛者生脉散血虛者四

物湯加天花粉麥門冬氣血俱虛作渴頭眩脚弱飲食無味者用人參麥門冬小麥後汗多**大便偏閉**固者古歸芪湯

花粉三錢甘草五分糯米薑煎服○虛煩者用人參麥門冬小麥後汗多**大便偏閉**固者古歸芪湯

苓各一錢竹茹一彈丸半夏八分甘草五分薑煎服心虛驚悸者亦宜汗多**大便偏閉**固者古歸芪湯

甚加白木防風牡蠣麥門冬熟地茯苓甘草或黃芪建中湯自汗兼腫滿者大調經散自汗肢體痛者一

當歸羊肉湯○發熱盜汗者用猪腰子一枚糯米半合葱白二莖同煮熟取清汁一盞入人參當歸各一

錢煎服○大便閉者古芍歸湯加防風枳殼甘草開泄者麻子仁丸或蘇麻粥蓋產後去血多則胃弱

胃則多汗多汗則大便閉皆血虛也胃弱多血暈○小便不通腹脹滿者用鹽填臍中葱白一氣切作一

指厚按鹽上以艾炷灸之熱氣入腹即通熱者**不語敗血濕痰迷**產後敗血停蓄上干于心氣閉滿舌

六一散加枳榔枳殼木通麻子仁葵子水煎服○**不語敗血濕痰迷**產後敗血停蓄上干于心氣閉滿舌

產服湯藥過多胃弱使然者熟料五積散六君子湯○**不語敗血濕痰迷**產後敗血停蓄上干于心氣閉滿舌

語者導痰湯或痰氣鬱滯閉目不語者用生熟也宜小調經散加龍腦少許或妙香散加當歸地黃黃連

敗血攻冲邪淫於心胡言亂語非寒風非見熱也宜小調經散加龍腦少許或妙香散加當歸地黃黃連

○瘀血迷心妄言妄見及心虛謔妄皆量者八物湯去芍藥加琥珀柏子仁遠志砂金銀煎服其者黑

龍丹○產後血少怔忡睡臥不寧**又有惡露常淋或因臍損尤難任**產後五淋白茅湯敗血淋瀝不

困者壯陽散○有生產時被洗母誤損尿肝以致日夜淋瀝者四君**任是羣風并腫**產後中風名曰羣

子湯加黃芪陳皮桃仁用猪尿肝者青汁煎溫服血虛者加芍歸**任是羣風并腫**產後中風名曰羣

每用酒半碗入獨活五錢同煎溫服○產後汗多風搏成痙者難治○產後敗血停蓄化水循經流入四肢浮腫者小調經散而氣虛者四君子加蒼朮或安金丹血虛者補虛湯少加蒼朮茯苓使水自利怨峻

利攻一切雜症補榮衛○產後雜病與男子一同但常兼補兼逐瘀則病無不愈丹溪云大補榮衛為主難

作痢一同四物湯加桃仁黃連木香主之是也假如月裡痢疾惡露不盡者多瘀凝滯腸胃與經後血滯

是瘀血入肺舌二母散加桃仁杏仁參茯苓水煎其餘以意會之可也○咳嗽多惟鼻衄黑如煤○產後血

諸經不得還元故口鼻黑起乃變鼻衄皆因發喘聲高難救護○產後氣喘由榮血暴竭氣無所主獨聚於

產後虛熱所致胃絕肺敗犀角地黃湯救之○陰門腫突腸不收○產後陰肉兩旁腫痛手足不能舒伸者

加蘇木少許救之若敗血停滯服肺喘者用血○陰門腫突腸不收○產後陰肉兩旁腫痛手足不能舒伸者

竭沒藥等分爲末酒入水調服兼用奪命丹○陰門腫突腸不收○產後陰肉兩旁腫痛手足不能舒伸者

戶兩旁良久即愈○因產用力過多陰門突出者四物湯加龍骨末少許連進二服外用草藥子搗爛貼

頂少收即去草麻○產後生腸不收○八物湯加防風升麻須用酒炒黃芪爲君外以荊芥霍香椿皮煎湯

洗子宮脂膜休羞惡○產後下一物如合鉢狀有二枚者子宮也補中益氣湯去柴胡連進二貼即收○臨產驚動用力失笑過致

痿所致有粘席不得上者乃脂膜無妨補中益氣湯去柴胡連進二貼即收○臨產驚動用力失笑過致

脂膜有傷垂出肉線一條約三四尺長牽引心腹痛不可忍以手微動之則痛若欲絕先服失笑散數貼

仍用生薑三斤洗淨搗爛以清油二斤拌勻炒令油乾焦爲度却用熟絹五尺摺作數層方令穩重婦人

輕輕盛起肉線使之屈曲作一團納在水道口却用絹袋兜前油薑稍溫傳在肉線上薰之覺薑冷又用

劈斗火熨熱常使有薑氣如薑氣已過又用新薑如此溫熨一日一夜其肉線已縮入一半再乳汁不通

氣血虛氣滯塞者戒鬱○產後氣血虛弱乳汁少者用鍾乳粉二錢漏蘆煎濃湯調理或用猪懸蹄一隻

煮湯泉散○無子食乳要消者用麥芽二兩炒爲末四物湯調服即止○凡乳母但覺小水短少即是病

生使瀉服藥調理脾胃肝腎如不愈者必氣滯且逆也蓋婦人凡事不得專行多憂思念怒憂思過則氣

結而血亦結忿怒過則氣逆而血亦逆甚則乳硬腸痛煩熱要之病皆怪疾乳長尺有餘先賢治法乃

詳具○產後瘀血上攻忽兩乳仲長細小如腸直過小腹痛不可忍名曰乳懸危症用川芎當歸各一斤水

吸烟氣末甚縮再用一料則瘀血消而乳頭自復矣

若更不復舊用草麻子搗爛貼頂上片時收即洗去

附胎殺禁忌

凡胎殺所在不宜修整雖鄰家興動孕婦當避縱不墮胎令兒破形色青體孱寢塞天殞

胎殺所在 正月在房床 二月在窗戶 三月在門堂 四月在竈 五月在身床 六月在床倉 七月在確磨 八月在廁戶 九月在門房 十月在床房 十一月在爐竈 十二月在房床 子丑日在中堂 寅卯辰酉日在竈 巳午日在門 未申日在籬下 戌亥日在房 已上禁忌總要全不修理為高

房中遊神 癸巳甲午巳未丙申丁酉日在房內北 癸卯日在房內西 甲辰乙巳丙午丁未日在房內東 戊戌巳日在房中 庚子辛丑壬寅日在房內南 凡游神所在忌安床換帳致重物於床中必至

胎墮

生子所向方 子午卯酉日宜西南寅申巳亥日西北辰戌丑未日東南難產以蘇葉煎湯洗臍腹陰門

藏胎衣方 宜生氣方上正月子方二月丑三寅四卯五辰六巳七午八未九申十酉十一戌十二月亥方如生氣方有不便依歷日藏於奏書博士月德方上忌月空三殺太歲方上俗多置之河中者非

婦人終

小兒門

白露秋分寒露霜降



觀形

清明 春分 驚蟄

察兒氣色 肝青心赤脾黃肺白腎黑凡病面無黃色不治春白秋赤冬黃夏白者逆先分部位左頰青龍屬肝應春青為有餘右頰白虎屬肺應秋白為不足