

證治彙補二



證治彙補卷之二

門人范超同叔

朱逢綸升

上海李惺菴先生著
姪邦俊彦章

男謨丕文

氣症章
諸揆文全較

大意

氣者氤氲浩大之元氣當其和平之時源出中焦總

統乎肺

原病式

在外則護衛皮毛充實腠理在內則導

引血脉升降陰陽周流一身運行不息

指掌

臟腑之所



以相養相生者皆此氣也盛則盈衰則虛順則平逆

則病

繩墨

內因

百病皆生于氣也怒則氣生喜則氣緩悲則氣消恐

則氣下寒則氣收熱則氣滯驚則氣亂勞則氣耗思

則氣結憂則氣沉

內經

凡七情之交攻五志之間發乖

戾失常清者遽變而為濁行者抑遏而反止營運漸

遠肺失主持氣乃病焉

原病式

外候

氣之為病生痰動火升降無窮燔灼中外稽留血液

爲積爲聚爲腫爲毒爲瘡爲瘍爲嘔爲欬爲痞塞爲
關格爲脹滿爲喘呼爲淋瀝爲便閉繩墨爲胸脇脹疼
爲周身刺痛久則凝結不散或如梅核窒碍于咽喉
之間咯嚔不下或如積塊攻衝于心腹之內發則痛
絕彙補

脉法

下手脉沉便知是氣沉極則伏濇弱難治玄大凡氣
病輕者肺脉獨沉重者六脉俱沉又氣病輕者肝脉
獨弦重者脾脉亦弦也彙補

女人多氣

男子屬陽得氣易散女子屬陰得氣多鬱故男子氣

病少女子氣病多

正傳

况嬌養縱妬性偏見鄙或媚媳

婢妾志念不伸恚憤疑忌抑鬱無涯皆足致病

補彙

七情病異

喜怒驚恐屬心膽腎經病則耗散正氣爲怔忡失志

精傷痿厥不足之病怒憂思悲屬肺脾肝經病則鬱

結邪氣爲顛狂噎膈腫脹疼痛有餘之病

玉冊

五志相勝

五志所傷以所勝者平之悲可以治怒以愴惻苦楚
之言感之怒可以治思以污辱欺罔之言觸之思可

以治恐以慮彼忘此之言奪之恐可以治喜以迫遽
危亡之言怖之喜可以治悲以謔浪褻狎之言娛之
凡此法者必詭詐譎怪無所不至然後可以動其耳
目易其視聽也又熱可以治寒寒可以治熱逸可以
治勞習可以治驚若徒事湯藥失所務矣

子

氣症總治

調氣之法結者散之散者收之損者益之逸者行之
上之下之摩之浴之薄之劫之開之發之氣虛者掣
引之

素問

滯者導之鬱者揚之熱者清之寒者溫之偏

熱偏寒者反佐兩行之挾濕者淡以滲之挾虛者補

而養之六虛甚者補歛之浮越者鎮墜之彙

氣病變火

氣本屬陽亢則成火六氣有餘便是火也原病故滯

氣逆氣上氣皆氣得炎上之化有升無降蒸薰清道

甚至上焦不納中焦不化下焦不滲宜清降氣道化

丸加黃連山梔若概用辛香燥熱之劑是以火濟火矣丹溪

氣病成痰

有尋常外冒四氣內着七情或偏食厚味致清濁相干噫氣少食或痞或痛此屬氣也然有屢用辛溫暫開復結愈切愈滯蔓延日久為吞酸為嘈囈此乃氣



生痰之症也若徒用香燥則津液枯涸痰凝血瘀結成窠囊爲痛爲嘔乃反胃噎膈之漸也惟常平補調疎使脾胃清和則氣道健行痞塞自解

六要

氣兼痰火

氣與痰火同出異名三者湊合重則卒暴眩化輕則脹痛痞塞故治氣者不治其火則氣不降不治其痰則氣不行故清痰降火爲治氣之關節也

彙補

辛香暫用

辛香之劑但治初起鬱結之氣借此暫行開發稍久氣鬱成熱便宜辛涼以折之最忌香燥助火如明知

傷冷受寒而病者方敢溫散亦暫法也

丹溪

氣病和血

氣主煦之血主濡之

難經

一切氣病用氣藥不效者乃

氣滯而血不能波瀾也宜少佐芎歸活血血氣流通

而愈乃屢驗者故婦人宜調血以理氣男子宜調

氣以養血

醫鑑

氣虛補脾

氣因于中

內經

故中州爲元氣之母俗云氣無補法者

此爲氣實人言也如脾虛正氣不行邪着爲病當調

理中州復健運之職則濁氣降而痞滿除如不補氣

氣何由行

丹溪

六君子湯加減之

氣虛和肝

上升之氣自肝而出

原病式

故性躁多怒之人肝木必

旺肝旺則乘脾宜用伐肝之藥然剋削太過肝木未

平而脾土先受其害脾益虛矣

準繩

况造物之理太剛

則折肝氣過旺肝亦自傷不但脾虛而肝亦虛矣所

以氣病久而肝脾兩虛者宜調脾和肝逍遙散出入

治之

彙補

氣虛補腎

肺為主氣之標腎為主氣之本腎虛氣不歸元衝脉



北京中醫藥大學圖書館版權所有

之火主衝清道爲喘呼爲呃忒爲嘔噦爲不得臥下
皆當從下焦補斂之法不知者泛用調氣破氣而終
不下降者氣之所藏無以收斂也必佐以補腎而氣
始歸元門入氣喘用觀音應夢散呃逆用桂附理中湯
臥不下用八味丸大凡納氣歸元用砂仁補骨脂五
味胡桃肉之類

氣症用藥

主以寬中散胸滿加蘇梗枳殼心下滿加枳實腹脹
加厚朴大腹皮脇痛加柴胡橘葉腹痛加烏藥枳殼
小腹痛加青皮鬱氣加撫芎蒼朮怒氣加木香沉香

挾冷加乾薑肉桂挾熱加薑炒山梔挾虛加入參實
滿加大黃大約青皮破肝氣多用損真元之氣枳殼
瀉滯氣過服瀉至高之氣香附散鬱氣須製過木香
調諸氣兼瀉肺橘紅專瀉陳皮兼補厚朴平胃氣前
胡下氣推陳沉香降諸氣烏藥川芎紫蘇俱能散濁
氣從汗而散枳榔大腹皮能使濁氣下行而去後重
有積者宜之萊菔子蘇子杏仁下氣潤燥肺氣滯于
大腸者宜之豆蔻沉香丁香檀香辛熱能散滯氣暴
鬱者宜用稍久成火者忌用須以薑炒山梔從治之
已上皆疎肝有餘氣病要藥若兼痰火兼積滯兼血

有餘不足各隨加減調氣用木香然木香性溫上升如鬱氣不舒固宜用之若陰火上衝胸喉似有氣滯而非氣者則不可用木香以助火當加黃栢知母少佐枳殼血虛氣滯四物湯加香附陳皮陰虛氣滯地黃湯加沉香石斛砂仁陽虛氣滯四逆湯加肉桂補骨脂氣虛氣滯六君子湯加益智蘇梗肥人氣滯必挾痰以二陳湯加香附枳殼燥以開之甚者加蒼朮白芥子瘦人氣滯必挾火宜蘇子山梔歸芍降以潤之婦人性執屬陰易于動氣痞悶脹滿而痛上湊心胸或攻築脇肋腹中結塊月水不調或眩暈嘔吐往

來寒熱一切氣候正氣天香湯四七湯酌用之如氣
不升降痰涎壅盛者蘇子降氣湯氣不歸元以補骨
脂爲主取其壯腎氣以收濁氣歸就膀胱使氣化而
出也或白朮亦可以其能和胃胃和則氣自歸元此
爲脾腎兩虛者立法也若肺腎兩虛氣不歸元喘促
不臥者宜五味子胡桃人參之類氣鬱久則中氣傷
不宜尅伐宜歸脾逍遙二方佐以撫芎香附枳殼以
舒鬱胎產同法

氣症選方

寬中散

統治氣症

白芫薤

兩二甘草 炙五

木香

兩三厚朴

斤一砂仁

兩三丁香

青皮

陳皮 各四

香附 兩三

為末每服二錢生姜水

煎服脾胃虛人不可多用當以六君子兼之

四磨湯

治怒憂悲思氣滯于中

烏藥

枳殼

檳榔

沉香

四件各磨半小杯

溫服和一法以二陳湯同用或煎或磨入同服更

效濟生方中所載內有人參無枳殼

正氣天香散

河治九氣

烏藥

兩三香附

兩八陳皮

紫蘇

乾薑

兩各一

為末每

服一錢淡塩湯調



蘇子降氣湯

和劑

治虛陽上攻氣不升降痰涎壅盛

蘇子

二錢半

厚朴

一錢

陳皮

一錢

半夏

二錢半

前胡

二錢

沉香

一錢

七分

甘草

一錢

生薑水煎服虛冷人加肉桂五分當歸

黃芪

一錢

一法去肉桂加桑白皮白朮治哮喘嗽症愚意哮

喘嗽症初起不宜用白朮當以茯苓代之若久而

易感常發者丸方中竟用白朮以治痰之源

忿氣飲

治忿怒太過肝氣上升肺氣不能降者

紫蘇

半

夏

青皮

一錢

陳皮

一錢

大腹皮

一錢

赤苓

桑皮

一錢

白芍藥

一錢

木通

一錢

甘草

一錢

一錢

一錢

四七湯

和劑

治七情結成痰涎狀如破絮梅核在咽喉

之間或中脘痞滿氣不舒快痰涎壅盛上下喘息

或呃逆惡心兼治憂思過度小便白濁者以此藥

下青州白丸子最效

厚朴

九分

茯苓

一錢二分

半夏

一錢半

紫蘇

六分

生姜

水煎服

治婦人惡阻大效

木香化滯湯

治氣食濕麵結于中脘腹內微痛心

下痞不思食

枳實

五分

柴胡

四分

木香

三分

陳皮

五分

甘草

一分

半夏

草

豆蔻

五分

當歸

二分

紅花

一分

生薑

水煎服