

續名醫類案

十二



錢塘魏之琇編集

瘡疹雄按麻也痧也疹也瘡各處方言不同也其實一也何以分瘡疹為兩篇殊屬未當今歸作一類

孫文垣治僕子孫守以麻即瘡欬嗽無痰上唇厚體腫熱大便燥聲啞燥火為患以麥冬知母瓜蒌甘草

白芍桑皮是證宜去白芍桑皮入牛蒡桔梗地骨皮石斛枳殼服後嗽減其七乃去瓜蒌枳殼以其大便已溏加生地

當歸苡仁調理而安此證加生地合否校對酌之

程氏子七歲中麻西吳呼為瘡子姑蘇呼為沙子一月餘矣發熱如故欬嗽聲啞肌削骨立頭髮盡禿眾醫束手孫見之

曰若謂此兒不可治耶此麻後虛熱成瘡以大蘆薈丸與之可萬全也病家初不余問者謂非幼科專

門也不知此特大方家餘事耳可改韓詩曰餘事作兒科然方脈不知兒科者必非良手為製藥與之未盡服而瘳

呂東莊治錢氏子五歲病瘡泄瀉兒醫謂瘡最宜於瀉不復顧忌以清火為急寒涼縱進著眼在病勢殊

劇呂視之面色兩顴刺紅虛陽上浮時咬牙喘急盛上口渴甚飲水不絕陰虛液燥脈洪緩如平壯人曰脾急矣速

投人參當歸黃耆陳皮甘草茯苓木香以救之一劑覺安或阻之曰誤矣小兒有專門豈可令腐儒治

之吾所聞瘡病以發散清涼解毒為主今半身瘡潮熱未退而用溫補必不救矣無真知而參末議最能誤人知者慎之

其家懼遂不敢再服間三日其父復來見曰諸證復如故如何呂曰豈有是理哉君戲我耳曰日來實



海昌王士雄孟英
定州楊照葵素園同校



不服君藥。乃述其故。呂曰。君試急歸。兒天柱骨倒矣。別去。頃之馳至。曰。果如公言。奈何。急服前方何如。呂曰。前方救虛也。今加寒矣。非桂附不能挽也。曰。額紅口渴。喘急飲水。俱是熱證。而公獨云虛寒。何也。曰。陰竭於內。陽散於外。而寒涼復逼之也。陽無所歸。內真寒。而外假熱。此立齋所發內經微旨。非深究精蘊者不能信也。乃歸而違衆。服之一劑。而天柱直。二劑而喘渴止。三劑起行。嬉戲戶外。此由苦寒過劑。故處方如是。非一切小兒皆可桂附也。

馮楚瞻治沈氏兒。發熱數日。見麻疹。纔一日。面上盡沒。神氣困極。虬從口出。不一而足。數日不食。下瀉上喘。唇口焦裂。五心壯熱。手足指突皆冷。脈細數無倫。兩尺更弱。咸謂疹毒歸臟。胃熱故虬連出也。不知神氣欲脫。五臟俱困。脾虛不能納穀。蟲無所食。又兼虛火薰蒸。臟腑燥熱。蟲不安而出耳。況諸斑疹多由內傷失調。脾胃不足以榮。是以陽氣逆行。陰覆於外。血盛氣壯。則色紅而焮發。血虛氣弱。則色白而隱伏。有何毒之輕重乎。面上退縮者。陽虛不能升發也。喘促者。氣難續也。唇焦者。脾津耗竭也。五心壯熱者。陰虧火燥也。泄瀉不食者。真火衰而脾不運也。寸關細數尺弱者。氣虛血虛。虛火上浮而不藏也。急則治標。緩則治本。今者之急。本氣欲脫也。倘謂麻疹餘毒。解利清託。恐神氣先盡矣。乃以熟地六錢。丹皮一錢。麥冬三錢。牛膝二錢。製附六分。一劑假熱全消。真虛畢露。神氣更倦。此陰已少復。當補氣以助其發生。前方另煎人參二錢。沖服。神氣漸服。喘促全安。飲粥微嘔。乃胃氣久虛之故也。再用前方。加

炒黃白朮二錢。去丹參。參湯沖服。四劑全愈。愚按此與呂證大同小異。要是百中一二。未可執爲程法也。大抵麻疹之發。本諸肺胃。治之但宜鬆透。一切寒燥寒熱之劑。不可入也。余嘗遇表散過甚。綿延不已者。一以生地杞子地骨麥冬。薏仁沙參等味。三四劑。必嗽止熱退而安。

高士宗長男六歲。次男三歲。於元旦次日。發熱見疹。卽用以清解透發之劑。次日略增十數點。究不暢心。以長男七月而生。先天怯弱。問其胸腹寬否。曰飢甚。口味何如。曰淡甚。因知其虛。遂投耆朮參草桂枝紅花一二劑。次日透發遍身。熱稍退。而人情猶煩躁。夜發熱頻。欬嗽。至一月而安。由見點之初。過服表劑。虛其經脈故也。由此成疳。勞者多矣。次男幼稚。致問不能。以上冬痰喘。服麻杏桂枝石膏一劑而愈。謂其稟質

略強。知其疹必不寒凝毒甚。因與蘇麻前杏黃芩石膏藥。大錯紅點不增。又與紫蘇葱薑芫荽等。溫之熨之。疹總不出。所謂不知經候。混攻混表是也。同道俱云。舍透法。並無別法。如此等藥。豈但透發而已。至五六日吐衄。或曰此熱極生

蟲。可服牛黃散。牛黃散卽大黃末也。一服而痰喘止。神氣稍平。却自是不能言矣。計無所施。針百會穴。開其痛門。服牛黃分許。及諸單方。觀其形證。急則亂。實不能生。友人張衛生曰。此大虛大寒證也。今既無言。又不能食。恐無濟矣。勉投參附。究無挽回。經云。一逆尙引年。再逆促命期。爲醫者可不鑒諸。

汪氏子出瘡已三日。服前胡杏仁麻黃石膏藥一二劑。疹出廿餘點。不能再增。心胸煩悶。乞高診。高曰。若再攻發則敗矣。急與芎歸耆朮桂枝紅花一劑。而熱退身安。凡治疹。調其氣血。和其經絡。寒涼攻發。概

致不用。則屢試屢效也。亦非定論。蓋鑒前車而矯枉過正也。

吳題先子甫二歲出瘡。兒醫攻發不透。高視之。知其虛也。若但發瘡。瘡斷不出。必至不保。惟有溫補之劑。

益其臟腑。安其腸胃。助其氣血。方可。語無筋節。則胸無卷軸。可知。

遂與耆朮。羌桂。歸芍。苓。銀花。紅花。諸味。一劑而安。

次日。即用原方。加人參一錢。又連服獨參湯而愈。

夏氏子出瘡。色點俱紫。神色不甯。高曰。此證大凶。治須得法。連看二次。皆用溫散藥。次早。其家人走告曰。

口吐涎蟲。另有藥否。曰。昨二劑俱服否。曰。尚存一劑。因與附子八分。令加入煎服。自此遂無音耗。心竊

越三載至其家。猶懷鬼胎。見其子長大。因問昔年出瘡吐虺。何由得愈。曰。服藥後。因無力相延。仗天覆庇。得

以漸愈。語亦虛話。以上皆醫藥真傳。高案。

徐仲光治一兒。身熱喘脹。以內傷外感。治之不效。視其背。隱隱赤色。乃疹也。以疹黃湯表發。雖出而頭面

不足。隨沒而死。雄按此證未始不由初始所誤。

一兒疹。身熱似痘。候遍身報點。沈虛明黃錦雲。皆以為虛也。時黃綺芸年十二歲。未知醫。往視獨以為疹。其父詬之。綺芸曰。兒聞父言。疹為肺胃風熱。今兩鼻流涕。豈非疹乎。已而果然。後長遂為明醫。是以鼻

涕作疹者。則早得其要領也。

一兒疹出紫色。便嗽嘔瀉不食。用解毒飲挑痧法。治之而後愈。雄按識見之超本乎天分。

一兒疹出紫色。便秘溺澀。煩躁悶亂。急以大柴胡湯。利之而愈。

一兒疹不易透。知爲風寒所遏。用桂枝湯。加葛根。麻黃。前胡。升發之。又厚用被裏之。再以大劑防風湯。薰於床下而愈。此亦可用芫荽。防風湯。浴頭面手足。又葶藶。芫荽。酒。浸之。疹證以照顧咽喉爲要。務麻黃葛根升麻等藥最宜慎用。

一兒身熱頭痛骨痛。欬嗽氣急。嘔噦不食。乃傷寒而兼出疹也。以百祥散。十神解毒湯治之。愈。此證治之少緩。疹雖透必變紫黑。悶亂喘脹而死。

一兒疹出。腹飽便秘。乃內傷所發也。用承氣湯下之。愈。

一兒疹正出。而恣食停滯。腹飽便秘。壯熱譫語。急以大黃。瓜。薤。枳。實。厚。朴。黃。連。甘。草。等藥。利之。而尙喘。嘔。脈遲肢冷。以附子理中湯。又歸芍六君湯。治之而愈。

一兒表散後疹出。隱隱肌肉間成片。又爲風熱所鬱。渾身變青紫。煩躁悶亂喘脹。欲出不出。急用麻黃桂枝湯。加葛根。以升發之。得冷汗微出而愈。

一兒疹半出。壯熱煩躁。喘脹悶亂。乃出不透。而內攻也。急以麻黃。甘草。桔梗。前胡。葛根。荆芥。牛蒡。枳殼。升發之。疹出二三番。得盡透而愈。

一兒疹隱不振。頭面不出。面色青白。喘脹悶亂。右寸脈微。此正氣虛也。不能升毒。急用麻黃。桂枝湯。加人參。一錢。防風。芫荽湯。浴之而愈。

一兒疹盡出壯熱祕結喘脹譫語此毒壅猶不盡透也急以黃連瓜蒌枳殼石膏桑皮知母人中黃等藥治之愈。

一兒汗出疹透猶喘不止亦邪壅也急以炒黑麻黃加石膏杏仁甘草治之而愈。

一兒疹時欬嗽喘急用大小無比散五分至一錢卽喘定而睡醒後神安此熱從小便而解也。

一兒仲春出疹用涼藥食生梨寒鬱而沒喘悶而青肢冷聲啞昏暈急以麻黃葛根湯葛根柴胡甘草桔梗紫蘇生薑共發之再復以被取汗而愈。

一兒疹發不出喘嗽煩躁悶亂繆仲淳治西河柳五錢麥冬三錢五分牛蒡三錢五分蟬蛻荆芥薄荷知母各一錢竹葉三十片甚者加石膏五錢冬米或三黃等治之而愈。

一兒疹雖出而喘反甚乃驟用麻黃燥烈之藥火甚而肺火熱也宜清金潤肺以甘草桔梗前胡牛蒡杏仁元參知母黃芩花粉治之而愈。

賀知忍少子疹不透極重其家不知尙以肉飯與之仲淳急以西河柳兩許石膏壹兩五錢知母五錢元參貝母各三錢竹葉七十片作二劑服而疹盡現遍身皆赤連服四服疹盡出而煩躁猶不止再以石膏三兩知母西河柳各二兩麥冬三兩黃芩黃柏黃連各五錢竹葉三百片濃煎與服遂定而瘥。

雄按葉天

士吳鞠通皆言西河柳非瘡疹所宜而繆氏每與石膏並用則不嫌其溫升太過矣殆卽仲聖以麻黃與石膏同用之意也



中醫藥大學圖書館藏

一兒寒月出疹不透。喘脹悶亂躁煩。用去節麻黃蜜和酒拌炒一錢。葛根麥冬貝母前胡知母荆芥元參。

甘草西河柳一服而疹立透。隨愈。

一新婚出疹。痰嗽不已。咸謂餘毒。用清解而痰愈多。午後欬甚。此陰虛火熾而潮熱也。用六味地黃丸加知母麥冬治之愈。

一新婚婦出疹。其證如前。用六味地黃丸料。加當歸治之而愈。

一孕婦疹不出。極熱悶亂喘脹。用清熱安胎藥而熱愈甚。危劇。子母難全。此懷胎內熱。故法當下其胎。則

疹熱解而母命可保矣。以表散兼墮胎藥治之而愈。

此種治實原謬。妄疹不過肺胃之熱喘脹。亦肺家本證。何必下其胎而始可治乎。

一孕婦出疹。小腹痛而漏血。此熱甚動胎。以升麻葛根湯加荆芥紫蘇黃芩當歸白朮川芎沙仁橘紅阿膠治之。血止而安。

一孕婦出疹。觸動其胎。胎墮而去血過多。疹雖沒而煩躁悶悶昏絕。乃血脫故也。當兼益氣用理中湯而

甦。又用人參一兩。當歸阿膠炮薑荆芥艾葉治之而愈。

既知血脫。却偏要益氣。古人此種甚多。實不可解。

一孕婦出疹。熱極墮胎而難產。用魚膠三寸。燒存性。麝香一分。共酒服立產。遇此證最為難治。更有橫生者。用魚膠一尺。如前法治。雖疹而子不活。

一產婦疹不易出。熱甚而去血不止。乃血氣不足。不能逐毒出外也。用麻黃葛根湯加人參荆芥白芷當

歸阿膠治之而愈。

一婦疹後輕欬。朝涼暮熱。面色少神。肌瘦唇赤。咸以氣血不足。用八珍湯治之。細訊其夫。知其不慎房室。

用六味地黃丸。合生脈散與服。又囑絕欲百日而瘳。此亦影響揣摩之談。大抵疹後肺陰大傷。水絕上源。故顯此候。得六味滋潤之力。故遂愈。以非正治。

肺家之藥。故取效遲也。

柴嶼青治候補汪某。年二十餘。因感時氣出疹。過服石膏等劑。身熱泄瀉。兩耳皆聾。絕不思食。脈之兩尺。

微弱。舌上乾燥。毫無津液。本屬陰虧。況大寒之劑。不但傷陽。亦且傷陰。用麥冬五錢。滋陽以清虛熱。陳

皮以和胃氣。加西河柳一錢。以清疹毒。次日熱微瀉止。舌亦覺潤。惟左寸脈微洪。加小生地二錢。水通

一錢。菊葉一錢。三日熱退思食。因是月應選身軟耳聾。慮不能過堂掣籤。謂已平復。十九日當投補劑。

定可全愈。后果如言。竟得赴選。此案可法。蓋灼知病源。故不以八珍十全籠統塞責也。

萬密齋治吳道松。四肢病疹。或治之三日。疹不出。煩躁甚。欲用荆防敗毒散。曰。此皆發熱之藥。無解毒之

用。況天大熱。又無時令之藥。一二味在內。則陽愈勝。陰愈虧。陰陽不和。此疹之所以不出也。以東垣涼

膈散。加元參升麻。一服疹出。三日起。議論極是。但涼膈重劑。非熱毒甚。亦難輕用。至用升麻。於涼膈劑中。則有相濟之妙。而無過升之弊矣。

甘氏子發熱疹。三日不出。身涼神倦。坐臥不甯。此毒不外出。毒大內伏也。故煩而坐臥不安。用升麻葛根

湯。加麻黃石膏。以發之。一服疹盡。出色白不紅。此血虛也。用四物湯加防風。一服。色紅而愈。

楊氏子疹。後痢下鮮血。用當歸梢生地白芍條芩炒黃連炒人參甘草枳殼烏梅而愈。凡出疹利血者。此方皆效。

錢乙診睦親宮中十大王瘡疹云。曰。瘡疹始終出。未有他證。不可下。但當用平和藥。頻與乳食。不受風冷。

可也。如瘡疹三日不出。或出不快。卽微發之。鼠粘子湯之類。如瘡發後不多出。卽加藥。如一日一帖。加藥不出。

卽大發之。升麻葛根薑活防風獨活麻黃桂枝之類。如發後不多。及脈平無證。卽瘡本稀。不可更發也。有大熱者。當利小便。

小熱者。當解毒。聖散之類。利小便。四。若不快。勿攻勿下。止用抱龍丸治之。若有大熱能食者。大黃下一二行。卽止。

若黑紫乾陷者。百祥丸下之。不黑慎勿下。身熱煩躁。腹滿而喘。大小便瀉。面赤悶亂。大吐。此當利小便。

不瘥者。宜宣風散下之也。若五七日痢不焦。是內熱氣蒸於皮中。故瘡不得焦痂也。宜宣風散導之用。

生犀角磨汁解之。使熱不生。必著痂也。此條議論有極是者。有未盡協者。分別觀之可也。

睦親宮十太尉瘡疹。眾醫治之。王曰。疹未出。屬何臟腑。一醫言胃氣熱。一醫言傷寒不退。一醫言在母腹。

中有毒。屬何臟也。醫曰。在脾胃。錢氏曰。何以驚悸。皆無所對。錢氏曰。夫胎在腹。月至六七。則已成形。食。

母腹中穢液。入兒五臟。食至十月。卽穢液滿胃。至生時。兒口猶不潔。產母以手拭淨。則無疾病。俗以黃。

連豕粉。下其邪穢之糞。此亦由不潔餘氣。入兒臟中。本先因微寒。又遇風寒邪氣相搏。而痘疹成也。未。

出欲作之時。熱動五臟。則五臟之證先見。初用病時。先呵欠煩悶驚悸。乍涼乍熱。手足冷。面腮頰赤燥。

欬嗽噴嚏。此五臟證俱見也。呵欠煩悶者。肝也。時發驚悸者。心也。乍涼乍熱。手足冷者。脾也。面腮頰赤燥。欬嗽噴嚏者。肺也。惟腎無候。以在腑下。不能食故也。凡瘡疹乃五臟毒。若出歸一證。汗水泡。心為斑。脾為疹。腎雖無證。其後惡者。疹變倒靨而黑陷。則歸腎也。此由不慎風冷而不能食。內虛所致也。今大尉疹子無他證。當用平和藥為治。因用抱龍丸數服愈。海藏云。本先因微寒入一句。并由不慎風冷。而不能食。內虛一句。勿認作寒證。用抱龍血。即知斑疹之多熱也。

吳橋治姪孫。始孩累日發熱。蒸蒸驚搐。昏憤。眾醫不知所。橋曰。麻也。寒邪外乘。閉而不出。是脈脈耳。飲藥已數。中氣乃傷。藥不足恃也。當置沸湯一瓶。撤其蓋。令保母抱子坐湯側。稍擁被圍之。湯氣自遠。薰蒸少飯。藥內托麻出而解。後汪氏子病如子。亦用此法。並效。

薛立齋治一小兒。患疹作痛。發熱煩渴。欲服清涼。飲下之。診其脈不實。舉指不數。此邪在經絡也。不可下。遂用解毒防風湯。二劑而愈。此證小兒多患之。須審在表在裏。及邪之微甚而治之。王海藏曰。前人云。首尾俱不可下者何也。曰。首不可下者。謂斑未見於表。下則邪氣不能伸越。此脈證有表而無裏。故禁首不可下也。尾不可下者。謂斑毒已顯於外。內無根蒂。大便不實。無一切裏證。下則斑逆陷。故禁尾不可下也。

一兒作癢發熱。以消毒犀角飲。一劑作吐瀉。此邪氣上下俱出也。毒自解。少頃吐瀉俱止。其證果消。吐瀉

後脈見七至。此小兒和平之脈也。邪已盡矣。不須治。果愈。潔古云。斑疹之病。其爲證各異。發焮腫於外者。屬少陽三焦相火也。謂之斑。小紅行皮膚之中。不出者。屬少陰君火也。謂之疹。凡顯斑疹。若自吐瀉者。慎勿亂治。而多吉。謂邪火上下皆出也。斑疹並出。小兒難禁。是以別生他證也。首尾不可下。大抵安理之藥多。發表之藥少。祕則微疎之。令邪氣不擁。併令其次第出。使兒易見也。身溫暖者順。身涼者逆。沈明生治沈翰臣婦。欬嗽發熱。或認爲不足。遽用六味地黃湯。以滋陰分。旣而欬逆更劇。診之脈浮且數。風熱干乎肺家。宜用疎表之劑。服下。遍身發出紅疹。二劑欬差緩。而仍未透。更用辛涼等味。以清表熱。仍嗽復作。瀉不已。咸歸咎寒涼。沈笑曰。非也。肺受風邪。邪變爲熱。經云。邪并於陽。則陽熱而陰虛。始則疹在欲出未出之際。火上炎於手太陰而作嗽。今則疹在欲收未收之時。熱下移於手陽明而作瀉。是屬斑疹家常候。何足怪乎。行且止矣。果越兩日。而嗽甯瀉止。身涼疹退。按斑疹之候。雖異。斑疹之治。略同。是歲丁未。濕土司天。而春夏之交。燥旱殊甚。蓋猶襲乎昨歲燥金在泉之餘氣耳。是以初當涼解。而不利乎溫散。次當寒潤。而不利於溫補。六味地黃丸之屬。雖若相宜。然質濁味厚。不惟不能達表。抑且錮蔽外邪。施諸疹退。而餘熱未清之時。稍爲近理。今初熱始嗽。輒爲用之。是非滋陰。乃滋害也。況以丸爲湯。已非古人本意。而專投泛用。尤乘病變之機。自來善用六味者。何曾善用止。無過薛立齋。假使九原可作。視近日之湯法盛行。能無掩口胡盧哉。

痧疹者。手太陰肺。足陽明胃。二經之火熱也。小兒居多。大人亦時有之。殆時氣溫疫之類。其證類多。欬嗽多嚏。眼中爲淚。多泄瀉。多痰多熱。多濁多煩悶。甚則燥亂咽痛。昏焦神昏。是其候也。治法當以清涼發散爲主。藥用辛寒。甘寒。苦寒。以升發之。惟忌酸收。最宜辛散。誤施溫補。禍不旋踵。辛散如荊芥穗。乾葛。西河柳。石膏。麻黃。鼠粘子。清涼如元參。瓜蒌根。薄荷。竹葉。青黛。甘寒如麥冬。生甘草。蔗漿。苦寒如黃芩。黃連。黃柏。貝母。連翹。皆應用之物也。量證輕重。制劑大小。中病卽已。無太過焉。

痧疹乃肺胃熱邪所致。初發時多欬嗽。宜清熱透毒。不得止欬。疹後欬嗽。但用貝母。瓜蒌根。甘草。麥冬。苦

梗元參。薄荷。以清餘熱。消痰擁。則自愈。慎勿用五味子。收斂之劑。多喘咳者。熱邪擁於肺也。慎勿規定

喘藥。惟應大劑竹葉石膏。加西河柳兩許。元參薄荷各二錢。如冬天寒甚。疹毒爲寒氣鬱於內。不得透

出者。加蜜酒炒麻黃。一劑立止。凡熱勢甚者。卽用白虎湯。加西河柳。切忌過用升麻。服之必喘。多泄瀉

慎勿止瀉。惟用黃連升麻。乾葛。甘草。則瀉自止。藜按此却未妥。瀉乃肺移熱於大腸。仍以清肺爲主。疹家不忌瀉。瀉則陽明之熱

邪得解。是亦表裏分消之義也。疹後泄瀉。及便膿血。皆由熱邪內陷故也。大忌止瀉。仍用升麻。乾葛。白

芍。甘草。扁豆。黃連。便膿血。則加滑石。必自愈。疹後牙疳最急。外用雄黃牛糞。先煨存性。研極細。加真冰

片一分。研勻吹之。內用連翹。荊芥。穗元參。乾葛。升麻。藜按二味宜再酌。黃連。甘草。生地煎好。加犀角汁。二三十

匙調服。緩則不可救。疹復元氣不復。脾胃虛弱。宜用白芍。炙草爲君。蓮肉。扁豆。山藥。青黛。麥冬。龍眼

肉爲臣。多服必漸愈。慎勿輕用參朮。疹後生瘡不已。餘毒未盡也。用金銀花連翹荆芥穗元參甘草生

地鱉虱胡麻黃連木通濃煎飲之良。

廣筆記

葉天士曰。疹屬陽。肺經邪初起。必從表治。證見頭痛喘急。欬嗽氣粗口惡。一日二日卽發者輕。三五日者

重。陽病七日外。隱伏不透。邪反內攻。喘不止。必腹痛祕悶危矣。治法宜苦辛清熱。涼膈去積黃

方書胃足陽明胃疹。如雲佈密。或大顆如痘。但無根盤。方書謂手太陰肺疹。但有點粒。無片序者。用辛散

解肌。冬月無汗。壯熱喘急。用麻黃杏。如華蓋散三拗湯。夏月無汗。用辛涼解肌。葛根前胡薄荷防風香

薷牛蒡桔梗木通之屬。

古人以表邪口渴。卽加葛根。以其升陽明胃津。熱甚煩渴。用石膏辛寒解肌。無汗忌用。

凡瘡疹辛涼爲宜。用連翹辛涼。翹出衆草。能升能清。最利幼科。能解小兒六經諸熱。

春令發疹從風溫。夏季從暑風暑苗濕。秋令從熱燥燥氣。冬月從風寒。

疹宜通。泄瀉爲順。下痢五色者。亦無妨。惟二便不利者。最多凶證。治法大忌止瀉。疹本六氣客邪。風寒暑

濕。必從火化。疹旣外發。世人皆云邪透。孰謂出沒之際。升必有降。勝必有復。常有疹外發。方熱不除。致

咽啞齮腐。喘急腹脹。下痢不食。煩躁昏沉。竟以告斃者。皆屬裏證不清致變。須分三焦受邪屬多。或由

別病累瘁。須細體認。上焦藥用清涼。中焦藥用苦辛寒。下焦藥用鹹。徐靈胎曰。當用清滌內邪之法。上焦藥氣味宜

輕以肺主氣皮毛屬肺之合外邪宜辛勝裏甚宜苦勝若不煩渴病日多邪鬱不清可淡滲以洩氣分
徐靈胎曰葉氏用藥專重氣味此語本之內經即神農本亦首列之但終當深知其藥專治其病各有功能然後再於其中擇氣味之合者而用之方得內經本草之旨茲徒知其氣味則終無主見也
中焦藥疹火在中爲陽明燥化多氣多血用藥味苦寒爲宜若日多胃津消燥苦則助燥劫津甘寒宜
用下焦藥鹹苦爲主若熱毒下注成痢不必鹹以軟堅但取苦味堅陰燥濕

古人以疹爲經腑之病忌溫燥瀉補所謂痘宜溫暖疹宜清涼也然常有氣弱體虛表散寒涼非法淹淹
釀成損怯此但陰傷爲多救陰必扶持胃氣氣衰者亦有之當益氣穉年陽體純剛之藥忌用幼科方
書歌括曰赤疹遇清涼而消白疹得溫暖而解此溫字卽後人酒釀檉木粗草紙木綿紗之屬徐靈胎曰不是此溫雖不可不知然近來用者多無益外治之法最多

疳疹濕盛熱蒸口舌咽喉疳蝕若不速治有穿腮破頭咽閉喘促告斃矣治之宜早外治另有專方若湯
方法必輕淡能解上病或清散亦可

疹痢乃熱毒內陷與傷寒協熱邪盡則痢止同清忌升提忌補瀉輕則分利宣通重則苦寒解毒

初生

滑氏云小兒三歲以內看男左女右手虎口三關紋色紫絲紅傷寒青驚風白疳病黃色淡紅乃平常小
恙其筋文宜藏不宜暴露若見黑色則爲危險再脈紋見下截風關爲輕中截氣關爲重上截命關爲

尤重耳。直透三關爲大危。

葉天士曰。嬰兒肌肉柔脆。不耐風寒。六腑五臟氣弱。乳汁難化。內外二因之病自多。然有非風寒。竟至外感不停滯。已屬內傷。其故何與。嘗思人在氣交之中。春夏地氣之升。秋冬天令之降。呼去吸入。當時消息間。有穢濁吸入。卽是三焦受邪。過募原直行中道。必發熱煩躁。倘幼醫但執前藥。消導表散。清火通便。病輕或有倖成。病重必然顛覆。錢仲陽云。糞履不可近襁褓小兒。余言非無據矣。四十年來治效頗多。略述其概云。

春溫一證。由冬令收藏未固。昔人以冬寒內伏。藏於少陰。入春發於少陽。以春木內應肝膽也。寒邪深伏。已經化熱。昔賢以黃芩湯爲主方。苦寒直寢裏熱。熱伏於陰。苦味堅陰。乃正治也。知溫邪忌散。不與暴感門同法。若因外邪先受。引動在裏伏熱。必先辛涼。以解新邪。繼進苦寒。以清裏熱。況熱乃無形之氣。幼醫多用消滯。攻治有形。胃汁先涸。陰精刼盡者多矣。備用方。黃芩湯 涼膈散 葱豉湯 新邪引動伏邪 清心涼膈散 服之亦愈

風者春同受風。其氣已溫。經謂春氣病在頭。治在上焦。肺位最高。邪必先傷。此手太陰氣分。先病先治。則入手厥陰心包絡。血分亦傷。蓋足經順傳。如大陽傳陽明。人皆知之。肺病先治。逆傳心包絡。幼科多不知者。俗醫見身熱欬喘。不知肺病在上之旨矣。妄用大黃大苦。沉降丸藥。致脾胃陽和。傷極陡變驚癇。莫救者多矣。

風溫肺病治在上焦。夫風溫春溫忌汗。初病投劑宜用辛涼。若雜入消導發散。不但與肺病無涉。却盡胃汁。肺乏津液。上供頭目清竅。徒爲熱氣熏蒸。鼻乾爲煤目瞋。或上竅無淚。或熱深肢厥。或狂躁溺瀉。胸高氣促。皆是肺氣不宣化之徵。斯時若以肺藥少加一味清降。使藥力不至直趨腸中。而上痹可開。諸竅自爽。無如城市庸醫。僉云結胸皆用連薤柴枳。苦寒直降。致閉塞愈甚。此證初因發熱喘嗽。首用辛涼。清通上焦。如薄荷連翹牛蒡象貝桑葉沙參梔皮薤皮花粉。若色蒼熱勝煩渴。用石膏竹葉辛寒清散。疹證亦當宗此。茲日數漸多。邪不得解。苓連涼膈亦可選用。至熱邪逆入膈中。神昏目瞋。鼻竅無涕淚。諸竅欲閉。其勢危急。必用至寶丹。或牛黃清心丸。病減後餘熱。只甘寒清養胃陰足也。

春日暴暖急冷。先受溫邪。繼爲冷束。欬嗽痰喘最多。辛解忌濕。只用一劑。大忌絕穀。若甚者晝抱豎抱。物倒三四日。夫輕爲欬。重爲喘。喘急則鼻掀胸挺。備用方。虎莖湯。清心涼膈散。涼膈散。瀉白

散。葶藶大棗湯。白虎湯。至寶丹。清心大黃丸。竹葉石膏湯。喻氏清燥救肺湯。

夏爲熱病。然夏至以前時令未爲大熱。故經以先夏至爲病溫。後夏至爲病暑。二熱之病。幼醫易眩。夏暑發自陽明。古人以白虎湯爲主方。後賢劉河間創議。迴出諸家。謂溫熱時邪。當分三焦投藥。以苦辛寒爲主。長夏濕令。暑必由濕。暑傷氣分。濕亦傷氣。汗則耗氣傷陽。胃汁大受剋燥。變病由此甚多。發泄司令裏真甚虛。張用達云。暑病首用辛涼。繼用甘寒。再用酸泄酸斂。不必用下。可稱要言不煩矣。