

本草綱目 草部第十八卷下

草之七

蔓草類

草薺

別錄 中品

釋名 赤節

別錄

百枝

吳普

竹木

炮炙論

白菝葜

時珍曰 草薺名義未

詳曰 華本草言時人呼為白菝葜 象形也 赤節百枝與狗脊同名

集解

別錄曰 草薺生真定山谷二月八月采根曝乾 弘景曰 今處處有之 根似菝葜而小異根

大不甚有角節色小淺 茶曰 此有二種 莖有刺者根白實無刺者根虛軟軟者為勝 蔓生葉似薯蕷 頌曰 今河東荆蜀諸郡皆有之作蔓生苗葉俱青葉作三叉似山薯又有綠豆葉花有黃紅白數種亦有無花結白子者根黃白色多節三指許大春秋采根曝乾今歲德軍所產者根亦如山薯

而體硬其苗引蔓葉似蒼麥子三稜不拘時月采
根利刀切片曝乾用時珍曰草薺蔓生葉似菰
而大如盤其根長硬大者如商陸而堅今人皆以
土茯苓為草薺誤矣莖葉根苗皆不同吳普本草
又以草薺為狗脊亦誤矣詳狗
脊下宋史以懷慶草薺充貢

根氣味苦平無毒

別錄曰甘之才曰薺為之使畏葵根大黃柴胡前胡

治腰脊痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不瘳熱氣

本經

傷中悲怒陰痿失溺老人五緩關節老血

別錄冷風

癰痺腰脚癱緩不遂手足驚掣男子腎腰痛久冷

腎間有膀胱宿水

甄權

頭旋癰疾補水臟堅筋骨益

精明目中風失音

大明

補肝虛

好古

治白濁莖中痛痔

癰壞瘡

時珍

發明

時珍曰草薺足陽明厥陰經藥也厥陰主筋屬風陽明主肉屬濕草薺之功長于去風濕

所以能治緩弱瘳痺遺濁惡瘡諸病之屬風濕者
草薺薺羹土茯苓三物形雖不同而主治之功不
相遠豈亦一類數種乎雷斅炮炙論序云囊皺漩
多夜煎竹木竹木草薺也漩多白濁皆是濕氣下
流草薺能除陽明之濕而固下焦故能去濁分清
楊倓家藏方治真元不足下焦虛寒小便頻數白
濁如膏有草薺分清飲正此意也又楊子建萬全
護命方云凡人小便頻數不計度數便時莖內痛
不可忍者此疾必先大腑秘熱不通水液只就小
腸大腑愈加乾竭甚則渾身熱心躁思涼水如此
即重證也此疾本因貪酒色積有餘毒腐物瘀血
之類隨虛水入于小腸故便時作痛也不飲酒者
必平生過食辛熱葷膩之物又因色傷而然此乃
小便頻數而痛與淋證澀而痛者不同也宜用草

藥一兩水浸少時以鹽半兩同炒去鹽為末每服二錢水一盞煎八分和滓服之使水道轉入大腸仍以葱湯頻洗穀道令氣得通則小便數及痛自減也

附方 舊二 腰脚痺軟 行履不穩者革薺二十四分 杜仲八分搗篩每旦溫酒服

三錢七禁牛肉 唐 小便頻數 川革薺一斤為末 德宗貞元廣利方 酒糊丸梧子大每

鹽酒下七十 白濁頻數 凝面如油澄下如膏乃真 元不足下焦虛寒革薺分

清飲用革薺石菖蒲益智仁烏藥等分每服四錢 水一盞入鹽一捻煎七分食前溫服日一服効乃

止 腸風痔漏 如聖散用革薺貫眾去土等分為末 每服三錢溫酒空心服之 孫尚藥

傳家秘 頭痛發汗 革薺旋覆花虎頭骨酥炙等分 寶方 為散欲發時以溫酒服二錢暖

臥取汗立 瘥聖濟錄

莢莢

上蒲入切 別錄中品

釋名

莢莢

同

金剛根

華

鐵菱角

綱

王瓜草

日華

珍曰

莢

莢猶莢結也莢莢短也此草莖蔓強堅短小故名
接莢而江浙人謂之莢莢根亦曰金剛根楚人謂
之鐵菱角皆狀其堅而有尖刺也鄭樵
通志云其葉頗近土瓜故名王瓜草

集解

別錄曰生山野二月八月采根曝乾弘景曰
此有三種大畧根苗並相類莢莢莖紫而短

小多刺小莢莖紫而色深人用作飲恭曰陶云三
種乃狗脊莢莖草莖相類非也草莖有刺者葉粗
相類根不相類草莖細長而白色莢莖根作塊結
黃赤色殊非狗脊之流頌曰今近道及江浙州郡
多有之苗莖成蔓長二三尺有刺其葉如冬青烏
藥葉而差大秋生黃花結黑子如櫻桃大其根作
塊人呼金剛根時珍曰莢莖山野中甚多其莖似
蔓而堅強植生有刺其葉團大狀如馬蹄光澤似

柿葉不類冬青秋開黃花結紅子其根甚硬有硬
鬚如刺其葉煎飲酸澆野人采其根葉入藥家用
名鐵菱角吳普本草以菝葜
為狗脊非矣詳見狗脊下

根氣味甘酸平溫無毒主治腰背寒痛風痺益血

氣止小便利

別錄

治時疾瘟瘴

大明

補肝經風虛

好古

治

消渴月崩下利

時珍

發明

時珍曰菝葜足厥陰少陰藥氣溫味酸性毒而收與草薢彷彿孫真人元旦所飲辟邪屠

蘇酒中亦用之頌曰取根浸赤汁煮粉食辟瘴

附方

新五

小便滑數

金剛骨為末每服三錢溫酒下睡時

儒門事親方

沙石

淋疾

重者取去根本用菝葜二兩為末每米飲服二錢後以地椒煎湯浴腰腹須臾即通也

聖濟錄

消渴不止

拔穀卽接契咬咀半兩水三盞烏梅一個煎一盞溫服 普濟方

下痢赤白

金剛根蠟茶等分爲末白梅肉搗丸炙子犬每服五七丸 小兒三九白痢甘草

湯下赤痢烏梅湯 下 衛生易簡方

風毒脚弱

痺滿上氣田舍貧家用此最良接契洗到

一斛以水三斛煮取九斗漬麴去滓取一斛漬飲如常釀酒任意日飲之

肘後方

土茯苓

綱目

校正

併入拾遺 禹餘糧

釋名土草薺

綱目

刺猪苓

圖經

山猪糞

綱目

草禹餘糧

拾遺

仙遺糧

綱目

冷飯團

綱目

硬飯

綱目

山地栗

綱目

按陶弘景注

石部禹餘糧云南中平澤有一種藤生葉如接契根作塊有節似接契而色赤味如薯蕷亦名禹餘

糧言昔禹行山之食采此充糧而棄其餘故有此名觀陶氏此說卽今土茯苓也故今尚有仙遺糧

冷飯團之名亦其遺意陳藏器本草草禹餘糧蘇頌圖經猪苓下刺猪苓皆此物也今皆併之茯苓猪苓山地栗皆象形也俗又名過岡龍謬稱也

集解

藏器曰草禹餘糧生海畔山谷根如蠶連綴半在土上

食不飢頌曰施州一種刺猪苓蔓生春夏采根削

皮焙乾彼土人用傳瘡毒殊効時珍曰土茯苓楚

蜀山箐中甚多蔓生如蓴莖有細點其葉不對狀

頗類大竹葉而質厚滑如瑞香葉而長五六寸其

根狀如菰莖而圓其大若雞鴨子連綴而生遠者

離尺許近或數寸其肉軟可生啖有赤白二種入

藥用白者良按東山經云鼓證之山有草焉名曰

榮莫其葉如柳其本如雞卵食之已風恐卽此也

昔人不知用此近時弘治正德間因楊梅瘡盛行

率用輕粉藥重効毒留筋骨潰爛終身至人用此

遂爲要藥諸書無從考證往往指爲草解更按葵

然其根葉迥然不同宜參考之但其功用固相

近蓋亦草薺
抗莫之類也

根氣味甘淡平無毒時珍曰主治食之當穀不飢

調中止洩健行不睡燕器健脾胃強筋骨去風濕利

關節止泄瀉治拘攣骨痛惡瘡癰腫解汞粉銀朱

毒時珍

發明杌曰近有好淫之人多病楊梅毒瘡藥用輕粉愈而復發久則肢體拘攣變為癰漏延綿

歲月竟致廢篤惟到土草薺三兩或加皂莢牽牛各一錢水六盞煎三盞分三服不數劑多瘡蓋此

疾始由毒氣干於陽明而發加以輕粉燥烈久而水衰肝挾相火來凌脾土土屬濕主肌肉濕熱鬱

蓄于肌腠故發為癰腫甚則拘攣內經所謂濕氣害人皮肉筋骨是也土草薺甘淡而平能去脾濕

濕去則營衛從而筋脉柔肌肉實而拘攣瘰漏愈矣初病服之不効者火盛而濕未鬱也此藥長于去濕不能去熱病久則熱衰氣耗而濕鬱爲多故也時珍曰楊梅瘡古方不載亦無病者近時起于嶺表傳及四方蓋嶺表風土卑炎嵐瘴熏蒸飲啖辛熱男女淫猥濕熱之邪積畜既深發爲毒瘡遂致互相傳染自南而北遍及海宇然皆淫邪之人病之其類有數種治之則一也其證多屬厥陰陽明二經而兼乎他經邪之所在則先發出如兼少陰太陰則發于咽喉兼太陽少陽則發于頭耳之類蓋相火寄于厥陰肌肉屬于陽明故也醫用輕粉銀朱劫劑五七日卽愈蓋水銀性走而不守加以鹽礬升爲輕粉銀朱其性燥烈善逐痰涎涎乃脾之液此物入胃氣歸陽明故涎被劫隨火上升從喉頰齒縫而出故瘡卽乾痂而愈若服之過劑及用不得法則毒氣竄入經絡筋骨之間莫之能出痰涎旣去血液耗涸筋失所養營衛不從變爲筋骨攣痛發爲癰毒疳漏久明生虫爲癰疳足數

裂遂成廢癰惟土茯苓氣平味甘而淡為陽明太藥能健脾胃去風濕脾胃健則營衛從風濕去則筋骨利故諸證多愈此亦得古人未言之妙也今醫家有搜風解毒湯治楊梅瘡不犯輕粉病深者月餘淺者半月即愈服輕粉藥筋骨攣痛癰瘻不能動履者服之亦効其方用土茯苓一兩薏苡仁金銀花防風木瓜木通白鮮皮各五分皂莢子四分氣虛加入參七分血虛加當歸七分水二大盞煎飲一日三服惟忌飲茶及牛羊雞鵝魚肉燒酒法麵房勞蓋秘方也

附方

新六

楊梅毒瘡

鄧筆峰雜興方用冷飯團四兩皂角子七個水煎代茶飲淺者

二七深者四七見効一方瘡飯團一兩五加皮皂角子苦參各三錢金銀花一錢用好酒煎日一

服小兒楊梅

瘡起于口內延及遍身以土草解末乳汁調服月餘自愈外科發揮

骨攣癰漏

薛已外科發揮云服輕粉致傷脾胃氣血筋骨疼痛久而潰爛成癰連年累月

本草綱目卷十八
至于終身成廢疾者土草藥一兩有熱加苓連氣
虛加四君子湯血虛加四物湯水煎代茶月餘即
安○朱氏集驗方用過山龍四兩即硬飯加四物
湯一兩皂角子七個川椒四十九粒燈心七根水
煎日
療癰潰爛
冷飯團切片或為末水煎服或入
飲
色白者良忌鐵器發
物
陸氏積德堂方

白欽

本經
下品

釋名白草

本經

白根

別錄

兔核

別錄

貓兒卵

綱目

崑崙

別錄

宗奭

曰白欽服餌方少用惟欽瘡方多用之故名白欽

時珍曰兔核貓兒卵皆象形也崑崙言其皮黑也

集解

別錄曰白欽生衡山山谷二月八月采根曝
乾弘景曰近道處處有之作藤生根如白芷

破片竹穿日乾恭曰根似天門冬一株下有十許
根皮赤裏肉白如芍藥不似白芷蔓生枝端有五

葉所在有之頌曰今江淮及荆襄懷遠商賈
皆有之二月生苗多在林中作蔓赤莖葉如小桑
五月開花七月結實根如雞鴨卵而長三五枚月
一窠皮黑肉白一種赤欽花實功用皆同但表裏

爾

根氣味苦平無毒

別錄曰甘微寒權曰有毒之主

治癰腫疽瘡散結氣止痛除熱目中赤小兒驚癇

溫瘧女子陰中腫痛帶下赤白

本經殺火毒別錄治發

背癰癰面上疱瘡腸風痔漏血痢刀箭瘡撲損生

肌止痛

大明解狼毒毒時珍

發明

弘景曰生取根搗傳瘡腫有效頌曰今醫治
風及金瘡面藥方多用之往往與白及相須

而用

附方

舊三新十

發背初起

水調白飲末塗
肘後方

丁瘡初起

同方

上聖

惠方

一切癰腫

權曰白飲赤小豆
藹草為末雞
子白調塗之
陶隱居方用白

飲二分藜蘆一分為

末酒和貼之日三上

面鼻酒皴

白飲白石脂杏仁
各半兩為末雞子

清調塗旦洗

御藥院方

面生粉刺

白飲二分杏仁半
分雞屎白一分為
末蜜和雜水拭

面肘

後方

凍耳成瘡

白飲黃蘗等分
為末生油調搽
談楚翁方

湯火灼

爛

白飲末傅之
外臺方

諸物哽咽

白飲白芷等分
為末水服二錢
聖惠方

刺諸哽

及竹木哽在咽中
白飲半夏泡等分
為末酒服半錢日
二服聖惠方

刺在

肉中

上方同

胎孕不下

白飲生半夏等分
為末滴水
九梧子大每榆皮湯下五十

凡保命集

風痺筋急

腫痛屈轉易常處白飲二分熟附子一分為末每酒服半刀圭

日二服以身中熱行為候十日便覺忌猪肉冷水千金方

諸瘡不斂

白飲赤飲黃藥

各三錢炒研輕粉一錢用葱白漿水洗淨傳之瑞竹堂方

女萎

李當之本草

集解

恭曰女萎葉似白欽蔓生花白子細荆襄之間名為女萎亦名蔓楚用苗不用根與萎蕤

全別今太常謬以為白頭翁者是也時珍曰諸家誤以女萎解蕤蕤正誤見蕤蕤下

修治

斂曰凡采得陰乾去頭并白蕊於槐枯上剉拌豆淋酒蒸之從巳至未出晒乾

氣味

辛溫無毒主治止下痢消食

當

風寒洒洒霍亂洩

痢腸鳴遊氣上下無常驚癇寒熱百病出汗

唐本

附方

新

久痢脫肛

女萎切

楊氏產乳方

蠱下不止

女

雲實各一兩川烏頭二兩桂心五錢為末蜜丸身
梧子大每服五丸水下一日三服 肘後方

體癰瘍

斑駁女歲膏用魯國女歲白芷各一分附
子一枚雞舌香木香各二分為末臘猪脂

七合和煎入麝香一錢以浮
石磨破日擦之 古今錄驗

赭魁

本經
下品

釋名

時珍曰其根如魁有汁
如赭故名魁乃酒器名

集解

別錄曰生山谷中二月采弘景曰狀如小芋
肉白皮黃近道亦有恭曰赭魁大者如斗小

者如升蔓生草木上葉似杜衡陶所說乃土卵也
土卵不堪藥用梁漢人蒸食之名黃獨非赭魁也

保昇曰苗蔓延生葉似蘿藦根若拔莖皮紫黑

黃赤大者輪如升小者如拳所在有之時珍曰