

咳嗽

有火有風有寒有痰有癆有肺脹

傷風脉浮兼自汗頭眩眼脹鼻塞清涕者屬傷風冬月十神湯餘月芎蘇飲最捷

外感脉浮緊症兼頭痛拘急惡寒發熱無汗者

屬寒冬月十神湯加減餘月芎蘇飲加羌活

火寸滑而數或沉實而弦口乾頭時痛有聲痰

少面赤者火也宜降火清金加味芩連二陳

湯

鬱火如曾服涼藥或起初發散未淨火鬱在肺痰結不出兼氣促者仍用解散輕則芎蘇飲甚者加麻黃

已經發散降火咳嗽不已口乾內熱盛者二陳加枯芩花粉瓜蒌實蘇子耳寒潤之

痰脉滑或弦數動作便有痰聲痰出嗽止者痰也主豁痰利氣二陳加南星枳桔前胡香附滾痰丸佳

因痰而嗽者痰爲重主治在脾因咳而動痰者

咳爲重。主治在肺。一切食積痰積上升而致咳者。只治其痰。消其積。咳自止。不必用涼藥。肺藥。潔古曰。治咳嗽以化痰爲先。化痰以導氣爲主。以南星半夏化其痰。而咳嗽自愈。以枳殼橘紅利其氣。而痰飲自降。此其大畧耳。

痰爲火所逆上者。先瀉火。然亦看緩急治。或先降火。或先理氣。

陰虛脉弦而數。或細數。或瀯症兼盜汗。下午作寒熱。面色純白。兩頰赤。多清痰。乾咳者。勞也。

屬陰虛火盛清金補陰四物加竹瀝薑汁或
早服補陰丸晚服門冬膏

咳嗽氣脹壅遏不得眠者難治

乾咳乾咳嗽係火鬱之甚難治乃痰鬱火邪在
肺上用苦梗開之下用補陰降火藥不已則
成勞須行倒倉法此症因不得志者有之切
忌半夏宜瓜蒌貝母等潤劑惡心忌瓜蒌

脉弦急或溢出寸口動則喘急屬肺脹宜收斂

肺脹肺爲火傷遂成鬱遏脹滿用訶子爲君佐

以海粉青黛杏仁又曰肺脹而嗽或左或右
不得眠此痰挾瘀血碍氣而然宜養血以流
動平氣降火疎肝以清痰四物加桃仁訶子
青皮竹瀝薑汁之類

風寒鬱熱于肺夜嗽者三拗湯加知母脉數大
而浮加黃芩生薑

聲啞者寒包熱也宜半夏生薑辛以散之
久嗽聲啞不治是肺管破也

陰虛火動而嗽四物合二陳或加知母黃柏見

血者加貝母去半夏

陰虛或吐紅者坎離加五味子人參麥冬桑皮地骨皮

氣虛好色之人元氣虛弱咳嗽不愈瓊玉膏妙病後氣促咳嗽色黃白脉虛大多屬肺虛生脉散主之

咳血咳嗽見血多是陰虛火載血上四物二門二母牡丹皮阿膠脉數者忌參耆易沙參

肥白人咳嗽自汗日久不愈人參膏以生薑陳

皮佐之有痰熱痰藥

咳嗽聲嘶者乃血虛受熱用青黛蛤粉蜜調服之

醫說方治痰嗽用蚌粉新瓦上炒通紅入青黛少許以淡薑水滴入麻油數煎調服

食積痰嗽發熱半夏南星爲君瓜蒌萊菔子爲臣青黛海石石礮爲使薑汁浸蒸餅丸服

咳嗽聲嘶引兩脇痛不可忍者二陳加芎歸芍藥青皮柴胡草龍膽黃芩竹茹之類

脇痛嗽嗽而脇痛宜以青皮疎肝氣後以南星
香附青黛薑汁一云實者白芥子之類

嗽而心煩不安六一散加辰砂服

心脉不足兼心跳口乾煩躁者補心丹

久嗽失聲曾經發散過不愈者潤肺散主之訶
子五味子五倍子黃芩甘草爲末蜜丸噙化或
清音丸亦妙

有熱嗽失聲多服涼劑而聲愈不出者以生薑
汁調消風散或一味薑汁亦可冷嗽失聲尤宜

或噲橄欖丸、或煎一味枇杷葉湯、徐徐熱飲。
寒熱交作而咳嗽者、小柴胡加知母之類。一方
加芍藥、五味子、桑白皮、陰氣在下、陽氣在上、咳
嗽嘔吐、喘促瀉白散加青皮、五味子、人參、茯苓、
糯米。

咳而嘔、胃氣素弱、肺氣不利、咳嗽嘔吐、併作爲
子母俱病、最重。先安胃氣、二陳加白朮、薑汁。
準繩法、嗽吐痰與食俱出、乃飲食失節、致肝氣
不利、而肺又冒寒邪、肝爲濁道、肺主清道、清濁

相干宜二陳加木香杏仁細辛枳殼各半錢

熱嗽膏滿小陷膏湯有血碍氣作嗽桃仁去

皮尖大黃酒炒薑汁丸服

凡嗽春是上升之氣寒令尚存微兼辛散夏是
火邪炎上宜潤以降之秋是濕熱傷肺宜清肺
冬是風寒外束宜發散

早晨嗽多者胃中有食積至此時火氣流于肺
中以知母地骨皮降肺火

上半日嗽多者胃中有火知母石膏降之午後

嗽多者屬陰虛四物加知母黃柏先降六火
黃昏嗽多者火氣浮于肺不宜用涼劑宜五味
五倍歛而降之

久嗽用生訶子一枚含之嚥津漉漉後不知食
味煎檳榔湯服之便佳

治嗽須分新久虛實如久嗽脉滿或雖洪大按
之不鼓屬肺虛宜五味款花紫苑馬兜鈴之類
歛而補之或日數雖久脉數滑有力尚屬有
餘實火更宜清金尋火尋痰分緩急治一法

久嗽肺虛自汗倦怠參芪阿膠當歸生薑大冬
款花馬兜鈴酒芍藥煎服氣促有火脉數去人
參易沙參

治久嗽用訶子味酸苦有收斂降火之功五味
子收肺氣乃火熱必用之劑杏仁散肺中風熱
然肺實有火因于寒者爲宜桑白皮瀉肺氣然
性不純良用之多者當戒或用兜鈴以其去肺
火補肺也多用生薑以其辛能發散也瓜
其能潤肺寒能降火以肺受火逼失降下之令

今得其緩潤下之助則痰自降宜其爲治嗽之
要藥也除陰虛血虛火盛乾咳者勿用

嗽久不問風寒鬱熱曾先服過麻黃杏仁防風
等藥病雖退減而根未除者二陳加粟殼烏梅
阿膠五味子瓜蒌仁之類

久嗽必用粟殼不必疑要先去病根此乃收功
後藥也與治痢同

勞嗽卽火鬱嗽因火傷急遂成鬱遏脹滿不得
眠一邊調子取其酸苦有收斂降火之功佐

以海石、童便、浸香附、瓜蒌、青黛、杏仁、半夏、麴之類、薑汁調噙化、必以補陰為主、陰分嗽悉作陰虛治、肺燥者潤之、口乾痰不得出者、是屬熱桔梗、大力、雞子清、

肺氣虛無火色白者、人參膏、阿膠為主、陰不

足者、六味地黃丸為要藥、或知母、茯苓、湯見肺

痿門寒熱交作而咳嗽、小柴胡加知母、或加

五味子、痰積嗽、非青黛、瓜蒌不除、

因感冒已、經發散而咳不止、脉數無力、屬陰虛

六味地黄作湯服大驗

有食積人面青白黃色不常面上有如蟹爪路
一黃一白者是 一方香附瓜蒌貝母海石青
黛半夏麴軟石膏山查子枳實薑汁炒黃連蜜
調嚥下

嗽而咳逆非蛤粉青黛瓜蒌貝母不除

久嗽曾經解散涼藥致肺胃俱寒飲食不進用
溫中助胃加和平治嗽之藥

形瘦脉澁無汗者屬陰虛宜潤肺

若酒色過度、虛勞、少血、津液內耗、心火自炎、遂使燥熱乘肺、咯唾膿血、上氣涎潮、其嗽連咳、而不已、夫惟血不榮肌、故邪在皮毛、皆能入肺、而自背得之尤速、此則人參、芎歸、萬不可無者、

口燥咽乾、有痰者、不用半夏、南星、恐性燥也、用瓜蒌、貝母、膈間有痰、飲作脹者、忌瓜蒌、恐泥膈、不鬆快、知母止嗽、清肺、滋陰、降火、

酒多傷肺、咳嗽、青黛、瓜蒌、蜜丸、噙化、救肺、一方、

紫蘇、濃煎汁、生韭、竹瀝、吞上丸、或加杏仁煎、

食積作嗽發熱者半夏南星爲君瓜蒌蘊菴子
爲臣青黛石醵爲使

吸入肺久嗽者用鶩管石雄黃鬱金款冬花爲
末以生薑一片置舌上以藥末伴艾子薑上灸
之取煙入喉中

治嗽烟筒用鶩管石雄黃款花佛耳草爲末以
雞子清刷紙上捲藥末作筒燒烟以口啣吸烟
入喉薑湯下

久嗽必用薰用款花鷄子清將蜜拌花潤入有