

傷寒下痢

夫痢之爲症。有因熱毒流入臟腑而成者。有因寒邪入胃而成者。有因藥品迅攻而成者。亦有結胸而下痢者。更爲凶症也。凡下痢如表症已罷。卽須下之。此通因通用之法也。至若腹中急痛。而甚時時乾嘔。火氣上逆。唇鮮口渴。下如屋漏水。或如爛肉汁者。并痢後而便血者。竝皆不治。

傷寒失音

失音之源不一。有因痰壅氣閉。有因失血驚恐。有因邪熱衝心。心氣耗損。有因火燥金傷。不能宣布。然咽喉音喑如。

故。而。舌。不。能。轉。運。者。爲。舌。瘡。如。舌。能。轉。運。言。語。而。咽。喉。音。聲。則。無。者。爲。喉。瘡。舌。瘡。多。因。於。心。腎。喉。瘡。多。因。於。肺。胃。

傷寒奔豚

奔豚者。因。過。汗。過。下。而。濁。氣。犯。上。也。汗。者。心。之。液。過。汗。則。心。虛。過。下。則。脾。損。腎。無。所。制。水。不。畏。火。上。逆。凌。心。必。臍。下。悸。動。發。自。少。腹。上。至。心。下。名。曰。奔。豚。奔。豚。者。腎。積。也。治。宜。補。脾。瀉。腎。而。已。

傷寒腹痛

腹痛有寒熱二候。如煩滿氣粗。口渴噎氣。倍食停滯。或畜。

血結聚者是屬熱也。若腸鳴瀉痢時時少痛不甚不已。口唾苦澀。重按則愈。此屬寒也。如身發大熱而腹痛。酷喜重裘按肚者。此表熱內寒也。

傷寒蓄血症

蓄血俗名內傷。或積勞。或多怒。或他後行房。或負重努力。或登高墜下。或奔逐過急。皆致蓄血。其證多發熱而顙外感。但不頭疼。不作渴。天明少間。至午復劇。汗多至頭而還。自汗無氣。以息目光短。不得臥。不思飲食。二便自利。小便或赤。大便或瀉。小腹急。大便黑。小便自利如狂喜。急者是。

也。治宜辛溫行血。佐以鹹寒。如桃仁、紅花、延胡、鬱金、歸尾、蘇木、降香、赤芍、五靈脂、蒲黃、紅麴、牛膝、莖汁、花蕊石、大黃之類。瘀血行後。宜補脾和肝。調和氣血爲主。海藏曰：大凡血症皆不飲水。惟氣症則飲水蓄血發躁。而內不渴。雖漱水而不欲嚥也。

傷寒囊縮

囊縮者。有陽有陰。陽證囊縮者。因熱極筋枯而燥縮也。急用大承氣湯下之。陰證囊縮者。因寒極筋勁而收縮也。急用四逆湯加吳茱萸湯溫之。婦人無囊。觀其乳頭縮者是。

也。凡治此症，先灸關元氣海，丹田及蒸熨臍法，甚効。至於陰縮者，肝筋寒也；陰挺者，肝筋熱也。

傷寒循衣摸床

凡循衣摸床，直視譫語，脉弦者生，脉濇者死。小便利者可治，以其肺氣猶降，膀胱猶能化氣，而腎水未枯也。不利者不可治，謂津液枯竭也。此乃肝熱乘肺，元氣虛衰，不能主持陰陽二氣，俱絕名撮空症也。極虛之候，不論傷寒何病，俱以大劑參芪，或八珍，或獨參湯，峻補之。多有活者。若大便秘結，撮空譫語燥渴者，此爲實熱，宜承氣湯下之。

傷寒身重肉苛

病有身重不能轉側者。有身疼不能轉側者。何也。身重不能轉側者。下後血虛津液不榮於外也。身疼不能轉側者。風濕相搏於經也。二者頗類虛實不同。治則各異。若症惡而覺身重倍常者。死。以陰陽氣離形骸。獨留無氣升舉。故身倍重也。其肉苛者。雖著衣絮猶尚苛也。由發汗過多。損傷榮衛。肉失所養。故頑痺不仁。痛癢不知也。用羌活沖和湯。類加桂枝。當歸。木香。主之。

傷寒搖頭

頭者諸陽之會。陽脉有乖。則頭爲之搖動。經曰。諸風掉眩。皆屬肝木。多因氣血虛弱。而風火上乘。鼓動以致之。然有心絕而搖頭者。有風盛而搖頭者。蓋陰根於陽。陽根於陰。陰陽互根。氣血周流無間。若心絕則神去。而陰竭陽獨無根。不能自主。所以頭搖。經云。陽毒留形。體如烟熏。直視搖頭是也。至於太陽發瘧。則風盛於上。風主乎動。是以頭搖。經所謂獨搖頭。卒口噤而背反張者是也。言搖頭中有痛也。言者爲虛。不言爲實。均是搖頭。析而分之。曰實邪曰虛邪。曰真邪。當隨症施治。外灸百會。風府等穴。其搖卽定。

傷寒鼻寒

鼻爲肺竅。肺爲臟首。寒欲客肺。肺則與邪相搏。是以肺液爲涕。氣壅而寒。此爲寒也。久則鬱而爲熱。火燥金燥。津液不濡。榮衛凝滯。清氣不升。是以肺竅爲之不通。此爲熱也。寒者溫之。熱者清之。

傷寒自汗

寒多中榮。風多中衛。榮得寒則痛。衛得風則熱。寒傷於榮。則無汗而爲傷寒。風傷於衛。則有汗而爲傷風。榮衛俱虛。因必自汗。蓋榮行脈中。衛行脈外。榮虛則不能守。脈中氣。

虛則不能衛脉外。以致汗出。汗者血也。寒則凝滯。故痛。熱則妄行。故汗。汗出而渴者。主發瘡。痍。汗出而不渴者。生熱。將散也。如身熱。汗極。昏睡不言。筋攣背強。其脉沉微。此是欲變風候也。如頭有汗而身無汗。心胸懊懣。是中有停滯。而津液不得下行也。若身熱微微。昏沉多睡。身有汗而獨頭無。且寸口脉微者。是亡陽之候。如陰症諸候俱備。但身首俱有微汗者。未可謂之純陰。蓋陰脉皆至頸而還。今達陽部。故知非也。

傷寒勞復食復

勞復者因傷寒初愈血氣未平早作勞動致損真氣觸其
餘毒而病謂之勞復食復者因胃中稍和卽爲倍食胃氣
未充不能消化或邪熱內伏未經盡去因與穀氣相搏而
病此謂食復勞者調之食者消之更有傷寒口欲言舌不
轉眼睛不慧反能食者爲除中邪火殺穀之象也

傷寒瘥後女勞復

瘥後因交合而復者名女勞復其候體重少氣頭重不舉
目中生花腰背痛小腹裏急絞痛或引陰中拘攣或憎寒
發熱時時陰火上衝頭面烘熱心胸煩悶者是也宜燒裯

散之類。小腹急痛。脉沉足冷。用當歸四逆湯加熟附茱萸之類。若見卵縮入腹。脉見離經者。死。然有男子病新瘥。未與婦人交接。感動其情。思其慾事。心切而得病者。其治亦與女勞復同。

傷寒瘥後陰陽易

陰陽易者。因瘥後交合。而無病之人。反得病者是也。其候大便不通。心神昏亂。驚惕不安。體重少氣。少腹裏急。及引陰中拘攣。熱上衝胸。頭重不欲舉。眼中生花。脉脛拘急。是也。然腎經虧敗。真陽虛損。故有寒無熱。脉虛足冷。宜人參。

四逆湯調下燒裊散陰頭微腫則愈若婦人病未平復有犯房事小腹急疼腰膝俱痛四肢不仁無熱者當歸白朮散凡陰陽易極難調理須分寒熱施治若舌出數寸者死

傷寒瘥後發腫

傷寒愈後浮腫若因水氣者宜利之若胃虛食少者宜五苓散加蒼朮陳皮木香砂仁之類胃不虛者以商陸一味煮粥食之亦妙傷寒大病瘥後足腫者不妨但節飲食戒酒色胃氣強腫自消也

傷寒瘥後遺毒

傷寒汗下不徹餘邪結在耳後一寸二三分或兩耳丁便
硬腫者名曰遺毒宜速消散緩必成膿以連翹敗毒散治
之如項腫痛加威靈仙大便實加大黃穿山甲如發腫有
膿不消或已破未破者但用內托消毒散加角刺升麻金
銀花甘草之類然古八方書之論如此但實多由於久熱
傷陰蓋少陽少陰陰虧已極因乃虛火上衝所以腮頰耳
痛也經曰榮氣不從逆于肉裏乃生癰腫况耳後方
圓一子皆屬于腎有何毒之謂歟治宜以滋陰化痰散鬱
和肝而腫自愈如熟地麥冬土貝母生白芍連翹甘桔之

類畧佐青皮柴胡少許足已。若尺脉甚弱者竟用上病療下之法。投以引火歸源之藥。則腫不治而自散。若誤認以毒爲事而攻之。不惟腫結愈固而愈甚。必致變生別病而危矣。此張之鄙見也。

傷寒瘥後碗頭瘡

碗頭瘡者亦有汗下後餘毒不盡。故瘥後而發碗頭瘡也。只以黃連甘草歸尾紅花防風苦參荆芥連翹羌活白芷之類煎服。外用芫花赤小豆青黛爲末以雞子清和猪膽汁調敷瘡上最效。勿動其靨。待其自脫。若瘥後小便澀有

血者亦是餘熱毒也。名曰內外瘡。亦皆有屬。若不出膿者。死。宜用黃連解毒湯。加生地。歸尾。連翹。木通。滑石。牛膝。篇蓄。琥珀。甘草。梢之類。

傷寒身癢

凡陽明反無汁。皮中如蟲行者。胃主肌肉。陽明久虛也。宜木附湯。黃耆建中湯主之。如風熱盛。身癢發熱。無汗。口燥。舌乾。六便秘澀者。宜防風通聖散。加羌活主之。如風證身癢者。宜小續命去附子。加白附子主之。如血虛身癢者。宜四物湯。加浮萍。蒺藜。防風主之。

論大頭傷寒治法

發於鼻額紅腫。以至兩目盛腫而不開。額上面部皆赤而腫者。屬陽明也。或壯熱氣喘。口乾舌燥。咽喉腫痛不利。脈來數大者。用普濟消毒飲主之。如內實熱盛者。用通聖消毒飲。若發於耳之上下前後。并頭角紅腫。此屬少陽也。或肌熱日晡。熱寒熱往來。口苦咽乾。日疼脇下滿。宜小柴胡加花粉。羌活。荊芥。連翹。芩連主之。若發於頭上。并腦後項下。及目後赤腫者。此屬太陽也。宜荊芥。敗毒散主之。若三陽俱受邪。併於頭面耳目鼻者。以普濟消毒散外用清涼

救苦散。較之治法。當先緩後急。則邪伏也。先緩者。宜退熱。消毒。虛人兼扶元氣。胃虛食少者。宜助胃氣。候其大便內結熱甚。方以大黃下之。拔其毒根。此先緩後急之法也。蓋此毒先腫於鼻額。次腫於目。又次腫於耳。從耳至頭上絡後腦結塊則止。若不散。必成膿也。俗云大頭天行。親戚不相訪問。染者多不救。泰和間多有病此者。醫以承氣加藍根下之。稍緩。翼日如故。下之又緩。終莫能愈。漸至危篤。東垣視之曰。夫身半以上。天之氣也。身半以下。地之氣也。此邪熱客於心肺之間。上攻頭而爲腫盛。以承氣瀉胃中之