

脇痛

跌撲損傷

疥瘡

癰疽

疔瘰

諸瘡

丹溪心法附錄卷之十六

火鬱門

脇痛

七十四

丹溪心法

○脇痛肝火盛

木氣實

有死血

有痰流注

肝急

木氣實

用蒼朮川芎青皮當歸之類

痛甚者肝火盛以當歸龍會丸薑汁

下是瀉火之要藥

死血用桃仁紅花川芎

痰流注以二陳湯加

南星蒼朮川芎

肝苦急急食辛以散之用撫芎川芎蒼朮血病入

血藥中行血

治咳嗽脇痛以二陳湯加南星香附青皮青黛入薑

汁 脇痛有瘀血行氣藥中加桃仁不去尖并香附之類

有火盛

者當伐肝木

左金丸治肝火

有氣鬱而胸脇痛者看其脉沉澁

當作鬱治

痛而不得伸舒者蜜丸龍會丸最快

脇下有食積一

條扛起用莢葉煎炒黃連

控涎丹一身氣痛及脇痛痰挾死血加

批仁泥丸服

右脇痛用推氣散出嚴氏方

左脇痛用前藥為君

加柴胡或小柴胡湯亦可治

入方

小龍會丸

當歸

草龍膽

酒洗

山梔

炒

黃連

炒

川芎

各半兩

大黃

煨半兩

蘆會

三錢

木香

一錢

一方有黃芩柴胡各半兩無入莢木香

一方有甘草柴胡青皮無當歸梔子

為末入射香少許粥糊丸如芩豆大每服五十九薑湯下仍以

琥珀膏貼痛處
龍會丸亦治有積因飲食人飽勞人月

當歸龍會丸
治內有濕熱兩脇痛生以琥珀膏貼痛處却以生薑

汁吞此丸
痛甚者須炒令熱服

草龍膽

當歸

大梔子

黃連

黃芩
各一兩

大黃

蘆薈

半兩

木香

一錢半

黃柏

一兩

麝香

半錢

右十味爲末麪糊丸
一方加柴胡川芎各半兩

又方加青黛

半兩
蜜丸治脇痛
麪丸降肝火

抽青丸
瀉肝火

黃連

半斤

右爲末蒸餅糊丸服

附諸方

推氣散 治右脇疼痛腹脹不食

枳殼

桂心

片子薑黃

各半兩一作薑黃

甘草

炙一錢半

右為末每服二錢薑棗湯調下酒亦可

枳芎散

治左脇痛刺不可忍者

枳實

川芎

各半兩

粉草

炙一錢半

右為末每服二錢薑棗湯下酒亦可

鹽前散

和劑方

治男婦人一切冷氣攻上胸脇刺痛不能已及脾

胃虛冷嘔吐泄瀉膀胱小腸氣婦人血氣

縮砂仁

去殼

甘草

炙

茯苓

去皮

草果仁

去皮煨

肉豆蔻

川芎

洗

茴香

少

葶澄加

大麥芽

檳榔

良薑

枳殼

蒼朮

陳皮

去白

羌活

厚朴

右咬咀每服三錢水一盞入鹽少許煎至七分去渣空心溫服

沉香降氣丸 御藥院方

治一切氣不升降脇肋刺痛胸膈痞塞

沉香

檳榔 各二錢半

人參

訶子 煨去核

大腹皮 炒各半兩

白木

紫蘓葉

香附子 炒

神麴 炒

麥藥

烏藥 各一兩

陳皮 去白

甘草 炒

鹽黃 各四兩

京三稜 煨

蓬莪朮 煨

益智 炒去殼 厚朴 去皮薑製各二兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分不拘時去渣溫服

分氣紫蘓飲

治男人婦人脾胃不和胸膈壅塞腹脇疼痛氣促喘

急 見喘類

調中順氣丸

收萃方

治三焦氣滯水飲停積脇下虛滿或時刺痛

木香

白豆蔻仁

青皮 去白

陳皮 去白

三稜 炮各一兩

人腹子

半夏

湯泡七次各二兩

縮砂仁

檳榔

沉香

各半兩

右為木水糊丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸陳皮湯送下

復元通氣散

和劑方

治氣不宜通或成瘡癰并閃挫腰脇氣滯不

散

方見腰痛

枳殼黃散

治悲哀傷肝氣痛引兩脇

方見氣滯

一方

治脇下疼痛如神効

小茴香

一兩炒

枳殼

五錢楚炒

右為末每服二錢鹽湯調下

十寶湯

治脇痛甚効病人氣實可用虛人不可出

甘遂

芫花

慢火炒

大戟

各等分

右為末水一大盞棗十枚切開煮取汁半盞調半錢人實更加一

錢量虛實加減

控涎丹

見痛風

二陳湯

見痰煩

左金丸

見火類

小柴胡湯

見傷寒

琥珀膏

見積聚

或謂子曰脇痛之症多是肝火上升不得條達之故而局方鹽煎散沉香降氣散分氣紫蘓飲調中順氣丸俱是辛溫之劑但能行氣開鬱豁痰消積而已其於降火未之有也病源是火而用辛溫之藥治之則是以火濟火而痛愈甚矣子曰不然古人方必經

有驗而筆之於書豈肯妄作而誣後人哉但後人不善於用也丹
溪曰脇痛肝火盛木氣實有死血有痰流注予每度之凡左脇痛
甚者即是肝火盛木氣實也宜用龍會丸左金丸辛涼之劑以治
之凡右脇痛微者即是痰流注并食積宜用鹽煎散順氣丸等藥
辛溫之劑以治之是也又嘗論夫左脇痛胃脘痛二証婦人多有
之以其憂思忿怒之氣素蓄于中發則上衝被濕痰死血阻滯其
氣而不得降達故作痛也故治婦人諸痛諸疾必以行氣開鬱爲
主而破血散火無之庶乎得法矣諺云香附縮砂婦人之至寶山
藥從蓉男子之佳珍此之謂也

跌撲損傷

丹溪心法

○跌撲損傷用蘓木和血黃連降火白朮和牙重復煎如
者可先須補接後下瘀血 在上者宜飲韭汁或和粥喫 切不可
飲冷水血見寒則凝但一絲血入心卽死

入方

治跌撲損傷

跌撲出血者薑汁香油各四兩酒調服之

治顛傷骨折及血出者

用滑石甘草爲末人參湯調服次用生薑自然汁一盞米醋一盞
獨核肥皂四箇敲破浸於薑汁米醋中紗片濾過去渣入牛皮膠
煎成膏藥貼之遍身者皆可

按骨散

沒藥

乳香

各五錢

自然銅

一兩

煨碎滑石

一兩

龍骨

三錢

赤石脂

三錢

麝香

二字另研

燥

右爲末好醋浸沒煮多爲上乾就炒燥爲度臨睡服時入麝香抄以茶匙留舌上溫酒下分上下食前後服若骨已接尚痛去龍骨赤石脂而服多儘好極効

○世以自然銅爲接骨藥然此等方儘多太抵在補氣補血補土俗工惟在速効以罔利迎合病人之意而銅非煨不可服若新出火者其火毒金毒相弱挫香挾藥毒雖有接傷之功而燥散之禍甚於刀劍戒之

又方

冬瓜皮

阿膠

各等分

石炒乾為末以酒調飲醉為度

附諸方

加味芎藭湯 三因方

治打撲傷損敗血流入胃脘嘔黑血如豆汁

當歸

白芍藥

芎藭

荊芥穗

百合

水浸半日將合分

右咬咀每服四錢水一盞酒半盞同煎七分不拘時服

紫金散

楊氏家藏

治打撲傷折內損肺肝嘔血不止或有瘀血停

積於內心腹脹滿

紫金藤皮

二降真香

續斷

補骨脂

琥珀

另研

無名異

煨細酒淬七次

蒲黃

牛膝

酒浸

當歸

洗焙

桃仁

去皮尖各一兩

大黃

紙裏煨

朴硝

另研各一兩半

右為末每服二錢濃煎蘓木當歸酒調下開進三服利即安

復元活血湯 拔萃方

治從高墜下惡血留於脇下及疼痛不可忍

柴胡 五錢

花粉

當歸 各三錢

紅花

甘草 各一錢

大黃 酒浸一兩

穿山甲 二錢

桃仁 五十箇

酒浸研如泥

右咬咀每服一兩水一盞酒半盞加桃仁泥煎至八分服以利爲

度

當歸導滯散 聖惠方

治落馬墜車打撲傷瘀血大便不通洋腫痛

昏悶蓄血內壅欲死

大黃 一兩

當歸 二錢半

麝香 少許

右爲末每服三錢熱酒下和劑方只大黃當歸二味等分酒調下

或以酒煎服亦可

鷄鳴散

治從高降下及木石壓傷瘀血凝積痛不可忍並以此藥

推陳致新

大黃

酒蒸一二兩

桃仁

七粒去皮尖

當歸尾

五錢

右為末酒一碗煎去渣五更雞鳴時服取下惡血即愈 若氣絕

不能言急以熱小便灌之即甦

奔命散

濟生方

治刀刃所傷及從高墜下木石壓損瘀血凝積必

腹疼痛大小便

大黃

黑牽牛

各二兩

紅土至用石灰慢火炒令乾黃色半兩

右為末每服二錢用熱酒調下約行四五里再用熱酒調牽牛末

二錢催之瀉下惡血成塊以盡為愈

○已上諸方辛涼疎導瘀血之齊

花葉石散

和刺方

治一切金刃所傷打撲傷損身體出血者急於

傷處慘藥其血自化爲黃水如有內損血入臟腑熱煎童子小便
入酒少許調一錢服之立効若牛舐腸出不損者急送入用細絲
桑白皮尖茸爲線縫合肚皮縫上移藥血止立活如無桑白皮用
生麻纒亦得並不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然
後慘藥婦人產後敗血不盡惡血奔心胎死腹中胎衣不下並用
童子小便調下

硫黃

上色明淨者四兩搗爲粗末

花藥石

一兩搗爲粗末

右二味相拌和勻先用紙筋和鹽泥固濟瓦罐子一箇候泥乾入

藥於內再用泥封口候乾安在四方磚石上書八卦五行字用炭

一秤籠疊周匝自巳午時從下着火令漸漸上徹直至經宿火冷

炭消又放經宿罐冷取出細研以細絹羅了羅極細磁盒內盛依

前法服

沒藥降聖丹

和劑方

治打撲閃肭筋斷骨折攣急疼痛不能屈伸

及榮衛虛弱外受遊風內傷經絡筋骨緩縱皮內刺痛肩背拘急

身體倦怠四肢少力並皆治之

自然銅

火服醋淬十二次研為末水飛過焙

川烏頭

生去皮臍

白芍藥

沒藥

別研

乳香

別研

當歸

洗焙各一錢

生乾地黄

川芎

各一錢半

右並生用為細末以生薑自然汁與蜜等分煉熟和丸每一兩作

四丸每服一丸槌碎水酒各半盞入蘘木少許同煎至八方去蘘

木熱服空心食前服

治打撲內損筋骨疼痛

本事方

沒藥

乳香

芍藥

川芎

川椒

去目及開口者

升藥付余

卷十六

跌損

八

當歸

各半兩

自然銅

三錢半炭火燒

右爲末黃蠟二兩溶開入藥末不住手攪勻丸如彈子大每服一

丸用好酒煎開乘熱服之隨痛處臥霎時運進有效

乳香定痛散 治打撲傷損落馬墜車一切疼痛

乳香

沒藥

川芎

白芷

芍藥

甘草

牡丹皮

生地黄

右爲細末每服二錢溫酒并童子小便調不拘時服

沒藥乳香散

御藥院方

治打撲損傷腫不可忍者

白朮

劉五兩

當歸

白芷

沒藥

別所

肉桂

去皮

乳香

別研

甘草

炒各一兩

右爲末入研藥并研令勻每服二錢溫酒調下不拘時服