


續增女科  
下



女科下卷

陽田傳書主徵君手著

妊娠惡阻三本九

婦人懷娠之後惡心嘔吐思酸解渴見食憎惡困倦

人皆曰妊娠惡阻也誰知肝血太燥乎夫婦人受妊本於

腎氣之旺也腎旺是以攝精然腎一受精而成娠則腎水

生胎不暇化潤於五臟而肝為腎之子日食母氣以舒一

日無津液之養則肝氣追索而腎水不能應則肝益急肝

急則火動而逆也肝氣既逆是以嘔吐惡心之症生焉嘔

吐縱不至大甚而其傷氣則一也氣既受傷則肝血愈耗

亦有肝鬱

氣滯胸膈

虛弱見食

不惡不能

多食難保



妊娠而吐惡  
阻宜分別

治之安另

有方

方種及且蘇

子一瀉於

一錢之

因初上元生

人稟賦最

或非用二兩

不效今下

元用二錢可

也萬不可用

世人因四物湯治胎前諸症者正以其能生肝之血也然

補肝以生血未為不佳但生血而不知生氣則脾胃衰微

不勝頻嘔山恐氣虛則血不易生也故於平肝生血之中

加以健脾開胃之品以生陽氣則氣能生血尤益胎氣耳

或疑氣逆而用補氣之藥不益助其逆乎不知妊娠惡阻

其逆不其且逆是因虛而逆非因邪而逆也因邪而逆者

助其氣則逆增因虛而逆者補其氣則逆轉況補氣於神

血之中則陰足以制陽又何慮其增逆乎宜用順肝益氣

湯

人參

兩

當歸

一兩  
酒洗

蘇子

一兩  
炒研

白朮

二錢  
上炒

助肝滯湯  
 全當歸活泥  
 炒三錢  
 去虛三錢  
 扁豆去皮四  
 錢  
 錢二錢  
 錢砂二錢  
 錢半錢  
 錢八分  
 皮八分  
 六分  
 水煎服

茯苓二錢

熟地五錢

白芍三錢

麥冬三錢

陳皮三分

砂仁一錢

神麩一錢

水煎服一劑

輕二劑

平三劑

全愈

此方平肝則肝逆除  
 補腎則肝燥息  
 補氣則血易生  
 凡肝病而少帶惡阻者  
 俱以此方投之無不安  
 最有益於胎婦其功更勝於四  
 物焉



妊娠浮腫

妊婦有五個月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身頭面俱腫人以爲濕氣使然也誰知是脾肺氣虛乎夫妊娠雖有按月養胎之分其實不可拘於月數總以健脾補肺爲大綱蓋脾統血肺主氣胎非血不蔭非氣不生脾健則血旺而蔭胎肺清則氣旺而生子苟肺衰則餒餒氣餒則不能運氣於脾虛矣脾虛則血少血少則不能運血於肢體矣氣與血兩虛脾與肺失職所以飲食難消精微不化勢必至氣血下陷不能升舉而濕邪卽乘其所虛之處積而成浮腫症非由脾肺之氣血虛而然卽治法當補



其脾之血與肺之氣不必祛濕而濕自無不去之理方用  
加減補中益氣湯

人參五錢

黃芪二錢

生用

柴胡一錢

甘草一分

當歸三錢

酒洗

白朮五錢

土炒

茯苓一兩

升麻三分

陳皮二分

水煎服四劑即愈十劑不再發夫補中益氣湯之立法

也原是升提脾肺之氣似乎益氣而不補血然而血非

氣不生是補氣即所以生血觀當歸補血湯用黃芪為

君則較著彰明矣况濕氣乘脾肺之虛而相犯未便大

補其血恐陰大盛而招陰也只補氣而助以利濕之品

白朮味令  
多以蒼朮充  
之於白朮傍  
皆更愛白朮  
補胎法此打  
胎用者宜審  
苦地其德以  
白朮豆山藥  
代之較妥



南京中医药大学图书馆版权所有

則氣升而水尤易散血亦隨之而生矣然則何以專用  
茯苓而至一兩不幾以利濕爲君乎嗟嗟濕症而不以  
此藥爲君將以何者爲君乎况重用茯苓於補氣之中  
雖曰滲濕而仍是健脾清肺之意且凡利水之品多是  
耗氣之藥而茯苓與參朮合實補多於利所以重用之  
以分濕邪卽以補氣血耳

妊娠小腹疼 四十一

妊娠小腹作疼胎動不安如有下墮之狀人只知帶脈無力也誰知是脾腎之虧乎夫胞胎雖繫於帶脈而帶脈實關於脾腎脾腎虧損則帶脈無力胞胎即無以勝任矣况人之脾腎虧損者非飲食之過傷即色慾之太甚脾腎虛則帶脈急胞胎所以有下墜之狀也然則胞胎之系通於心與腎而不通於脾補腎可也何故補脾然脾爲後天腎爲先天脾非先天之氣不能化腎非後天之氣不能生補腎而不補脾則腎之精何以遽生也是補後天之脾正所以補先天之腎也補先後二天之脾與腎正所以固胞胎



之氣與血脾腎可不均補乎方用安奠二天湯

人參一兩

熟地一兩

白朮一兩

山藥五兩

山萸五錢

炙草一錢

杜仲三錢

枸杞一錢

扁豆五錢

水煎服一劑而疼止二劑而胎安矣夫胎動乃脾腎虛

虧之症非大用參朮熟地補陰補陽之品斷不能挽回

於心刻世人往往畏用參朮或少用以冀建功所以寡

效此方正妙在多用也

人參一兩無力者以黨參代之無上黨參者以嫩黃芪代之古之人參即今之上黨參也得黃台黨無是必以黃芪代之亦不必拘泥謂人參即遼參屬參則誤矣杏初識



妊娠口乾咽痛四十二

妊娠至三四個月自覺口乾舌燥咽候微痛無津以潤以  
至胎動不安甚則血流如經水人以爲火動之極也誰知  
是水虧之甚乎夫胎也者本經與血之相結而成逐月養  
胎古人每分經絡其實均不離腎水之養故腎水足而胎  
安腎水虧而胎動雖然腎水又何能動胎心腎經之火動  
而胎始不安耳然而火之有餘仍是水之不足所以火炎  
而胎必動補水則胎自安亦旣濟之義也惟是腎水不能  
遽生必須滋補肺金金潤則能生水而水有逢源之樂矣  
水旣有本則源泉混混矣而火又何難制乎再少加以清

丹極妙用  
 之立應  
 不可同  
 痛商加  
 根駒干等  
 葉方不可  
 同過潤而  
 加雲芥

熱之品則胎自無不安矣方用潤燥安胎湯

熟地

一兩九蒸

生地

三錢酒炒

山萸肉

五錢蒸

麥冬

五錢去

五味

二錢炒

阿膠

二錢粉炒

黃芩

一錢酒炒

益母

二錢

水煎服二劑而燥息再二劑而胎安連服十劑而胎不

再動矣此方專填腎中之精而兼補肺然補肺仍是補

腎之意故腎經不乾燥則火不能灼胎矣焉有不安之

理乎



妊娠吐瀉腹痛 四十三

妊婦上吐下瀉胎動欲墮腹疼難忍急不可緩此脾胃虛極而然也夫脾胃之氣虛則胞胎無力必有崩墜之虞又上吐下瀉則脾與胃之氣因止瀉而愈虛欲胞胎之無恙也得乎然胞胎疼痛而究不至下墜者何也全賴腎氣之固也胞胎繫於腎而連於心腎氣固則交於心其氣通於胞胎此胞胎之所以欲墮而不得也且腎氣能固則陰火必來生脾心氣能通則心火必來援胃脾胃雖虛而未絕則胞胎雖動而不墮可不急救其脾胃乎然脾胃將絕而未絕之時只救脾胃而難遽生更宜補其心腎之火



白朮多湯  
 阿桂更何  
 佳者用者  
 若有真藥  
 固妙如無  
 宜藥白朮  
 以白扁豆  
 代之肉桂  
 以破故紙  
 代之

使之生土則兩相接續胎自固而安矣方用煖土固胎湯

人參 一兩  
 白朮 二兩  
 山藥 一兩  
 肉桂 二錢

製附子 五分  
 續斷 三錢  
 杜仲 三錢  
 山黃 一兩

枸杞 二錢  
 兔絲子 三錢  
 砂仁 三錢  
 炙草 一錢

水煎服一劑而洩止二劑而諸病盡愈矣此方救脾胃

之士十之八救心腎之火十之二也救火輕於救土者

豈以土欲絕而火未甚哀乎非也蓋土崩非重劑不能

煖火衰雖劑小而可助熱藥多用必有太燥之虞不比

溫甘之品也况胎動係土衰而非火弱何用太熱之娠

忌桂附是恐傷胎豈可多用小熱之品計之以錢太熱



之品計之以分者不過用以引火而非用以壯火也其  
深思哉

妊娠子懸脇疼 四十四

妊婦有懷抱憂鬱以致胎動不安兩脇悶而疼痛切已上  
弦人止知是子懸之病也誰知是肝氣不通乎夫養胎半  
係於腎水然非肝血相助則腎水實有獨力難支之勢故  
保胎必滋腎水而肝血斷不可不顧使肝氣不鬱則肝之  
氣不閉而肝之血必旺自然灌溉胞胎合腎水而並協養  
胎之力今肝氣因憂鬱而閉塞則胎無血蔭腎難獨任而  
胎安得不上升以覓食此乃鬱氣使然也莫認爲子之欲

大斗下

妊娠



自懸而妄用泄子之品則得矣治法宜開肝氣之鬱結補

肝血之燥乾則子懸自定矣方用解鬱湯

人參 一錢

白朮 五錢

白茯苓 三錢

當歸 一兩

白芍 一兩

煨虎 五分

砂仁 三粒

山梔子 三錢

薄荷 二錢

水煎服一劑而悶痛除二劑而子懸定至三劑而全安  
去梔子再服數劑不復發此乃平肝解鬱之聖藥鬱  
開則木不尅上肝平則火不妄動舟中又有健脾開胃  
之品自然水情四布而肝與腎有潤澤之機則胞胎目  
無乾燥之患又何慮上懸之不愈哉

方如慧仁  
米三四小  
先妙



北京中医药大学图书馆版次

妊娠跌損 四十五

妊婦有失足跌損致傷胎元腹中疼痛勢如將墮者人只知是外傷之為病也誰知有內傷之故乎凡人內無他症胎元堅固即或跌撲閃挫依然無恙惟內之氣血素虧故畧有閃挫胎便不安若止作閃挫外傷治斷難奏功且恐有因治而反墜者可不慎與必須大補氣血而少加以行瘀之品則瘀散胎安矣但大補氣血之中又宜補血之品多於補氣之藥則無不得之之用救損安胎湯

當歸 一兩 酒洗

白芍 三錢 酒炒

生地 一兩 酒炒

白朮 五錢 土炒

炙草 一錢

人參 一錢

蘇木 三錢 搗碎

乳香 一錢 去油

即用尋  
白朮土炒  
焦最妙以  
其能理氣  
行血也於





白朮味湯  
甘不能明  
氣行血用  
者知之

女利下

浸藥一錢  
去油

水煎服一劑而疼痛止二劑而勢不下墜矣不必三劑也此方之妙妙在既能去瘀而不傷胎又能補氣補血而不凝滯固無通利之害亦痊跌閃之傷有益無損大建奇功即此方與然不特治懷孕之閃挫也即無娠閃挫亦可用之