

傷寒補天石⑥



下之。如結胸煩踈目直視者不治。一云急下之。四邊微紅中成黑灰色行路者。此由失下。四五下之。方退舌見白胎中見黑小點亂生。當有表症。其病之來雖惡涼膈散微表之退。即用調胃承氣湯下之。舌見黃而有小黑點者。熱必深也。邪傳六腑將入五臟。急服調胃承氣湯。亦爲十存四五。舌見黃而中有黑至尖者。熱毒邪氣已深。兩感者下之。十有九死。有下利者下之可治。舌見兩弦灰色中有暈根二條。此熱乘入

腎命門急當下之。若遲難救。舌見灰色。無惡寒惡風。脈雖浮。亦可下之。下之見黑尿者。不可治也。舌見大黑。而有亂紋者。脈滑實。急下之。九死一生。脈浮數。無力。不治。舌見白胎滑者。必往來寒熱。舌見白胎紫黃。色者。必泄。舌見四圍白而中有黃者。必作煩渴嘔吐之症。舌見黃而中有黑點亂生者。其症必渴。譫語。脈滑者生。脈濇者死。下之見黑尿者死。舌見有紅星者。將發黃也。舌見有黑圈者。過經未解也。火裂舌心。火

熱極也。涼膈散加黃連。虫碎。舌裏熱之甚也。小承氣下之。凡舌青而紫者爲陰寒。赤而紫者爲陽毒。黑而滑者爲陰寒。黑而燥者爲陰毒。大要鮮紅滋潤者吉。紫黑乾燥凶。治胎須用薄荷水浸青布于舌上洗淨。或用生姜薄片蘸水時時刮之。其胎自退矣。傷寒如舌吐出寸餘不收。用梅花冰片研末摻上卽收病。重者用冰片五錢。

察聲法第一百二十六

凡病人出言壯厲者外感有餘也。出言懶怯者內傷不足也。譏語狂言者邪氣盛則實也。鄭聲者精氣衰則虛也。鼻塞身重者傷風也。聲嘶者肺有風熱也。聲啞者肺傷風熱也。卒然無音者寒氣客會厭也。咽不得息者胸中有寒也。唇口生瘡聲啞者狐惑也。咽中生蒼聲啞者少陰也。口噤咬牙者風痙也。鼻息如鼾睡者風溫也。喉中漉上有聲者痰飲停上焦也。要在審其聲而隨症治之。若見卒中風涎痰湧盛口噤



不言或脉絕直視遺尿者難治。聲如鼾睡者難治。

讖語第二百二十七

經曰邪氣盛則實。精氣奪則虛。實則讖語。虛則鄭聲。
胃中實熱上乘于心。心爲熱。旨則神識昏迷。妄有所
見而言也。輕則睡中呢喃。重則不睡。亦語有讖語者。
有獨語者。有言語不休者。有言亂者。此數者見其熱
之輕重也。大抵熱入于胃。水涸尿燥。必發讖語。爲實
也。有火劫取汗而讖語者。有亡陽讖語者。有下利清

穀不竭讖語者此爲虛也或脉來沉實洪數有力因
見夫大便不通小水赤燎渴讖語狂妄腹中脹滿鞭
痛或潮熱自汗或下利純清水心腹鞭痛者皆裏症
邪熱燎屎也俱大承氣湯下之下後利不止與夫喘
滿氣逆而上奔自利氣脫而下奪皆爲逆也彼脉洪
數而見小便赤手足溫與調胃承氣湯三陽合病脉
實身重難轉口中不仁面垢遺尿白虎湯或大便結
大熱乾嘔錯語呻吟不眠犀角解毒湯初得病無熱

狂言妄踈不安。神采不與人相。當五苓散二錢。以新汲水探吐。狂言漱水不欲嚥。大便黑。小水自利。身黃。脹滿。此因當下失下。當汗不汗。是瘀血譫語。桃仁承氣湯下。盡黑物。則愈。婦人經水適來。適斷。續得寒熱。此爲熱入血室。小柴胡湯。陽明喜妄如狂。亦瘀血也。照前桃仁承氣下。盡黑物。則愈矣。各各不同。但脉短者死。脉和者愈。又發汗多亡陽。譫語身自和。不可下。柴胡桂枝湯。和其營衛。營衛和。津液生而自愈也。下

經傳集注卷一

後胸滿煩驚小便不利讞語一身盡重不可轉側柴

胡加龍骨牡蠣湯

半夏柴胡牡蠣人參龍骨
鉛丹桂枝茯苓大黃棗姜

火劫取

汗讞語桂枝湯去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯若

下利直視讞語者死也又陽症讞妄脉沉細手足逆

冷者不過一日死矣

有獨語者獨自語而如見鬼

也甚則捻衣摸床微喘直視若脉弦小便利者生脉

濇小便不利者則死可下者下之未可下者小柴胡

合白虎湯

有錯語者意錯而言亂也自知言錯邪



氣尚輕。自不知覺。邪熱甚而正氣衰也。解毒湯。白虎湯。小柴胡。大柴胡。隨症施治。有狂言者。邪熱亢甚。發狂。叶喊而言也。或弄衣而走。登高而歌。此陽明內實也。大承氣湯。

鄭聲第三十一

鄭聲如鄭衛之聲。謂不正也。蓋汗下後。病人元氣虛脫。氣不接續。而喉中鄭重也。如氣息不促。手足頗溫。脉沉細者。急以白虎湯合生脉散。助其元氣。或濃煎。

獨參湯徐飲之亦良法也脉微細手足冷大小便自
利用白通陽葱白之卒以通陽氣姜附之辛以散陰
寒也乾姜附子葱白朮

瘖啞不言第三十二

少陰咽中生瘡不能言語者雞子苦酒湯雞子一枚去黃內苦

酒半夏于穀中安火上令三沸去滓少少含嚥之蓋
半夏之辛能發聲音雞子之甘能緩咽痛苦酒之酸
能斂咽
痛故也
狐惑上唇有瘡聲啞者瘖病口噤不能言者

俱治在本條熱病瘖啞不言三四日不得汗者死熱



甚火傷肺金不能言者。清肺降火則愈。風熱擁盛。咳嗽聲啞者。清風熱降痰火則愈。又有失于發散。風邪伏于肺中者。當以發散爲主也。

咽痛第三十三

咽喉不利而痛。或成瘡不能語言。不納穀食。皆邪熱毒氣上衝少陰而痛也。少陰之脉循喉嚨。挾舌本。脉浮遲。厥冷吐利。並不可汗下。少陰二三日。咽痛者。甘草湯不瘥者。桔梗湯。

桔梗辛溫以散寒。甘草甘平以除熱。甘桔相合以調寒熱。少



續傷寒論卷上

陰下利咽痛胸滿心煩者猪膚湯

猪水畜也其氣先入腎少陰客熱是

以猪膚解之加白蜜以潤燥除煩白粉以益氣斷利

少陰咽中生瘡不能言

聲不出者苦酒湯嚥含之

雞子一枚治法在前

少陰咽痛半夏

散及湯

半夏桂枝之辛以散經寒甘草之甘以緩正氣

少陰下利清穀裏寒

外熱手足厥逆脉微欲絕面赤咽痛者通脉四逆湯

乾姜附子

腎傷寒一症乃非時暴寒伏于少陰之經

參甘草

頭痛腰痛脉微弱後必下利咽痛半夏桂枝湯

半夏桂枝

炙甘草下利四逆湯蓋甘草主少陰客熱咽痛桔梗湯



主少陰寒熱相搏咽痛半夏散及湯主少陰客寒咽

痛也咽痛有寒有熱不可槩作風熱治也如陽毒咽

喉腫痛熱極也陰毒咽喉不利寒極也並治在本條

咽喉閉塞烏翮湯烏翮脂煎去滓薄綿裹內喉中

射于頭口瘡赤爛蜜浸黃柏噉咽痛甚者升麻六物

湯大青升麻梔子杏仁黃芩葱下後寸脉沉遲尺脉不至手足厥

逆而泄利不止咽喉不利寸脈血為難治麻黃升麻

湯麻黃升麻當歸知母黃芩芍藥桂枝甘草茯苓



氣短第三十四

短氣者。呼吸不相接續也。陽明心腹脹滿喘而短氣。
潮熱者。邪在裏而爲實。宜下之。大柴胡小承氣。
濡滿而短氣者。邪在表而爲虛也。宜解之。桂枝湯。
少飲多水。停心下。短氣者。小半夏湯。
搏汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。邪氣在表。甘
草附子湯。
白甘草附子太
陽誤下短氣。懊
憊煩燥爲結
胸者。大陷胸湯。
大黃甘草身涼乾嘔。短氣汗出不惡寒。

半夏
茯苓
風濕相



此表解裏有水十棗湯

芫花甘遂大戟大棗十枚煎湯調服一錢口鼻之

氣難以布息而短氣者人參四逆湯汗吐下後

元氣

虛弱而短氣者人參養榮湯

參芪苓芍歸熟地白朮遠志陳五味

氣逆第三十五

氣逆者氣自腹中時逆上衝也因太陽病下之表邪

乘虛傳裏裏不受邪則氣逆上行而邪在表也當汗

之桂枝湯不上衝者勿與之厥陰客熱上衝此熱在

裏而氣上也大柴胡湯病後虛羸少氣氣逆上衝欲

經傳集注卷之六

吐者竹葉石羔湯八麥甘草與門冬有動氣因發汗

而氣李根湯半夏茯苓桂芍當二者皆正氣虛而

邪氣逆也如桂枝症頭不疼項不强寸脉浮微胸中

痞鞭上衝咽喉不得息此為胸中有寒瓜蒂散吐之

脉微者不可吐吐則愈甚頭眩脉沉緊不可汗一則

動經身為振搖桂枝茯苓白朮甘草湯

喘第三十六

脉浮無汗更加喘宜與麻黃
屬太陽若不惡寒知在胃汗

多潮熱下何妨汗後水停微發喘青龍加杏
去麻黃二陽合病胸中滿只用麻黃按古方

