

張仲景傷寒論原文淺註卷四

閩長樂陳念祖修園集註

辨陽明病脈證

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者

陽不解太陽之標熱合陽明之燥熱併於太陰脾上之中脾之津液為其所燥而窮約所謂脾約是也正陽陽明者

蓋以燥氣主之也蓋以燥氣主之也

無中見太陰濕土之化所謂胃家實是也少陽陽明者

蓋以少陽之上相火發其汗誤利其小便則水穀之津液耗竭而少胃中燥則大便難是也此一節言陽明

有太少正之分也

何謂陽明之為病

燥氣為陽明之本氣燥氣藏於上胃家實也此復申明正陽陽明之

為病也按沈堯封云此是陽明證之提綱後稱陽明證三字俱有胃家實在內胃家

實言以手按胃中實硬也如大陷胸證按之石硬即名實熱梔子豉證按之心下濡即

名虛煩夫心下俱以濡硬分虛實何獨胃中不以濡硬分虛實乎此說與柯韻伯之論

相表裏雖非正解亦可存參

問曰何緣得陽陽明病答曰太陽之津液從胃太陽病若發汗若下若利小便此皆亡胃

津液胃中液而乾燥解之邪熱因轉屬於陽明其不更衣腸內之實腸內既大便必難通

塞者此名太陽轉陽明也此一節承上章太陽陽明病而言也然重申胃家實之旨是

傷寒論淺註

卷四

陽明篇

張仲景傷寒論原文淺註卷四

閩長樂陳念祖修園集註

辨陽明病脈證

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者蓋以陽明之太陽陽不解太陽之標熱合陽明之燥熱併於太陰脾土之中脾之津液為其所燥而竅約所謂脾約是也正陽陽明者蓋以脾氣者陽明之本也氣人亦有此燥氣燥氣太過無中見太陰濕土之化所謂胃家實是也少陽陽明者蓋以少陽之上相火發其汗誤利其小便則水穀之津液耗竭而少胃中燥火熾煩而實則大便難是也此一節言陽明有太少正之分也

何謂陽明之為病。燥氣為陽明之本氣。燥氣盛於上。胃家實也。此復申明正陽陽明之

為病也。按沈堯封云。此是陽明證之提綱。後稱陽明證三字。俱有胃家實在內。胃家實。言以手按胃中實硬也。如大陷胸證。按之石硬。卽名實熱。梔子豉證。按之心下濡。卽名虛煩。夫心下俱以濡硬分虛實。何獨胃中不以濡硬分虛實乎。此說與柯韻伯之論相表裏。雖非正解。亦可存參。

問曰何緣得太陽明病。答曰太陽之津液從胃府水穀而生患太陽病若發汗若下若利小便此皆亡胃

津液胃中無津液而乾燥解之其太陽未邪熱因轉屬於陽明其不更衣腸內之實腸內既實其大便難通

陽明病總綱

問曰有諸中外者陽明病外證云何答曰胃熱之外見者肌肉之中身熱與太陽之表熱不同

於外名曰汗自出與太陽之自汗不同表寒已解故不惡寒裏熱已反惡熱也只因有胃家實之病根即

寒反惡熱之病情內外俱備方是陽明之證此一節補出陽明外證合上節為一內一外之總綱

問曰身熱不惡寒既得病有始得之一日不發熱而惡寒者何也答曰陽明主金氣金氣

惡寒及邪既入於肌雖得之一日散而不待解惡寒將自罷燥氣即自汗出而惡熱也此陽明

也此承上文不惡寒反惡熱而言也但上文言陽明自內達外之表證此言風寒外入之表證

問曰經表散其惡寒何故自罷答曰與他經不同居其中土也為萬物所歸故凡表寒裏熱

無所不化皆從燥無所復傳於太陽其氣通始雖頗惡寒而二日為陽明主氣之期正傳而邪有所

歸故惡寒自止此胃家實為陽明病根也此復設問答以明惡寒自罷之故並指出胃家實根也

過汗止津液而轉屬陽明者固多而汗本太陽病初得病時發其汗汗先出不徹其太陽

氣不徹隨汗而泄者亦有轉屬之證此外傷寒發熱無汗其時即伏胃嘔不能食發汗

而反汗出澀澀然者水液外泄則是又有一轉屬陽明證也上文歷言陽明本經之

自為病此復申明太陽轉屬陽明之義除過汗止津液外又有此汗出不徹而轉屬不

因發汗而轉屬合常變而並言之也

三日為少陽主氣之期病因傷寒三日現陽明證脈大為邪歸中土無所復傳是

宜乘其氣而樞轉外出矣今傷寒三日現陽明證脈大不能從少陽之樞而解也

(述)自

此以上六節論陽明之氣。主表而外合太陽。主裏而內關津液之義也。按此即高士

宗所謂讀論者因證而識正氣之出入因治而知經脈之循行。則取之有本用之無窮矣。

陽明與太陰正氣相為傷寒。陽脈大浮而緩。陽明身手足自溫。是為陽明而不在表裏邪氣亦交相為繫。傷寒明脈今浮而緩。陽明身手足自溫。是為陽明而不在表裏邪氣亦交相為繫。

陰者。濕土也。濕身當發黃。若小便自利者。下泄故。不能發黃。至七日。過為八日。值陽明主

移其所繫而繫陽。大便無有硬者。此為陽明也。此節合下節。陽明與太陰相表裏之義也。

傷寒。由太轉繫陽明者。其人硬而大便澹然微汗出也。此承上節而補言陽明之汗出。

卽上章所云外證俱在其中矣。

陽明不特與太陰表裏。陽明中風。不涉於本氣之燥化。而口苦咽乾。復涉於太陰腹滿微

喘。又涉於太陽發熱惡寒。陽明協於太陽故。脈象浮見大而見緊。浮緊之脈宜若誤下之

於陽土中。則中土不腹增滿。少陽之三焦不。小便難證之新也。述此言陽明之氣不特

與太陰為表裏。抑且中合於少陽。外合於太陽也。

陽明本經自病。未曾久留太陽經而化熱者。風若能食。名中風。以風能鼓動不能食。名中

寒。以寒能閉拒陽明之氣也。然此特初病則然。久此一節以食而辨風寒之氣。卽以食

而驗陽明之胃氣。因正而辨邪。因邪而識正。善讀者能會心於文字之外。則得矣。

試論陽明病。若中寒。陰寒過甚。不得本氣燥不能食。水而不小便不利。四肢為諸陽之本。胃

手足澹然汗出。此欲作。大便固澹泄而仍不瘕。瘕。燥氣必大便初硬。寒氣用後卽瘕。所以然

者以胃中冷水穀不能別故也。此言陽明中寒也。

中風論陽明之中風病兩陽相得故初病時欲食在陽明小便當利大便當硬今病小便反不利

大便反自調是津液尚還入於胃中但不得少陰之陽明故水以其人骨節疼且骨節合於

翁如有熱狀病難自解乃遇陰奄然而煩燥發狂譫然汗出而解者此少陰水之陰不勝陽穀

神之氣而兩相合遂與作汗而共并解之義也戰慄汗脈而為轉遲緊則愈蓋以緊則為陰陰氣

矣此言陽明中風也。陽明病欲解時從申至戌上蓋陽明壯於申酉病氣天之助也然此陽明之表證

此言陽明欲解之時作一小結也。陽明病胃氣實則不能食可以知其胃氣攻其熱則虛不

復傷胃必噦所以然者胃中虛冷故也此胃氣存止之關頭日以其人胃本虛故攻其熱必

噦此一節言陽明中氣虛寒之為病也。陽明病能食今不能食可以知其胃氣攻其熱則虛不

胃氣虛則不能陽明病脈而反遲是經脈不能稟氣於胃也內經云食氣入胃濁氣歸心

其飽若不能散達食難用飽飽則脈濁氣歸心不淫於微煩能循經上行而頭眩經下行必

止留滯於胃故食難用飽飽則脈濁氣歸心不淫於微煩能循經上行而頭眩經下行必

見小便難滯於中為腹滿此欲作穀疸病也雖已下之而腹滿如故所以然者以胃虛不能

經脈遲故也此一節言食氣入胃胃虛不能淫精於經脈也。胃氣虛則不能陽明病脈而反遲

胃氣虛則不能陽明病法當多汗今反無汗其身癢如蟲行皮中狀者此以胃久虛不能

輸精於皮毛。陽明病法當多汗今反無汗其身癢如蟲行皮中狀者此以胃久虛不能

輸精於皮毛。陽明病法當多汗今反無汗其身癢如蟲行皮中狀者此以胃久虛不能

於皮故也。內經云輸精皮毛毛脈合精行氣於府可知內而經脈此一節言胃氣虛不

能輸精於皮毛也。

陽明居中土主灌溉於上下內外陽明病法當多反覺無汗而小便利。寒氣中於裏而水
四旁也。茲先言中寒氣逆於上陽明病汗而反覺無汗而小便利。寒氣中於裏而水
主氣之三。數不拘日嘔而欬即內經所謂邪中於手足厥者胃陽虛寒其氣不能敷布於
期以及三日。數不拘日嘔而欬即內經所謂邪中於手足厥者胃陽虛寒其氣不能敷布於
髮際至頭顱陽明寒氣必苦頭痛若不欬不嘔手足不厥者。為寒氣已除而陽明正氣頭
牽連正氣而上逆故。
不痛。此節言陽明之氣合寒氣而上逆於頭不能灌溉於四旁也。凡言邪即以言正言

正即以言邪為讀仲師書第一要法。余於數節必重申之不厭於複也。述此章凡四節
論陽明居中土主灌於上下內外四旁也。

再言中風陽明病。其證不一然但頭眩此證不在陽明提綱之內且有陽不惡寒知病
氣逆於上。陽明病他證無論但頭眩。此證不在陽明提綱之內且有陽不惡寒知病
陽明而不屬陰經矣。前云故吾即能食矣由是熱氣上衝肺受火燥而發欬極其人必咽
痛。若熱不上干不欬者咽亦不痛此一節言陽明之氣合風熱而上逆於咽不得流通
於下也。程扶生云陰邪下利故無汗而小便利風邪上行故不惡寒而頭眩寒則嘔

不能食。風則能食。寒則頭痛。風則咽痛。是風寒入胃之辨也。按雖本章之意不重在此
而亦不可不知。欬出於肺。當云喉嚨痛。今胃熱甚則咽痛。二者相連。氣必相侵。

更有鬱於陽明病。其氣不能外無汗。勝脫則小便不利。心中懊惱者。中土鬱而或熱熱
中土之證。達於皮毛則無汗。勝脫則小便不利。心中懊惱者。中土鬱而或熱熱
於外身必發黃。此節合下節皆言陽明之氣鬱於中土不得達外而下輪也。

鬱於中土若誤火更益其熱陽明病醫者不知所以無汗之被火周身之氣燥極而熱額上而微汗出又不得下小便不利者濕熱相搏亦必發黃此節即上節所言發黃之證借被火以言其更甚也凡誤服羌獨荊防及薑桂烏附之類皆以被火概之陽明之脈起於鼻行髮際

至額顙

陽明原主病今診脈浮而緊者仍見太陽表虛自汗之脈陽明被太陽之必乘其所旺潮

熱如潮發作有定時脈若浮而緊者是見太陽表虛自汗之脈陽明被太陽之風邪外與

必為盜汗述此三節言陽明主裏復外合於表氣內通於經脈復還於胃中也

陽明之脈起於鼻交陽明之燥熱病其口乾無不燥若熱止在但欲以漱水濟其經熱漱不欲

嚥下者熱不在胃故也陽明氣血俱此必發此言陽明之津液通於經脈而為血也

陽明病本自汗出醫更重發汗之外熱病已差而尚微煩不了了者此大便必硬故也津液

所以汗亡其津液胃中乾燥故令大便硬今姑不問當問其小便日幾行若汗本日小便

日三四行今煩之止再行故知大便不久自出蓋以大小便皆胃今為小便數少以津

液當復還入胃中故知不久必大便也此胃府實大便硬亦有不此言陽明之津液復

還於胃中也

陽明證既有不可不下傷寒嘔多為陽明胃氣之雖有陽明之燥熱證切不可攻之此一

節言胃氣虛者不可下也述陽明有胃氣有悍氣有燥氣胃氣者柔和之氣也悍氣

者。慄悍滑利。別走陽明者也。燥氣者。燥金之氣也。病在悍氣者。可攻。病在燥氣者。可攻。病在胃氣者。不可攻。病在燥氣而胃氣虛者。亦不可攻。故此三病俱言不可攻也。

按師言其不可。非坐視而不救也。必有所以可者在。正面旁面對面皆可。悟其治法。若

常器之補亡論。必處處補出方治。無論其搔不著癢也。即有偶合之處。反令驚飛魚躍。

水流花放。活潑文章。俱成糟粕。長洲汪苓友多宗其說。何其陋歟。

陽明病。外有身熱自汗出不惡寒反惡熱之證便知其內為胃家實之證心下鞭滿者。止

但胃家實只指不下利而言務宜活看亦知其實處即是虛處若心下尚未及腹止是硬滿而不兼痛此不可攻之。誤若攻之則穀氣盡利遂不止者死若利

陽明水穀空虛胃無所仰虛硬虛滿自止者。是其人胃氣尚在機愈此一節言虛而假實者不可下也受業薛步雲按。心

下為陽明之膈。膈實者腹必虛。氣從虛閉。是陽明假實證。攻之是為重虛。

內經云中於面則下陽明以陽明病。通面合見赤色。為陽氣拂鬱於表不可攻之。若攻之胃氣徒

陽明之脈上循於面故也大耗熱不必復發熱。面色之赤黃色內經云三焦膀胱者腠理毫毛共應以三焦主腠理

得越故失其氣小便不利。為發黃也此一節言外實內虛者不可下也。

不可攻者既明而可講陽明病。不吐不下。可知其胃心煩者以胃絡上通於心陽明之燥火

攻者更不可以不講雖曰不和可與調胃承氣溫之。以和此一節言陽明胃府不和宜與調胃承氣也。

却是不和陽明病。脈遲。為陽邪入於裏陰然止言脈猶不足憑也必以雖汗出。為陽熱之內蒸而表

陽明病陽明病。脈遲。為陽邪入於裏陰然止言脈猶不足憑也必以雖汗出。為陽熱之內蒸而表

陽明病陽明病。脈遲。為陽邪入於裏陰然止言脈猶不足憑也必以雖汗出。為陽熱之內蒸而表

之證不惡寒者。主其表證之已罷然表證已罷尤當再驗其裏證陽明其身必重邪結於中必發

而短氣滿腹。勢必上下通而為喘。知其已屬大承氣證矣然猶必身熱變為潮熱有潮熱者

此外欲解可攻裏也。又必通身熱蒸之汗變為手足濕然之汗熱與汗俱飲止手足濕然

而汗出者此大便已硬也。以大承氣湯主之若其汗出雖多微發熱惡寒者外未解也不

攻裏節不其熱不潮。為胃未全實未可與大承氣湯若其腹大滿大不通者凡不見潮可以小

承氣湯微和胃氣勿令大泄下。大承氣湯方 大黃酒洗兩厚朴半斤炙枳實五枚芒硝

合三右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芒硝更上微

火煮一兩沸分溫再服得下餘勿服。武陵陳氏云方名承氣殆即亢則害承乃制之

義乎亢極反兼勝己之化承者以下承上也。夫天地一理萬物一氣故寒極生熱熱極

生寒物窮則變未有亢極而不變者傷寒邪熱入胃津液耗真陰虛陽勝陰病所謂陽

盛陰虛汗之則死下之則愈急以苦寒勝熱之劑救將絕之陰瀉亢甚之陽承氣所以

有挽回造化之功也然不言承亢而言承氣何哉夫寒熱流轉不過一氣之變遷而已

用藥制方彼氣機之不可變者力難矯之亦第就氣機之必變者而一承之耳設其氣

有陽無陰一亢而不可復則為脈澀直視喘滿者死何則以其氣機已絕更無可承之

氣也由是言之聖人雖盡人工之妙止合乎天運之常耳不云承氣而云何按陳氏

此註必須熟讀

小承氣湯方

大黃

四兩厚朴二兩炙

枳實三枚大

右三味以水四

升。煮取一升二合。去滓。分溫二服。初服湯。當更衣。不爾者。盡飲之。若更衣者。勿服之。

胃合海水無病之人亦日有潮但不陽明病必審潮熱又大便微硬者方可與大承氣湯

覺耳病則氣隨潮而發現於外故凡潮熱為可攻也若其不大便已六七日未敢必其

湯便若大不硬者即不可與之然已大便又不可盡信也

否與恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中下轉而矢氣者此有燥屎乃可以大攻

之若不轉矢氣者為胃氣此但初頭硬後必溏不可攻之攻之則胃氣必脹滿不能食也

試觀胃虛欲飲水者與水則噦水且不宜於胃而況攻下乎推其後復發潮熱者必大便

復硬但溏者既去則而甚少也止須以小承氣湯和之然亦必須轉矢氣不轉矢氣者

難承氣且慎不可氣以妄攻也此言大承氣行便硬小承氣行燥屎各有所主而胃氣

虛者慎不可攻也

陽明謔語其中有虛實之不知夫陽明實則語皆狂謔語虛則聆其所語如鄭國之聲

同生死之各異者不可不知夫陽明實則語皆狂謔語虛則聆其所語如鄭國之聲

鄭聲即重語也蓋謔語原非死證而邪氣入直視而謔語則危矣脹滿者脾肺不交而死

及下利者脾腎不固而亦主死此章統論謔語各證之治法也謔語之時聆其聲有不

正之聲輕微重複之語即是鄭聲注家分而為兩皆相沿之誤也故止首節提出鄭聲

而後無鄭聲之證

有亡陽而謔語者汗為發汗多則心液若重發汗者心液為陰陰虛於內則心主亡其陽

有亡陰而傷寒。若吐若下後不解。其陰液亡矣不大便五六日上。至於十餘日。陽明旺於中。西之問

其時日晡所旺。邪氣隨發潮熱。且全顯出本來不惡寒。且熱甚。神昏無獨語。見而如見鬼狀。

若劇者。為神識不發。則不識人。陽奔於外。循衣摸牀。無所依。故心惕而不安。陽脫於微喘。不

榮於直視。此陽熱甚。而陰液亡。其生死只在脈弦者。未絕可生。血若脈濡者。已極必死。

而苟病微者。無以上但見發熱譫語者。以大承氣湯主之。若一服利。即止後服。蓋以大承

當可以養陰不當亦所。此言亡陰譫語也。按柯氏云。吐下後不解。病有微劇之分。微

者是邪氣實。當以下解。劇者邪正交爭。當以脈斷其生死。弦者是氣實。不失為下證。故

生。濕者是正氣虛。不可更下。故死。生死二字。從治病者看出。又是一解。却是正解。

有亡津液。陽明燥熱之病。其人多汗。以津液外出。致胃中乾燥。大便秘硬。硬則胃氣不謔

語。以承氣湯主之。若一服譫語止。更莫復服。此言亡津液而謔語也。

然其中虛實之陽明病。其譫語有虛有實。若發潮熱。脈滑而疾者。此陽明裏小承氣湯主之。然

之多因進退先為與承氣湯一升。後腹中轉矢氣者。更服一升。若不轉矢氣。勿更與之。設明

日不大便。脈反緩滑微濕者。微則血少。此裏虛也。邪感正為難治。熱邪雖不可更與承氣

湯也。此以脈而辨謔語之虛實。前欲與大承氣。以小承氣為法。今欲與小承氣。即以小

承氣先與為試法。可見古人之謹慎如此。按柯氏云。勢若不得不通者。可用蜜導。虛

甚者。與四逆湯。陰得陽則解矣。愚以救逆當臨時審其所急。不可預有成見。

且有在胃在腸亦須分別內經陽明病若譫語有潮熱反不能食者胃滿則胃中必有燥

屎五六枚也若熱而能食者胃無燥屎故但便硬爾俱宜大承氣湯下之

能食不能食以驗譫語有燥屎便硬之不同而又以明腸胃更虛更滿之義也胃主

納穀胃滿則不能容穀故不能食腸主變化腸滿則難於變化故但硬然腸雖滿而胃

則虛故又能食

問有熱入血室而起於胸中與陽明合故陽明病熱迫於下血者神也譫語者血脫神此為

熱入血室何以為血室男女皆有之在男絡唇但頭汗出不到別處者血下奪則無汗熱諸

經之刺肝之期門隨其實而瀉之俾熱從血室而澱然汗出則愈此言下血譫語也

問有因風致燥而譫語者奈何夫汗出多而不見其譫語者以有燥屎在胃中此為風也謂風

汗多亡液以致胃燥譫語故也今汗出多而亦譫語者以有燥屎在胃中此為風也謂風

邪干於中土風燥必須議下之然亦過經俾有餘不盡之風邪乃可下之下之若早風性

而非熱燥也燥實必須議下之然亦過經俾有餘不盡之風邪乃可下之下之若早風性

善行數變內語言必亂以邪風邪盡入於裏表虛裏實故也蓋風燥症候過經宜下早以下

傷神氣其語言必亂以邪風邪盡入於裏表虛裏實故也蓋風燥症候過經宜下早以下

之則愈方曰宜大承氣湯此言風木之邪燥其津液而為譫語也

攻裏太早致裏實而譫語者言之詳矣而相參傷寒四日為太陰五日為少陰主氣之期病

表失法致裏實而譫語者亦可並舉而相參傷寒四日為太陰五日為少陰主氣之期病

脈沉太陰少陰之而為喘滿沉為在裏而反發其表汗則胃津液越出大便結燥為難發

汗致表虛成難裏實其虛靈不昧之天君因邪久則譫語此承上節表虛裏實而補

出尋常裏實之因以備互證也

陽明病

謹語亦有三陽合病三陽合為病腹滿陽明經熱身重合於前也身重合於後也難於轉側少陽經熱合
 者太陽陽明少陽見而一身之前後左口不仁而面垢熱合少陽謹語熱合陽明遺尿熱合太陽之府也
 下俱熱氣充塞矣大抵三陽主外三陰主內陽實發汗則謹語陽浮於外則傷其欲脫之
 於外陰虛於內故不可發汗以耗欲竭之陰若發汗則謹語陽浮於外則傷其欲脫之
 微陽下亡則額上生汗手足逆冷醫者審其未經汗下之誤兼若自汗出證從太陽少
 陽之白虎湯主之苟非自汗出惡表邪抑塞此言三陽合病而為謹語也
 諸語亦有二陽併二陽併病復有頭痛惡寒之表證則為太陽證罷但有發潮熱手足
 病者太陽陽明二陽併病復有頭痛惡寒之表證則為太陽證罷但有發潮熱手足
 漿漿汗出大便難而謹語者之皆陽明結邪下之則愈宜大承氣湯此言二陽併病而為

謹語也

陽明表證少而裏證多下法之外發汗尚宜詳慎陽明病在表脈則浮而涉於裏咽連
 而溫鍼更無論矣然而病兼表裏又另有其法慎陽明病在表脈則浮而涉於裏
 脾開竅於口陽明與太咽燥口苦地手太陰肺主天足太陰脾主腹滿而喘此病陽明發熱
 陰相表裏邪氣相侵故咽燥口苦地手太陰肺主天足太陰脾主腹滿而喘此病陽明發熱
 汗出不惡寒反惡熱已詳本篇之首此病陽明身重可轉其機為兩解之法也若誤發其汗
 則傷腎傷心液憤憤邪益熾故病陽反增謹語若誤加燒鍼則經脈必見怵惕水火不
 煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣乘虛動膈又從膈面上心中懊憹心苗舌上有胎
 者熱甚而為邪氣宜梔子豉湯導火熱以下降引主之此言陽明病兼表裏非汗下溫
 鍼所能治也陰液以上升以

然梔子豉湯止為熱邪乘心之劑若前證外渴欲飲水口乾舌燥者為陽明經氣之白虎
 也恐不能兼清陽明經氣之燥熱若更加渴欲飲水口乾舌燥者為陽明經氣之白虎
 也恐不能兼清陽明經氣之燥熱若更加渴欲飲水口乾舌燥者為陽明經氣之白虎

加人參湯主之。此承梔子豉湯而進一步言也。

白虎加人參湯止清。若脈浮發熱渴欲飲水。如前證小便不利證者。為陽明累及太陰脾

陽明經氣之燥熱所致也。第運脾調肺以導水。又猪苓湯主之。此承白虎加人參湯又

進一步言也。猪苓湯方。猪苓去茯苓阿膠滑石碎澤瀉各一有五味以水

四升。先煮四味。取二升。去滓。內下阿膠烱消。溫服七合。日三服。

猪苓湯助脾氣之轉輸。肺氣之陽明病。汗出過多而渴者。為津液外越以致中乾作渴非

不可與猪苓湯。以汗多胃中燥。恐猪苓湯復利其小便。更走其故也。自陽明病脈浮而

緊至此。看似四節。實是一節。細玩其段段相承。上下聯絡。以見傷寒不可執定一法。用

藥當如轉環也。

且陽明中有寒冷燥熱之分。不可脈浮而寒則遲。今陽明戊土不能下合少表熱少陰癸

不辨試先言下焦之虛寒。夫虛則下焦下利清穀而止者。以四逆湯主之。(述)此節言陽

而上合陽明戊土裏寒。生陽之氣不升。故下利清穀而止者。以四逆湯主之。(述)此節言陽

明下焦虛寒也。本章凡三節。以上中下三焦論陽明有寒冷燥熱之病也。

再言中焦。若胃中虛冷。視下焦之生陽不政者。彼為火虛。此為土虛。其土虛亦本不能食

者。若復飲水則兩寒相噦。此論陽明中焦虛冷也。

再言上焦。經脈之脈浮發熱。熱循經脈而口乾鼻燥。其能食者。熱在經脈。不傷中焦。則發

熱。此言陽明上焦經脈燥熱也。

陽明主闔若終闔而無開機則死矣所以言之不厭陽明病解而遽下之其外有熱而手

足溫熱在於是於不結胸胃絡不能上心中懊憹虛故胃饑不能食陽明之津液主灌溉於土

能周流遍布惟但頭汗出無汗餘處者宜交通其梔子豉湯主之受業薛步雲按梔豉湯

此言陽明之氣不得交通上下而為梔子豉湯證也述合下五節論陽明主闔貴得

樞轉以出若闔於心胸腹胃之間無開轉之機則死矣

其或闔於胸陽明病發潮熱則大便應硬小大便溏而小便自可如其氣不涉於胸膈之間也

至胸膈滿而不能去者宜從樞而小柴胡湯主之此言陽明之氣闔於胸膈之間宜

樞轉而出也

然而小柴胡之用不止此也夫陽明之氣由下而上由陽明病脇下鞭滿不得由樞以出

出逆致三焦相混內外不通不大便胃氣不和而嘔上焦不通火舌上必現白胎者可

與小柴胡湯調和三焦上焦得通胎去津液得下使利胃氣因和暢氣相旋轉身濇然

而汗出解也此言小柴胡湯不特達陽明之氣於外更能調和上下之氣流通內外之津液也

今從主闔之理藉樞開之陽明中風少脈弦太陽浮陽明大樞開矣乃其氣主闔又不能得

開而短氣夫不能樞開而腹都滿關於脇下及心作痛以久按其心腹之病處氣不通

津液為汗氣闔於內津液不得外達故鼻乾不得汗陽明隨衛氣嗜卧色外呈故一身

及面目悉黃脾不能為胃小便難陽明之氣旺於中有潮熱陽明氣逆時時噦三陽之



耳之前後邪耳前後腫醫者取足陽明之經刺之少差然外轉而不解病過十日又當

受邪脈續浮者知其不涉於陰仍欲從與小柴胡湯以轉其脈但浮別無餘證者是病機

陽之開而與麻黃湯以助若不尿腹滿加噦者是不從太陽之開少陽之樞逆於三陰也

出也故其助若不尿腹滿加噦者夫不尿則甚於十日前之小便難矣腹滿

時或矣樞轉不出逆於三陰謂非不治而何（述）此節言陽明主閫必藉少陽之樞太

陽之開若閫而不能開轉則一息不運針機窮矣故經曰太陽為開陽明為閫少陽為

樞三經者不得相失也

以上各法無非使氣機之旋轉也陽明病自汗出不可再發其汗若再發其汗兼小便自利者此

為津液內竭津液既竭則大便硬雖硬不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土

瓜根及與大豬膽汁皆可為導（述）此言陽明氣機總要其旋轉津液內竭者不宜內攻

而宜外取也蓋以外無潮熱內無譫語與可攻之證不同須待也蜜煎導方蜜七

合一味內銅器中微火煎之稍凝似飴狀攪之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳

大如指長二寸許當熱時急作冷則硬以內穀道中以手急抱欲大便時乃去之

豬膽汁方大豬膽一枚瀉汁和醋少許以灌穀道中如一食頃當大便出

陽明可汗之症亦有在肌在表之分茲先言其陽明病虛則脈遲邪干肌腠則肌腠汗出

多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯此節合下節言陽明病在肌表而可以汗解也蓋陽明以肌腠為表在太陽則謂之解肌在陽明則謂之發汗也

陽明病邪在脈浮而喘者發汗則愈宜麻黃湯。（述）此陽明之

表證表脈也。二證俱是太陽。而屬之陽明者不頭痛項強故也。要知二方全為表邪而

設不為太陽而設見麻黃證即用麻黃湯見桂枝證即用桂枝湯不必問其為太陽陽

明也。若惡寒已罷則二方所必禁矣。

熱有鬱於氣分者陽明病。若發熱汗出此為熱從越不能發黃也。若熱氣上但頭汗出

而身無汗其刺頸而還津液不能小便不利行而上渴引水漿者此為瘕熱在裏色現身

必發黃。以茵陳蒿湯主之。（述）此言熱鬱氣分而為茵陳蒿湯證也。合下節言陽明為瘕

熱之經總統氣血故可病於氣而亦可病於血也。茵陳蒿湯方。茵陳蒿六兩梔子十四

枚二兩去皮。右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓分溫三服

小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也。

熱有鬱於血分者內經云上氣不足陽明證其人善忘者乃血隨氣行必有蓄血所以然

者本有久瘀之血停積於下則主血瘀血久停故令善忘。陽明主屎雖硬血又主大便反

易血久則黑火極其色必黑宜抵當湯下之。述此言熱鬱血分而為抵當湯證也。師

辨太陽蓄血症必驗其小便利。辨陽明蓄血症必驗其大便易。亦各從其府而言之。

大承氣為陽明之攻藥然陽明病既下之而熱邪乘心中懊憹而煩絕似虛煩之梔子

胃實可攻胃虛不可攻。陽明病既下之而熱邪乘心中懊憹而煩絕似虛煩之梔子

中有燥屎者。為邪不陷於心而陷於胃如不可攻。若腹只微滿為中土初頭硬後必澹無