

御纂醫宗金鑑卷二十八

刪補名醫方論卷三

續命湯

治中風痲身體不能自收口不能言唇昧不知
痛處或拘急不得轉側

麻黃

桂枝

石膏

乾薑


杏仁

四十枚

川芎

當歸

人參



北京中醫藥大學圖書館版權所有

御纂醫宗金鑑卷二十八

刪補名醫方論卷三目錄

續命湯

三生飲

稀涎干縉湯

秦艽升麻湯

防風黃耆湯

玉屏風散

黃耆五物湯



補身要略卷之六
羌活愈風湯

清熱化痰湯

防風通聖散

九味羌活湯

活人敗毒散

柴葛解肌湯

升麻葛根湯

參蘓飲

藿香正氣散



北京中医药大学图书馆版权所有

神朮湯

麻黃加朮湯

桂枝附子湯

栝蒌桂枝湯

水解散

二聖救苦丹

天水散

香薷飲



北京中醫藥大學圖書館版權所

御纂醫宗金鑑卷二十八

刪補名醫方論卷三

續命湯

治中風痲身體不能自收口不能言唇昧不知
痛處或拘急不得轉側

麻黃

桂枝

石膏

乾薑

杏仁

四十枚

川芎

當歸

人參



甘草

各三兩

右九味以水一斗煮取四升溫服一升當

汗薄覆脊憑几坐汗出自愈不汗更服無

禁勿當風并治蜷伏不得臥欬逆上氣面目

浮腫

集註

趙良曰痹病者營衛氣血不養於內外故身

體不用機關不利精神不治然是證有虛有

實虛者自飲食房勞七情感之如內經所謂

內奪而厥則爲瘖痹之類是也實者自風寒



北京中医药大学图书馆版权所有

暑濕感之虛者不可以實治治之則愈散其
氣血今此方明言中風痲是屬營衛之實邪
也故用續命續命乃麻黃湯之變者加乾薑
以開血受寒邪石膏以解肌受風邪當歸和
血人參益氣川芎行血散風也其并治欬逆
上氣面浮者亦以爲風寒所致也





三生飲

治卒中昏不知人口眼歪斜半身不遂并痰

氣厥

南星

一兩生用

川烏

五錢去皮生用

附子

五錢去皮生用

木香

二錢

右每服五錢薑水煎加人參一兩

集註

柯琴曰風爲陽邪風中無寒不甚傷人惟風

中挾寒害始劇矣寒輕而在表者宜發汗以
逐邪寒重而入裏者非溫中補虛終不可救



此取三物之大辛大熱者且不炮不製更佐以木香乘其至剛至銳之氣而用之非專治風兼以治寒也然邪之所湊其氣必虛知勇於攻邪若正氣虛而不支能無倒戈之患乎必用人參兩許以駕馭其邪此薛已真知確見立於不敗之地而收萬全之效者也若庸手必謂補住邪氣而不敢用此謹熟陰陽毋與衆謀岐伯所以叮嚀致告耳觀其每服五錢必四服而邪始出今之畏事者用



烏附分數必製熟而後敢用更以芩連監制
之烏能挽回如是之危證哉古今人不相
信然本方去烏附卽生香散治痰厥氣厥
矣





南京中医药大学图书馆版权所有

稀涎千緒湯

治風痰不下喉中聲如牽鋸或中濕腫滿

半夏

十四枚
大者

猪牙皂角

一挺
炙

甘草

一錢

白礬

二錢

右四味爲末用生薑自然汁少許沖溫水一

盞調末一錢灌之得吐痰涎卽醒

集註柯琴曰攻邪有汗吐下三法仲景於吐劑立

梔子豉瓜蒂二方所以導熱邪之上出逐寒

邪而外散也其有不因外感因醇酒厚味漸



積凝結變爲頑痰一旦乘虛上塞咽喉氣不
得通忽然昏仆目反直視喉中聲如牽鋸此
爲痰厥先輩所云怪證多屬於痰者此也非
用峻藥以攻之頑痰不能遽退故用生薑半
夏之辛以散之甘草之甘以涌之白礬之澁
以斂之牙皂之勇以開之此斬關奪門之勢
惟稟氣素實而暫虛者可用壅塞稍疏續進
他藥不可多用以傷元氣如平素虛弱者又
當攻補兼施六君子湯中加牙皂白礬末以



吐之則庶幾矣若誤作中風治之去生便遠





南京中医药大学图书馆版权所有

秦艽升麻湯

治風寒客胃口眼瞤斜惡見風寒四肢拘急

浮而緊

升麻

葛根

秦艽

白芷

防風

桂枝

甘草

人參

芍藥

葱白

右十味水煎服

