

卷
三

醒醫六書

瘟疫傳正彙編

傳症彙編卷之二

治疫全書二

醒醫六書

吳門吳又可撰

新建邑庠熊立品聖臣甫編輯

同里姻姪夏廷儀煦園恭較

孫承統紹庭校字

辯明傷寒時疫

或曰子言傷寒與時疫有霄壤之隔今用三承氣及桃仁承氣抵當茵陳諸湯皆傷寒方也既用其方必同其症子何言之異也曰夫傷寒必有感冒之因或單衣風露或強力入水或臨風脫衣或當簷出浴當覺肌肉粟起既而四肢拘急惡

風惡寒然後頭疼身痛發熱惡寒脉浮而數脉陰無汗為傷寒脉緩有汗為傷風若時疫初起原無感冒之因忽覺凜凜以後但熱而不惡寒然亦有所觸因而發者或飢飽勞碌或焦思氣鬱皆能觸動其邪是促其發也不因所觸無故自發者居多促而發者十中之一二耳且傷寒投劑一汗而解時疫發散雖汗不解傷寒不傳染于人時疫能傳染于人傷寒之邪自毫竅而入時疫之邪自口鼻入傷寒感而即發時疫感而後發傷寒汗解在前時疫汗解在後傷寒投劑可使立汗時疫汗解俟其內潰汗出自然不可以期傷寒解以發汗時疫解以戰汗傷寒不能發斑時疫則能發斑傷寒感邪在

經以經傳經時疫感邪在內內溢于經經不自傳傷寒感發甚暴時疫多有淹纏二三日或漸加重或淹纏五六日忽然加重傷寒初起以發表為先時疫初起以疎利為主種種不同其所同者傷寒時疫皆能傳胃至是同歸于一故用承氣湯輩導邪而出要之傷寒時疫始異而終同也 夫傷寒之邪自肌表一逆傳裏如浮雲之過太虛原無根蒂惟其傳法始終有進而無退故下後皆能脫然而愈若時疫之邪始則匿于膜原根深蒂固發時與榮衛交併客邪經由之處榮衛未有不被其所傷者因其傷故名曰潰然不潰則不能傳不傳邪不能出邪不出而疾不瘳 時疫下後多有未能頓解

者何耶蓋疫邪每有表裏分傳者因有一半向外傳邪留于肌肉一半向內傳邪留于胃家邪留于胃故裏氣結滯裏氣結表氣因而不通于是肌肉之邪不能即達于肌表下後裏氣一通表氣亦順向者鬱于肌肉之邪方能盡發于肌表或班或汗然後脫然而愈傷寒下後無有此法雖曰終同及細較之而終又有不同者

或曰傷寒感天地之正氣時疫感天地之戾氣氣既不同俱用承氣又何藥之相同也曰風寒疫邪與吾身之真氣勢不同立一有所著氣壅火積氣也火也邪也三者混一與之俱化失其本來之面目至是均謂之邪矣但以驅逐為功何論

邪之同異也

假如初得傷寒為陰邪主閉藏而無汗傷風為陽邪主開發而多汗始有桂枝麻黃之分原其感而未化也傳至少陽證用柴胡傳至胃家並用承氣至是亦無復有風寒之分矣推而廣之是知疫邪傳胃治法無異也

發班戰汗合論

凡疫邪留于氣分解以戰汗留于血分解以發班氣屬陽而輕清血屬陰而重濁是以邪在氣分則易疎透邪在血分恒多膠滯故陽主速而陰主遲所以從戰汗者可使頓解從發班者當圖漸愈

戰汗

疫邪先傳表後傳裏忽得戰汗經氣輸泄當即脉靜身涼煩渴頓除三五日後陽氣漸積不待飲食勞碌必然反復者蓋表邪已解裏邪未去總覺發熱下之即解疫邪表裏分傳裏氣壅閉非下不汗下之未盡日後復熱當復下復汗瘟疫下後煩渴減腹滿去或思食而知味裏氣和也身熱未除脉近浮此邪氣拂鬱于經表未解也當得汗解如未得汗以柴胡清燥湯和之復不得汗者從漸解也不可苛求其汗應下失下氣消血耗既下欲作戰汗但戰而不復者危以中氣虧微但能降陷不能升發也次日當期復戰厥回汗出者

生。厥不四汗不出者死。以正氣脫不勝其邪也。戰而厥回。無汗者。真陽尚在。表氣枯涸也。可使漸愈。凡戰而不復。忽痊者必死。痊者身如尸。牙關緊。目上視。凡戰不可擾動。但可溫覆。擾動則戰而中止。次日當期復戰。戰汗後復下後越二三日反腹痛不止者。欲作滯下也。無論已見積未見積宜

芍藥湯

芍藥湯方

白芍藥

錢一

當歸

錢一

枳榔

錢二

厚朴

錢一

甘草

分七

水姜煎服。裏急後重加大黃三錢。紅積倍芍藥。白積倍枳

榔煎服

自汗

自汗者不因發散自然汗出也伏邪中潰氣通得汗邪欲去也若脉長洪而數身熱大渴宜白虎湯得戰汗方解裏證

下後續得自汗雖二三日不止甚則四五日汗不止身微熱

熱甚則汗甚熱微汗亦微此屬實乃表有邪也邪盡汗止

汗不止者宜柴胡湯以佐之表解則汗止設有三陽經證當

用三陽隨經加減法與協熱下利投承氣同義表裏雖殊其

理則一若誤認為表虛即汗輒用黃芪實表及止汗之劑則

誤矣有裏症時當盛暑多作自汗宜下之白虎證自汗詳見

前若面無神色唇口刮白表裏無陽證喜熱飲稍冷則惡脉

汗而表有邪邪欲去也
汗在表陽邪在表汗出便
汗自目一氣之象也

乃近時言醫者所創設
藥令解表神效也

此辨盜汗之少壯與老壯
相逆亡或止指盜汗之脈
以助其有盜汗之理也
更本之理也

人言陽虛自汗陰虛盜汗
當當以之為論盜汗自
汗陽虛有不足者此云盜汗
及自汗者表虛盜汗者表
虛表虛者陽虛之不足也
盜汗自汗只陽虛者不足之
意也合而謂之為盜汗也

微欲絕忽得自汗淡而無味者為虛脫夜發則晝晝發則
夜亡急當峻補補不及者死大病愈後數日每飲食及驚動
即汗此表裏虛怯宜人參養榮湯倍黃芪

盜汗

裏證下後續得盜汗者表有微邪也若邪甚竟作自汗伏邪
中潰則作戰汗矣凡人張目則衛氣行于陽目瞑則衛氣行
于陰行陽謂升發于表行陰謂斂降于內行于陰不能衛護
其表毫竅空疎微邪乘間而出邪盡而盜汗自止設不止者
宜柴胡湯以佐之時疫愈後脉靜身涼數日後反得盜汗
及自汗者此屬表虛宜黃芪湯

柴胡湯

柴胡

錢一

黃芩

錢一

陳皮

錢一

甘草

錢一

生薑

錢一

大棗

枚一

右方用人參半夏今表實故不用人參無嘔吐不加半夏

黃芪湯

黃芪

錢三

五味子

分三

當歸

錢一

白朮

錢一

甘草

分五

照常煎服如汗未止加麻黃淨根一錢五分無有不止者

然屬實者常多屬虛者常少邪氣盛為寔正氣奪為虛虛

實之分在乎有熱無熱有熱為寔無熱為虛若顛倒誤用

未免實寔虛虛之弊臨證當慎

狂汗

狂汗者伏邪中潰欲作汗解因其人稟賦肥盛陽氣冲擊不能頓開故忽然坐卧不安且狂且躁少頃大汗淋漓狂躁頓止脉靜身凉霍然而愈

發班

邪留血分裏氣壅閉非下不班班出為毒邪外解下後班漸出更不可大下設有下證少與承氣緩緩下之若復大下中氣不振班毒內陷則危宜托裏舉班

托裏舉班湯

白芍藥

當歸

錢各一

升麻

分五

白芷

分七

柴胡

分七

川山甲二錢炙黃
為粗末

水薑煎服下後班漸出復大下班毒復隱反加循衣摸床撮空理線脉漸微者危本方加人參一錢補不及者危若未下而先發班者設有下證少與承氣須從緩下

數下亡陰

下證以邪未盡不得已而數下之間有兩目加澀舌反枯乾津不到咽唇口燥裂緣其人兩稟陽臟素多火而陰虧者今重亡津液宜清燥養榮湯設熱渴未除裏證仍在宜承氣養榮湯

解後宜養陰忌投參朮

夫疫乃熱病也邪氣內鬱陽氣不得宣布積陽為火陰氣無
為熱搏暴解之後餘焰尚存陰血未復大忌參芪白朮得之
反助其壅鬱餘邪留伏不惟目底淹纏日後變生異證或周
身痛痺或四肢攣急或流火結痰或遍身瘡瘍或兩腿鑽痛
或勞嗽湧痰或氣毒流注或痰核穿漏皆驟補之為害也萬
有陰枯血燥者宜清燥養榮湯若素多痰及少年平時肥盛
者投之恐有泥膈之弊亦宜斟酌大抵時疫愈後調理之劑
投之不當莫如靜養節飲食為第一

清燥養榮湯

知母

天花粉

當歸身

白芍

地黃汁

陳皮

甘艸

柴胡養榮湯

柴胡

黃芩

陳皮

甘草

當歸

白芍

生地

知母

天花粉

薑棗煎服裏證未盡宜承氣養榮湯

承氣養榮湯

知母

當歸

芍藥

生地

大黃

枳實

厚朴

水薑煎服痰涎湧甚胸膈不清者宜瓜貝養榮湯

瓜貝養榮湯

知母

花粉

貝母

瓜棗實

橘紅

白芍

當歸

紫蘇子

水薑煎服

下後間服緩劑

下後或數下膜原尚有餘結未盡傳胃邪與胃氣併故熱不能煩除當寬緩兩日俟餘邪聚胃再下之宜柴胡清燥湯緩劑調理

柴胡清燥湯

柴胡

黃芩

陳皮

甘草

花粉

知母

薑朮煎服

下後反痞

疫邪留于心胸令人痞滿下之痞應去今反痞者虛也以其人或因他病先虧或因新產後氣血兩虧或稟賦嬌怯因而益虛失其健運邪氣留止故令痞滿今愈下而痞愈甚若更用行氣破氣之劑轉成壞證宜參附養榮湯

參附養榮湯

當歸

錢一

白芍

錢一

生地

錢三

人參

錢一

附子

錢七

乾薑

錢一

照常煎服果如前証一服痞如失倘有下證下後脉實痞