

傷寒典

上有目二張

傷寒典

下

景岳全書
八卷

朱生光



景岳全書傷寒典目錄須集

卷之七

傷寒上

經義一

傷寒總名二

初診傷寒法三

論脈四

風寒辨五

傷寒三證六

六經證七

傳經辨八
附合病併病

陽證陰證辨九

三陽陽明證十

兩感十一

表裏辨十二

寒熱辨十三

論汗十四

論吐十五

論下十六



小便

五十五

死證

五十六

傷寒逆證賦

五十七

傷寒治例

五十八

景岳全書傷寒典目錄終

景岳全書卷之七須集

傷寒典

會稽 張介賓 會卿著

西園 黃廷璋 峩砂氏訂

傷寒

上

經義一

水熱穴論帝曰人傷於寒而傳爲熱何也岐伯曰夫寒盛則生熱也○內經傷寒諸義并諸治法之未備者俱補載庶疫門所當參閱

傷寒總名二

黃帝曰今夫熱病者皆傷寒之類也又曰凡病傷寒而成溫者

先夏至日爲病溫後夏至日爲病暑此皆內經之明言也故凡病溫病熱而因於外感者皆本於寒卽今醫家皆謂之爲傷寒理宜然也近或有以溫病熱病謂非真傷寒者在未達其義耳

初診傷寒法三

凡初診傷寒者以其寒從外入傷於表也寒邪自外而入必由淺漸深故先自皮毛次入經絡又次入筋骨而後及於藏府則病日甚矣故凡病傷寒者初必發熱憎寒無汗以邪閉皮毛病在衛也漸至筋脉拘急頭背骨節疼痛以邪入經絡病在營也夫人之衛行脉外營行脉中今以寒邪居之則血氣混淆經絡壅滯故外證若此此卽所謂傷寒證也自此而漸至嘔吐不食脹滿等證則由外入內由經入府皆可因證而察其表裏矣若

或肌表無熱亦不憎寒身無疼痛脉不緊數者此其邪不在表病必屬裏凡察傷寒此其法也

論脉四

傷寒之邪實無定體或入陽經氣分則太陽爲首或入陰經精分則少陰爲先其脉以浮緊而有力無力可知表之虛實沉緊而有力無力可知裏之虛實中而有力無力可知陰陽之凶吉診之之法常問證以知其外察脉以知其內先病爲本後病爲標能參合脉證而知緩急先後者乃爲上工

一診法曰浮脉爲在表故凡脉見浮緊而數者卽表邪也再加以頭項痛腰脊強等證此卽太陽經病當求本經輕重而解散之

一脈見洪長有力而外兼陽明證者卽陽明在經之邪也宜求本經之寒熱以散之

一脈見弦數而兼少陽之證者卽少陽經半表半裏之病宜和解而散之

一沉脈爲在裏病屬三陰詳具後六經證辨中但沉數有力是卽熱邪傳裏也若表證深入而內見大滿大實陽邪熱結等證治當從下也

一沉緊無力而外無大熱內無煩渴等病此陰證也若或畏寒厥冷及嘔吐腹痛瀉痢者此卽陰寒宜中治宜溫中也

一脈大者爲病進大因邪氣勝病日甚也脈漸緩者爲邪退緩則胃氣至病將愈也此以大爲病進固其然也然亦有宜大

不宜大者又當詳辨如脉體本大而丹加洪數此則病進之脉不可當也如脉體本小因服藥後而漸見滑大有方者此自陰轉陽必將汗解乃爲吉兆蓋脉至不鼓者由氣虛而然無陽豈能作汗也後論汗條中有按當金閔之

仲景傷寒論曰脉有陰陽者何謂也曰凡脉浮大數動滑皆陽也沉濇弱弦微皆陰也○諸脉浮數而發熱惡寒身痛不欲飲食者傷寒也若酒淅惡寒飲食如常而痛偏一處者必血氣壅遏不通成癰膿也○寸口脉浮爲在表沉爲在裏數爲在府遲爲在藏○寸關尺三部浮沉大小遲數同等雖有寒熱不解者此脉陰陽爲和平雖劇必愈○其脉浮而汗出如流珠者陽氣衰也○脉瞥瞥如羹上珠者陽氣微也○脉縈

榮如蜘蛛絲者陽氣衰也○脉綿綿如瀉漆之絕者亡其血也○其脉沉者榮氣微也○若脉浮大者氣實血虛也○脉微緩者爲欲愈也○陽脉浮陰脉弱者爲血虛血虛則筋急也○脉微弱而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更吐更下也○陰證無脉溫之而脉微續者生暴出者死○陰病見陽脉者生陽病見陰脉者死

論曰寸脉微名曰陽不足陰氣上入於陽中則灑淅惡寒也尺脉微名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發熱也○寸口脉微而濇微者衛氣不行濇者榮氣不足衛氣衰面色黃榮氣不足面色青榮爲根衛爲葉榮衛俱微則根葉楮槁而寒慄欬逆唾腥吐涎沫也

論曰緊脉從何而來曰假令亡汗若吐以肺裏寒故令脉素也
○假令欬者坐飲冷水故令脉緊也○假令下利以胃中虛
冷故令脉緊也○按此言緊者卽弦搏不軟之謂蓋單言其
緊而無滑數之意乃陽明胃氣受傷之脉故主爲陰寒之證
若緊而兼數則必以外邪所致

愚按浮爲在表沉爲在裏此古今相傳之法也然沉脉亦有表
證此陰實陽虛寒勝者然也浮脉亦有裏證此阻遏陰虛水
虧者然也故凡欲察表邪者不宜單據浮沉只當以緊數與
否爲辨方爲的確蓋寒邪在表脉皆緊數緊數甚者邪亦甚
緊數微者邪亦微緊數浮洪有力者邪在陽分卽陽證也緊
數浮沉無力者邪在陰分卽陰證也以緊數之脉而兼見表

證者其爲外感無疑卽當治從解散然內傷之脈亦有緊數者但內傷之緊其來有漸外感之緊發於陡然以此辨之最爲切當其有似緊非緊但較之平昔稍見滑疾而不甚者亦有外感之證此其邪之輕者或以初感而未甚者亦多見此脈是又不可不兼證而察之也若其和緩而全無緊疾之意則脈雖浮大自非外邪之證

按陶節菴曰夫脈浮當汗脈沉當下固其宜也然其脈雖浮亦有可下者謂邪熱入府大便秘難也設使大便不難豈敢下乎其脈雖沉亦有可汗者謂少陰病身有熱也設使身不發熱豈敢汗乎若此之說可見沉有表而浮亦有裏也

凡病傷寒者本由寒氣所傷而風卽寒之帥也第以風寒分氣
令則風主春而東寒主冬而北以風寒分微甚則風屬陽而淺
寒屬陰而深然風送寒來寒隨風入透骨侵肌本爲同氣故凡
寒之淺者卽爲傷風風之深者卽爲傷寒而不淺不深半正半
邪之間者卽爲瘧疾其有留於經絡而肢體疼痛者則爲風痺
然則傷風也傷寒也瘧疾風痺也皆風寒之所爲也觀靈樞九
宮八風篇及歲露論所載俱甚言虛邪賊風之爲害口問篇言
風成爲寒熱此皆指風爲寒邪也卽如冬傷於寒者宜乎其爲
傷寒也若春夏秋三時之感冒則孰非因寒亦孰非因風而入
之故仲景曰凡傷寒之病多從風寒得之始因表中風寒入裏
則不消矣未有溫覆而當不消散者豈非風寒本爲同氣乎內

經曰謹候虛風而避之故聖人曰避虛邪之道如避矢石然邪弗能害此之謂也此杜漸防微之道也

傷寒三證

六

夫傷寒爲病蓋由冬令嚴寒以水冰地裂之時最多殺厲之氣人觸犯之而卽時病者是爲正傷寒此卽陰寒直中之證也然惟流離窮困之世多有之若時當治平民安飽煖則直中之病少見此傷寒之一也○其有冬時感寒不卽病者寒毒藏於營衛之間至春夏時又遇風寒則邪氣應時而動故在春則爲溫病在夏則爲暑病是以辛苦之人春夏多溫熱病者皆由冬時觸寒所傷故隨氣傳變本非卽病正傷寒之屬所當因其寒熱而隨證調治之此傷寒之二也○又有時行之氣者如春時應

煖而反寒夏時應熱而反涼秋時應涼而反熱冬時應寒而反溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者是卽時行之病感冒虛風不正之氣隨感隨發凡稟弱而不慎起居多勞倦者多犯之此傷寒之三也凡此三者皆傷寒之屬第其病有不同治有深淺苟不能辨則必致悞人

六經證_七

太陽經病頭項痛腰脊強發熱惡寒身體痛無汗脉浮緊以太陽經脉由脊背連風府故爲此證此三陽之表也

陽明經病爲身熱目疼鼻乾不眠脉洪而長以陽明主肌肉其脉挾鼻絡於目故爲此證此三陽之裏也

少陽經病爲胸脇痛耳聾寒熱嘔而口苦咽乾目眩脉弦而數

以少陽之脉循脇肋絡於耳故爲此證此二陽三陰之間也
由此漸入三陰故爲半表半裏之經

太陰經病爲腹滿而吐食不下噎乾手足自溫或自利腹痛不
渴脉沉而細以太陰之脉布胃中絡於噎故爲此證

少陰經病爲舌乾口燥或自利而渴或欲吐不吐或引衣蹠臥
心煩但欲寐其脉沉以少陰之脉貫腎絡於肺繫舌本故爲
此證

厥陰經病爲煩滿囊縮或氣上撞心中疼熱消渴饑而不欲
食食卽吐蛔下之利不止脉沉而弦以厥陰之脉循陰器而
絡於肝故爲此證

成無已曰執邪自太陽傳至太陰則腹滿而噎乾未成渴也

傳至少陰則口燥舌乾而渴未成消也傳至厥陰而成消渴者熱甚能消水故也凡飲水多而小便少者謂之消渴肝居下部而邪居之則木火相犯所以邪上撞心木邪乘土則脾氣受傷所以饑不欲食食即吐衄脾土既傷而復下之則脾入虛所以痢不止

正陽明府病者由表而傳裏由經而入府也邪氣既深故爲潮熱自汗譫語發渴不惡寒反惡熱揭去衣被揚手擲足或發斑黃狂亂五六日不大便脉滑而實此實熱已傳於內乃可下之若其脉弱無神或內無痞滿實堅等證又不可妄行攻下

仲景曰尺寸俱浮者太陽受病也當一二日發○尺寸俱長者

陽明受病也當二三日發○尺寸俱弦者少陽受病也當三
四日發此三陽皆受病未入於府者可汗而已○尺寸俱沉
細者太陰受病也當四五日發○尺寸俱沉者少陰受病也
當五六日發○尺寸俱微緩者厥陰受病也當六七日發此
三陰俱受病已入於府者可下而已

成無已註曰三陽受邪爲病在表法當汗解然三陽亦有便
入府者入府則宜下故云未入於府者可汗而已三陰受邪
爲病在裏於法當下然三陰亦有在經者在經則宜汗故云
已入於府者可下而已

太陽證似少陰者以其發熱惡寒而脈反沉也○少陰證似太
陽者以其惡寒脈沉而反發熱也○仲景曰太陽病發熱頭