

御纂醫宗金鑑卷二十三

訂正仲景全書金匱要略註下之二目錄

婦人妊娠篇第二十

桂枝茯苓圓

附子湯

膠艾湯

當歸芍藥散

乾薑人參半夏圓

當歸貝母苦參圓

葵子茯苓散

冬圓

當歸散

冬半夏圓

白朮散

藥譜

婦人產後篇第二十一

枳實芍藥散

下瘀血湯

圓

陽旦湯

錄第二十一

竹葉湯

全書全測要領其不之二目錄

竹皮大圓

白頭翁加甘草阿膠湯

婦人雜病篇第二十二

半夏厚朴湯

甘草小麥大棗湯

溫經湯

土瓜根湯

旋覆花湯

膠薑湯

大黃甘遂湯

抵當湯

礬石湯

紅藍花酒

腎氣圓

蛇床子散

狼牙湯

小兒疳蟲蝕齒方

雜療篇第二十三

四時加減柴胡飲子

長服訶黎勒圓

三物備急圓

紫石寒食散

治尸厥方

共二方

救卒死方

共五方

救卒死壯熱方

救卒死兩目閉者方

救卒死而張口反折者方

救卒死四肢不收失便者方

救小兒卒死吐利不知是何病方

救卒死客忤二方

救自縊方

療中暍方

救溺死方

馬墜及一切筋骨損方

御纂醫宗金鑑卷二十三

訂正仲景全書金匱要略註下卷二

婦人妊娠病脈證并治第二十

師曰婦人得平脈陰脈小弱者其人渴不能食無寒熱名妊娠桂枝湯主之於法六十日當有此證設有醫治逆者却一月加吐下者則絕之

註

婦人經斷得平脈無寒熱則內外無病其人渴不能食乃妊娠惡阻之漸也故陰脈雖小弱亦可斷爲有孕但惡阻於法六十日當有

此證設醫不知是孕而治逆其法却一月卽
有此證也若更加吐下者則宜絕止醫藥聽
其自愈可也然脈平無寒熱用桂枝湯與妊
娠渴不能食者不合且文義斷續不純其中
必有脫簡

集註

徐彬曰平脈者不見病脈一如平人也陰脈

小弱者脈形小不大軟弱無力非細也諸脈
既平而獨下焦陰脈微見不同是中上二焦
無病乃反見渴不能食之證則渴非上焦之

熱不能食亦非胃家之病矣少陽有嘿嘿不欲食之證今無寒熱亦無少陽表證可疑矣是渴乃陰火上熾不能食乃惡心阻食陰脈小乃胎元蝕氣故曰名妊娠也

李彥曰此節病證卽妊娠惡阻是也寸爲陽脈主氣尺爲陰脈主血陰脈小弱者血不足也血以養胎則液竭而渴又脾爲坤土厚德載物胎氣賴以奠安不能食者脾氣弱也凡有他病而渴不能食者脈必不平而有寒熱

今雖不能食反得平脈又無寒熱故主妊娠

桂枝湯方

見下利中

婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不止胎動在臍上者爲癥瘕害妊娠六月動者前三月經水利時胎也下血者後斷三月衄也所以血不足者其癥不去故也當下其癥桂枝茯苓丸主之

註

經斷有孕名曰妊娠妊娠下血則爲漏下婦人宿有癥瘕之疾而育胎者未及三月而得漏下下血不止胎動不安者此爲癥瘕害之

也已及六月而得漏下下血胎動不安者此
亦癥瘕害之也然有血衄成塊者以前三月
經雖斷血未盛胎尚弱未可下其癥瘕也後
三月血成衄胎已強故主之桂枝茯苓丸當
下其癥瘕也此示人妊娠有病當攻病之義
也此條文義不純其中必有闕文姑存其理
可也

集註

婁全善曰凡胎動多當臍今動在臍上者故
知是癥也

程林曰此有癥病而懷胎者雖有漏血不止
皆癥瘕之爲害非胎動胎漏之證下其癥瘕
妊娠自安此內經所謂有故無殞亦無殞也
方氏曰胎動胎漏皆下血而胎動有腹痛胎
漏無腹痛故胎動宜行氣胎漏宜清熱
魏荔彤曰胎與衄之辨當於血未斷之前三
月求之前三月之經水順利則經斷必是胎
前三月有曾經下血者則經斷必成衄

桂枝茯苓丸

桂枝

茯苓

牡丹

去心

桃仁

去皮尖

芍藥

各等分

右五味末之煉蜜和丸如兔屎大每日食前服一丸不知加至三丸

婦人懷娠六七月脈弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒者少腹如扇所以然者子藏開故也當以附子湯

溫其藏

方未見

註

婦人懷娠六七月脈弦發熱似表證也若其

胎愈脹腹痛惡寒而無頭痛身痛則非表證也少腹如扇狀其惡寒如扇風之侵襲也所以然者因其人陽虛子藏開寒邪侵入故用附子湯溫子藏而逐寒但方缺文亦不純必有殘缺

集註

程林曰胎脹腹痛亦令人發熱惡寒少腹如

扇者陰寒勝也妊娠陰陽調和則胎氣安今陽虛陰盛不能約束胞胎故子藏爲之開也

附子湯用以溫經

李彬曰按子藏卽子宮也臍下三寸爲關元
關元左二寸爲胞門右二寸爲子戶命門爲
女子繫胞之處非謂命門卽子藏也蓋命門
是穴名在腰後兩腎中附脊骨之第十四椎
之兩旁今經文明說少腹如扇者子藏開則
子藏在少腹明矣豈有在少腹者而反謂其
在脊後者乎此悞也

尤怡曰脈弦發熱者有似表證而乃身不痛而
腹反痛背不惡寒而腹反惡寒甚至少腹陣

陣作冷若或扇之者其所以然者子藏開不能闔而風冷之氣乘之也夫藏開風入其陰內勝則其脈弦爲陰氣而發熱且爲格陽矣胎脹者熱則消寒則脹也附子湯方未見然溫裏散寒之意槩可推矣

師曰婦人有漏下者有半產後因續下血都不絕者有妊娠下血者假令妊娠腹中痛爲胞阻膠艾湯主之

註

五六月墮胎者謂之半產婦人有漏下下血

之疾至五六月墮胎而下血不絕者此癥瘕之害也若無癥瘕下血惟腹中痛者則爲胞阻胞阻者胞中氣血不和而阻其化育也故用芎歸膠艾湯溫和其血血和而胎育也

集註

程林曰漏下者妊娠經來衄經以陽不足謂之激經也半產者以四五月墮胎墮胎必傷其血海血因續下不絕也若妊娠下血腹中痛爲胞阻則用膠艾湯以治

尤怡曰婦人經水淋瀝及胎產前後下血不