

傅青主
卷三



產後編上卷目錄

產後總論

產前後方症宜忌

正產

傷產

調產

橫產

盤腸產

難產

凍產

熱產

斷臍

新產治法

產後

死產

下胞

產後寒熱

胎前患

傷寒

疫症

瘧疾

墮胎

等症

血塊

血暈

厥症

血崩

氣短似喘

妄言妄見



傷食

忿怒

類瘡

類傷寒二陽症

類傷寒三陰症

類中風

類瘕

出汗

盜汗

口渴兼小便不利

遺尿



南京中医药大学图书馆版权所有

產後編上 共四十三症

陽曲傅 山青主手著

產後總論

凡病起於血氣之衰脾胃之虛而產後尤甚是以丹溪先生論產後必大補氣血爲先雖有他症以未治之斯言盡治產之大旨若能擴充立方則治產可無過矣夫產後憂驚勞倦氣血暴虛諸症乘虛易入如有氣母專耗散有食母專消導熱不可用苓連寒不可用桂附寒則血塊停滯熱則新血崩流至若中虛外感見三陽表症之多似可汗也在產後而用麻黃則重竭其陽見三陰裏症之多似可下也在產後而用承氣則重亡陰血

耳聾脇痛乃腎虛惡露之停休用柴胡譖語出汗乃元
弱似邪之症非同胃實厥由陽氣之衰無分寒熱非大
補不能回陽而起弱瘕因陰血之虧不論剛柔非滋榮
不能舒筋而活絡乍寒乍熱發作無期症似瘧也若以
瘧治遷延難愈言論無倫神不守舍病似邪也若以邪
治危亡可待去血過多而大便燥結肉蕤蓉加於生化
非潤腸承氣之能通去汗過多而小便短澀六君子倍
加參芪必生津助液之可利加參生化湯頻服救產後
之危長生活命丹屢用甦絕穀之人癩疔脫肛多是氣
虛下陷補中益氣之方口噤拳攣乃因血燥類風加參
生化之劑產戶入風而痛甚服宜羌活養榮湯玉門傷

涼而不閉洗宜蠅臭黃硫散怔忡驚悸生化湯加以定
志似邪恍惚安神丸助以歸脾因氣而悶滿虛煩生化
湯加木香爲佐因食而嘔酸惡食六君子加神麴麥芽
爲良蘇木莪朮大能破血青皮枳殼最消滿脹一應耗
氣破血之劑汗吐宣下之法止可施諸壯實豈宜用於
胎產大抵新產後先問惡露如何塊痛未除不可遽加
參朮腹中痛止補中益氣無疑至若亡陽脫汗氣虛喘
促頻服加參生化湯是從權也又如亡陰火熱血崩厥
暈速煎生化原方是救急也王太僕云治下補下治以
急緩緩則道路達而力微急則氣味厚而力重故治產
常遵丹溪而固本服法宜效太僕以頻加凡付生死之

重寄須着意於極危欲求俯仰之無虧用存心於愛物
此雖未盡產症之詳然所聞一症皆援近鄉治驗爲據
亦未必無小補云



南京中医药大学图书馆版权所有

○正產

正產者有腹或痛或止腰脇酸痛或勢急而胞未破名弄胎服八珍湯加香附自安有胞破數日而痛尙緩亦服上藥俟之

○傷產

傷產者胎未足月有所傷動或腹痛臍痛或服催生藥太早或產母努力太過逼兒錯路不能正產故臨月必舉動從容不可多睡飽食飲酒但覺腹中動轉卽正身仰臥待兒轉順與其臨時費力不如先時慎重

○調產

調產者產母臨月擇穩婆辦器用備參藥產時不可多

人暄鬧二人扶身或憑物站心煩用滾水調白蜜一匙
獨活湯更妙或飢服糜粥少許勿令飢渴有生息未順
者只說有雙胎或胎衣不下勿令產母驚恐

○催生

催生者因坐草太早困倦難產用八珍湯稍佐以香附
乳香以助血氣胞衣早破漿血已乾亦用八珍湯

○凍產

凍產者天寒血氣凝滯不能速生故衣裳宜厚產室宜
煖背心下體尤要

○熱產

熱產者暑月宜溫涼得宜若產室人眾熱氣蒸逼致頭

痛面赤昏暈等症宜飲清水少許以解之然風雨陰涼亦當避之

橫產

橫產者兒居母腹頭上足下產時則頭向下產母若用力逼之胎轉至半而橫當令產母安然仰臥令其自順穩婆以中指挾其肩勿使臍帶羈絆用催生藥努力即生

當歸

紫蘇

各叁錢

長流水煎服即下

一方用好京墨磨服之即下

一方用敗筆頭一個火鍛以藕節自然汁調服之即

下

一方用益母草陸兩濃煎加童便壹大杯調服卽下

盤腸產

盤腸產者產則子腸先出然後生子其腸或未卽收以
草麻子四十九粒研碎塗頭上腸收急急洗去遲則有
害又方止用四十粒去皮研爲膏塗頂中收卽拭之如
腸燥以磨刀水潤之再用磁石煎湯服之須陰陽家用
過有驗者

難產

難產者交骨不開不能生產也服加味芎歸湯良久卽
下

小川芎

壹兩

當歸

壹兩

敗龜版

壹個

婦人娶灰

壹握

須用生過男女者爲末水一鍾煎七分服

死產

死產者子死腹中也驗母舌青黑其胎已死先用平胃散一服酒水各一鍾煎八分投朴硝煎服卽下用童便亦好後用補劑調理

下胞

胎衣不下用滾酒送下失笑散一劑或益母丸或生化湯送鹿角灰壹錢或以產母髮入口作吐胎衣卽出有氣虛不能送出者腹必脹痛單用生化湯

全當歸

壹兩

川芎

叁錢

白朮

壹錢

香附

壹錢

加人參

叁錢

更妙用水煎服

一方用葶麻子式兩雄黃式錢研膏塗足下湧泉穴
衣下急速洗去

平胃散

南蒼朮米泔水厚朴薑炒陳皮炙草
各式錢

共為粗末或水煎或酒煎煎成時加朴硝式錢再煎

一二沸溫服

失笑散

五靈脂蒲黃俱研為細末每服參錢熱酒下

斷臍

斷臍必以綿裹咬斷為妙如遇天寒或因難產母子勞
倦宜以大麻油紙燃徐徐燒斷以助元氣雖兒已死合



煖氣入臍多得生切勿以刀斷之

滑胎散

臨月常服數劑以便易生

當歸

叁伍錢

川芎

伍柒錢

杜仲

貳錢

熟地

叁錢

枳壳

柒分

山藥

貳錢

水二鍾煎

八分

食前溫服

如氣

體虛弱人加人參白朮隨宜服之如便實多滯者加

牛膝貳錢

治產秘驗良方

治橫生逆產至數日不下一服即下有未足月忽然

胎動一服即安或臨月先服一服保護無虞更能治

胎死腹中及小產傷胎無乳者一服即如原體

全當歸

川芎

各壹錢伍分

川貝母

壹錢

去心荆芥穗

黃芪 各捌分 厚朴 薑炒 蘄艾 紅花 各柒分 兎絲子 錢

分 白芍 壹錢 式分 枳壳 陸分 羌活 陸分 甘草 伍分

上十三味只用十二味不可加減安胎去紅花催生
去蘄艾用非水鍾半薑式片爲引熱服渣用水三鍾
煎半鍾熱服如不好再用水一鍾煎半鍾服之即效
不用式劑

催生兎腦九 治橫生逆產神效

臘月兎腦髓 壹個 母丁香 壹個 乳香 壹錢另研

麝香 壹分 兎腦爲丸 芡實大陰乾蜜封用時以溫酒

送下壹丸

奪命丹

臨產未產時目反口噤面黑唇青口中吐沫命在須

臬若臉面微紅子死母活急用蛇退 蚕故子燒灰 不存

性 髮灰 壹錢 乳香 伍分 共為細末酒下

加味芎歸湯 治子宮不收產門不開

人參 貳錢 黃芪 壹錢 川芎 壹錢 當歸 貳錢 升麻 捌分

炙草 肆分 五味子 拾伍粒 再不收加半夏 捌分 白芍

酒炒 捌分

新產治法

生化湯先連進二服若胎前素弱婦人見危症熱症

墮胎不可拘貼數服至病退乃止若產時勞甚血崩

形脫即加人參叁肆錢在內頻服無虞若氣促亦加



人參加參於生化湯者血塊無滯不可以參爲補而弗用也有治產不用當歸者見偏之甚此方處置萬全必無一失世以四物湯治產地黃性寒滯血若藥微酸無補伐傷生氣誤甚

產後用藥十誤

一因氣不舒而誤用耗氣順氣等藥反增飽悶陳皮用至伍分禁枳實厚朴

二因傷氣而誤用消導反損胃氣至絕穀禁枳壳大黃蓬稜麥曲朴

三因身熱而誤用寒涼必致損胃增熱禁芩連梔枳升柴