

御纂醫宗金鑑卷二

訂正仲景全書傷寒論註太陽中篇目錄

麻黃湯

芍藥甘草附子湯

桂枝新加湯

茯苓甘草湯

小建中湯

炙甘草湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

梔子厚朴湯

梔子乾薑湯

桃核承氣湯

抵當湯

抵當丸

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

甘草瀉心湯

生薑瀉心湯

半夏瀉心湯

赤石脂禹餘糧湯

旋覆代赭石湯



御纂醫宗金鑑卷二

訂正仲景全書傷寒論註

辨太陽病脈證并治中篇

太陽統攝之營衛乃風寒始入之兩途風則傷衛寒則傷營衛氣慄疾統氣而行脈外其用疏泄而屬陽邪之犯也易故其犯之也則有汗爲虛邪營氣專精統血而行脈中其體固密而屬陰邪之犯也難故其犯之也則無汗爲實邪夫冬固寒令也然春月餘寒秋末



早寒皆能致病但有無汗實邪證候顯然卽  
可謂之傷寒不必盡屬隆冬也然太陽經也  
膀胱府也由經視府則經爲表而府爲裏矣  
上篇用桂枝湯解肌所以治風傷衛之表也  
而未及衛分之裏故又立五苓散一方佐桂  
枝以和衛分之裏焉此篇用麻黃湯發汗所  
以治寒傷營之表也而未及營分之裏故又  
立桃核抵當方佐麻黃以攻營分之裏焉至  
於汗下失宜過之則傷正而虛其陽不及則

熱熾而傷其陰虛其陽則從少陰陰化之證  
多以太陽少陰爲表裏也傷其陰則從陽明  
陽化之證多以太陽陽明遞相傳也此篇中  
所以又有四逆承氣之治也凡風傷衛之虛  
邪已列上篇茲以寒傷營之實邪疏爲中篇  
使讀者先會大意於胸中斯臨證處方自不  
致誤矣

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脈  
陰陽俱緊者名曰傷寒

註

太陽病卽上篇首條脈浮頭項強痛惡寒之  
謂也營表陰也寒陰邪也寒邪傷人則營受  
之從其類也已發熱者寒邪束於皮毛元府  
閉密陽氣鬱而爲熱也未發熱者寒邪初入  
尙未鬱而爲熱頃之卽發熱也惡寒者爲寒  
所傷故惡之也必惡寒者謂不論已熱未熱  
而必惡寒也寒入其經故體痛也胃中之氣  
被寒外束不能發越故嘔逆也寒性勁急故  
脈陰陽俱緊也此承上篇首條言太陽病又



兼此脈此證者名曰傷寒以爲傷寒病之提綱後凡稱傷寒者皆指此脈證而言也

集註

方有執曰或者未定之辭必者定然之謂曰或曰必者言發熱早晚不一而惡寒則定然卽見也

喻昌曰仲景慮惡寒體痛嘔逆又未發熱恐誤認爲陰經之證故早於篇首揭明此語以辨之

程應旂曰傷寒陰陽俱緊之脈大不同於中

風陽浮而陰弱之緩脈矣證與脈兼得其實  
然後乃得正其名曰此太陽傷寒之病而非  
中風所能混也

魏荔彤曰傷寒中風同一浮脈而彼爲浮緩  
此爲浮緊陽邪舒散故緩陰邪勁急故緊同  
爲在表之浮而一緩一緊風寒迥異矣

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗  
而喘者麻黃湯主之

註

此承上條而詳言其證以出其治也太陽經

脈起於目內眥上額交巔入絡腦還出別下  
項循肩膊內挾脊抵腰中至足小指出其端  
寒邪客於其經則營血凝澁所傷之處無不  
痛也營病者惡寒衛病者惡風今營病而言  
惡風者蓋以風動則寒生惡則皆惡未有惡  
寒而不惡風惡風而不惡寒者所以仲景於  
中風傷寒證中每互言之以是知中風傷寒  
不在惡寒惡風上辨而在微甚中別之也無  
汗者傷寒實邪腠理閉密雖發熱而汗不出



不似中風虛邪發熱而汗自出也陽氣被寒  
邪所遏故逆而爲喘主之以麻黃湯者解表  
發汗逐邪安正也

集註

成無已曰寒則傷營頭痛身疼腰痛以致牽  
連骨節疼痛者太陽經營血不利也

程應旄曰頭痛發熱太陽病皆然而身疼腰  
痛骨節疼痛是寒傷營室若風傷衛則無是  
也惡風太陽病皆然而無汗而喘是陽被壅  
遏若風傷衛則無是也得其所同因以別其

所異也

沈明宗曰太陽之邪從皮毛而入鬱逆肺氣以故作喘且寒主收斂傷營則腠理閉密故用麻黃湯發之

### 麻黃湯方

麻黃 三兩 去節

桂枝 二兩

甘草 一兩 炙

杏仁 七十個 湯浸去皮尖

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去渣溫服八合覆取微

似汗不須啜粥餘如桂枝法將息

方解

名曰麻黃湯者君以麻黃也麻黃性溫味辛

而苦其用在迅升桂枝性溫味辛而甘其能  
在固表證屬有餘故主以麻黃必勝之算也  
監以桂枝制節之師也杏仁之苦溫佐麻黃  
逐邪而降逆甘草之甘平佐桂枝和內而拒  
外飲入於胃行氣於元府輸精於皮毛斯毛  
皴合精溱溱汗出在表之邪必盡去而不留  
痛止喘平寒熱頓解不須啜粥而藉汗於穀



也必須煮掠去上沫者恐令人煩以其輕浮  
之氣過於引氣上逆也其不用薑棗者以生  
薑之性橫散於肌礙麻黃之迅升大棗之性  
泥滯於膈礙杏仁之速降此欲急於直達少  
緩則不迅橫散則不升矣然此爲純陽之劑  
過於發汗如單刀直入之將用之若當一戰  
成功不當則不戢而召禍故可一而不可再  
如汗後不解便當以桂枝代之此方爲仲景  
開表逐邪發汗第一峻藥也庸工不知其制

在溫覆取汗若不溫覆取汗則不峻也遂謂  
麻黃專能發表不治他病孰知此湯合桂枝  
湯名麻桂各半湯用以和太陽留連未盡之  
寒熱去杏仁加石膏合桂枝湯名桂枝二越  
婢一湯用以解太陽熱多寒少之寒熱若陽  
盛於內無汗而喘者又有麻黃杏仁甘草石  
膏湯以解散太陰肺家之邪若陰盛於內而  
無汗者又有麻黃附子細辛甘草湯以溫散  
少陰腎家之寒金匱要畧以此方去桂枝干

金方以此方桂枝易桂皆名還魂湯用以治邪在太陰卒中暴厥口噤氣絕下咽奏效而皆不溫覆取汗因是而知麻黃湯之峻與不峻在溫覆與不溫覆也此仲景用方之心法豈常人之所得而窺耶

集解

王肯堂曰此方爲元氣不虛者設也如挾時氣者宜十神湯挾暑濕者宜正氣湯挾寒者宜五積散挾熱者宜通聖散挾食者宜養胃湯挾痰者宜芎蘇散按肯堂之議誠當矣然



必證兼表裏邪因錯雜似傷寒而非傷寒者  
乃可於諸方中斟酌選用若鯀證與麻黃桂  
枝脂合自當遵仲景之法治之卽元氣素虛  
或平素有熱不宜麻桂者亦必如劉完素張  
潔古法緩緩消息治之庶不誤人臨病之工  
宜詳審焉

吳綬曰凡傷寒寒邪在表閉其腠理身痛拘  
急惡寒無汗須用麻黃辛苦之藥開發腠理  
逐寒邪使汗出而解惟夏月炎暑之時雖有