

金匱要畧方論卷中

仲景全書

漢長沙太守張仲景著

晉太醫令王叔和撰

宋祠部郎中林億校正

明虞山人趙開美校

五臟風寒積聚病脈證并治第十一

論二首

脈證十七條

方二首

肺中風者。口燥而喘。身運而重。冒而腫脹。○肺中寒。吐濁涕。○肺死藏。浮之虛。按之弱如蔥葉。下無根者死。肝中風者。頭目暈。兩脇痛。行常偃。令人嗜甘。○肝中寒者。兩臂不舉。舌本燥。喜太息。胸中痛。不得轉側。食則吐而汗出也。脈經千金云時盜汗欬食已吐其汁○肝死藏。浮之弱。按之如索不來。或曲如蛇行者死。○肝着其人常欲蹈其胸上。先未苦時



但欲飲熱。旋復花湯主之。

臣億等校諸本。旋復花湯方皆同。

心中風者。翕翕發熱。不能起。心中飢食。卽嘔吐。

○心中寒者。其人苦病。心如噉蒜狀。劇者心痛徹背。背痛徹心。譬如蠱注。其脈浮者。自吐乃愈。

○心傷者。其人勞倦。卽頭面赤而下重。心中痛而自煩。發熱當臍跳。其脈弦。此爲心藏傷所致也。

○心死藏浮之實。如麻豆。按之益躁疾者死。○邪哭使魂魄不安者。血氣少也。血氣少者。屬於心。心氣虛者。其人則畏。合目欲眠。夢遠行而精神離散。魂魄妄行。陰氣衰者。爲癲。陽氣衰者。爲狂。

脾中風者。翕翕發熱。形如醉人。腹中煩重。皮目瞢瞢而短氣。○脾死藏浮之大堅。按之如覆盂。潔潔狀如搖者死。

臣億



等詳五藏各有中風中寒今脾只載中風腎中風中寒
不載者以古文簡亂極多去古既遠無文可以補綴也
跌陽脈浮而濇浮則胃氣强濇則小便數浮濇相搏大
則堅其脾為約麻子仁丸主之

麻子仁丸方

麻子仁 二升

芍藥 半斤

枳實 一斤

大黃 一斤

厚朴 一尺

杏仁 一升

右六味末之煉蜜和丸梧子大飲服十丸日三以知為度

腎著之病其人身體重腰中冷如坐水中形如水狀反不
渴小便自利飲食如故病屬下焦身勞汗出衣一作裏冷
濕久久得之腰以下冷痛腰重如帶五千錢甘姜苓朮湯



主之

甘草乾姜茯苓白朮湯方

甘草 二兩 白朮 二兩

乾姜 四兩

茯苓 四兩

右四味以水五升煮取三升分溫三服腰中卽溫

腎死藏浮之堅按之亂如轉丸益下如尺中者死

問曰三焦竭部上焦竭善噫何謂也○師曰上焦受中焦

氣未和不能消穀故能噫耳下焦竭卽遺溺失便其氣不

和不能自禁制不須治久則愈○師曰熱在上焦者因欬

爲肺痿熱在中焦者則爲堅熱在下焦者則尿血亦令淋

秘不通大腸有寒者多驚澹有熱者便腸垢小腸有寒者



其人下重。便血有熱者。必痔。

問曰。病有積。有聚。有滯氣。何謂也。○師曰。積者。藏病也。終不移。聚者。府病也。發作有時。展轉痛移。爲可治。滯氣者。脇下痛。按之則愈。復發爲滯氣。諸積大法。脈來細而附者。乃積也。寸口積在胸中。微出寸口。積在喉中。關上積在臍傍。上關上。積在心下。微下關。積在少腹。尺中積在氣衝。脈出左。積在左。脈出右。積在右。脈兩出。積在中央。各以其部處之。

痰飲欬嗽病脈證并治第十二

論一首

脈證二十一條

方十九首

問曰。夫飲有四。何謂也。○師曰。有痰飲。有懸飲。有溢飲。有

支飲。○問曰。四飲何以爲異。○師曰。其人素盛。今瘦。水走腸間。漑漑有聲。謂之痰飲。飲後水流在脇下。欬唾引痛。謂之懸飲。飲水流行。歸於四肢。當汗出而不汗出。身體疼重。謂之溢飲。欬逆倚息。短氣不得卧。其形如腫。謂之支飲。○水在心。心下堅築。短氣惡水。不欲飲。○水在肺。吐涎沫。欲飲水。○水在脾。少氣身重。○水在肝。脇下支滿。噎而痛。○水在腎。心下悸。○夫心下有留飲。其人背寒冷如手大。○留飲者。脇下痛。引缺盆。欬嗽則輒已。一作轉甚○胸中有留飲。其人短氣而渴。四肢歷節痛。脈沉者有留飲。○膈上病痰滿。喘欬吐。發則寒熱。背痛腰疼。目泣自出。其人振振身瞤劇。必有伏飲。○夫病人飲水多。必暴喘滿。凡食少飲多。水

停心下。甚者則悸。微者短氣。脈雙弦者寒也。皆大下後善。虛脈偏弦者飲也。○肺飲不弦。但苦喘短氣。○支飲亦喘。而不能卧。加短氣。其脈平也。○病痰飲者。當以溫藥和之。心下有痰飲。胸脇支滿。目眩。苓桂朮甘湯主之。

苓桂朮甘湯方

茯苓 四兩

桂枝 三兩

白朮 三兩

甘草 二兩

右四味。以水六升。煮取三升。分溫三服。小便則利。

夫短氣有微飲。當從小便去之。苓桂朮甘湯主之。上方見腎

氣丸亦主之。方見脚氣中

病者。脈伏其人欲自利。利反快。雖利心下續堅滿。此為留



飲欲去故也。甘遂半夏湯主之。

甘遂半夏湯方

甘遂

大者三枚

半夏

十二枚以水一升煮取半升去滓

芍藥

五枚

甘草

如指大一枚炙一本作無

右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半升和藥汁前取八合頓服之。

脈浮而細滑傷飲。○脈弦數有寒飲冬夏難治。○脈沉而弦者懸飲內痛。○病懸飲者十棗湯主之。

十棗湯方

芫花

熬

甘遂

大戟

各等分

右三味搗篩以水一升五合先煮肥大棗十枚取九合。

去滓內藥末、強人服一錢七分、羸人服半錢、平日溫服之、不下者、明日更加半錢、得快下後、糜粥自養、病溢飲者、當發其汗、大青龍湯主之。○小青龍湯亦主之、

大青龍湯方

麻黃

六兩
去節

桂枝

三兩
去皮

甘草

二兩
炙

杏仁

四十箇
去皮尖

生姜

三兩
切

大棗

十二
枚

石膏

如雞子
大碎

右七味、以水九升、先煮麻黃、減二升、去上沫、內諸藥、煮

取三升、去滓、溫服一升、取微似汗、汗多者、溫粉粉之、

小青龍湯方

麻黃

三兩
去節

芍藥

三兩

五味子

半斤



乾姜 三兩

甘草 三兩

細辛 三兩

桂枝 二兩
去皮

半夏 半升
洗

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥者

取三升去滓溫服一升

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脈沉緊得
數十日醫吐下之不愈木防己湯主之虛者即愈實者三
日復發復與不愈者宜木防己湯去石膏加茯苓芒硝湯
主之

木防己湯方

木防己 三兩

石膏 十二枚
雞子大

桂枝 三兩

人參 四兩



右四味以水六升煮取二升分温再服

朮防已加茯苓芒硝湯方

朮防已

二兩

桂枝

二兩

人參

四兩

芒硝

三合

茯苓

四兩

右五味以水六升煮取二升去滓內芒硝再微煎分温再服微利則愈

心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯主之

澤瀉湯方

澤瀉

五兩

白朮

二兩

右二味以水二升煮取一升分温再服支飲胸滿者厚朴大黃湯主之



厚朴大黃湯方

厚朴 一尺

大黃 六兩

枳實 四枚

右三味以水五升煮取二升分溫再服

支飲不得息葶藶大棗瀉肺湯主之

方見肺癰中

嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下有支飲故也

夏湯主之

千金云小半夏加茯苓湯

小半夏湯方

半夏 一兩

生姜 半斤

右二味以水七升煮取一升半分溫再服

腹滿口舌乾燥此腸間有水氣已椒瀝黃丸主之

已椒瀝黃丸方



防己

椒目

葶藶熱

大黃各一兩

右四味末之蜜丸如梧子大先食飲服一丸日三服增口中有津液渴者加芒硝半兩

卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者半夏加茯苓湯主之
小半夏加茯苓湯方

半夏一升

生姜半斤

茯苓三兩一分四兩

右三味以水七升煮取一升五合分溫再服

假令瘦人臍下有悸吐涎沫而癰眩此水也五苓散主之

五苓散方

澤瀉一兩一分

猪苓三分

茯苓三分

白朮三分

桂二分



右五味爲末白飲服方寸匕日三服多飲煖水汗出愈

附方

外臺茯苓飲治心胃中有停痰宿水自吐出水後

心胸悶

虛氣滿不能食消痰氣令能食

茯苓

三兩

人參

三兩

白朮

三兩

枳實

二兩

橘皮

二兩半

生姜

四兩

右六味水六升煮取一升八合分溫三服如人行八九里進之

欬家其脈弦爲有水十棗湯主之

上方見

夫有支飲家欬煩胸中痛者不卒死至一百日或歲宜十

棗湯

上方見



久欬數歲其脈弱者可治。實大數者死。其脈虛者必苦。其入本有支飲在胸中故也。治屬飲家。

欬逆倚息不得卧。小青龍湯主之。方見上文、肺癰中、

青龍湯下已多。唾口燥。寸脈沉。尺脈微。手足厥逆。氣從小

腹上衝胸咽。手足痺。其面翕熱如醉狀。因復下流陰股。小

便難。時復冒者。與茯苓桂枝五味甘草湯。治其氣衝。

桂苓五味甘草湯方

茯苓 四兩 桂枝 四兩 甘草 三兩
去皮

五味子 半升

右四味以水八升。煮取三升。去滓。分溫三服。

衝氣即低而反更欬。胸滿者。用桂苓五味甘草湯。去桂加



乾姜細辛以治其欬滿。

苓甘五味姜辛湯方

茯苓 四兩

甘草 三兩

乾姜 三兩

細辛 三兩

五味 半升

右五味以水八升煮取三升去滓溫服半升日三服

欬滿卽止而更復渴衝氣復發者以細辛乾姜爲熱藥也服之當遂渴而渴反止者爲支飲也支飲者法當冒冒者心嘔嘔者復內半夏以去其水

茯苓五味甘草去桂加姜辛夏湯方

茯苓 四兩

甘草 二兩

細辛 二兩

乾姜 二兩

五味子

半夏 各半升

右六味以水八升煮取三升去滓温服半升日三服水去嘔止其人形腫者加杏仁主之其證應內麻黃以其人遂痺故不內之若逆而內之者必厥所以然者以其人血虛麻黃發其陽故也

茯苓甘草五味加姜辛半夏杏仁湯方

茯苓 四兩

甘草 三兩

五味 半升

乾姜 三兩

細辛 三兩

半夏 半升

杏仁 半升
去尖

右七味以水一斗煮取三升去滓温服半升日三服

若面熱如醉此爲胃熱上衝熏其面加大黃以利之

苓甘五味加姜辛半夏湯方