

活人如聖餅子

治小兒瘡疹毒攻咽喉腫痛

海藏云隨

經此一方
卽是隨經

牛蒡子炒

甘草各壹兩

麥門冬去心半兩

桔梗壹兩

右爲末加竹葉同煎細細服之

海藏云減門冬竹葉甘桔鼠子湯治

咽喉不利

小兒瘰出欲透皮膚身熱咽喉不利甘草桔梗升麻

湯

甘草半兩

桔梗壹兩

升麻半兩

右剉細每服一大錢水煎服

豆豉咽喉

刀圭

三三

甘露飲子 治心熱咽喉痛口舌生瘡并瘡疹已發

未發竝可服之治熱上攻牙根腫痛動搖

生地黃

熟地黃

天門冬

去心

麥門冬

去心

枇杷葉

去毛

枳殼

炒

黃芩

去心

石斛

去苗

甘草

炒

山茵陳

右各等分爲麤末每服二錢水一盞煎食後溫服

一牙齒腫痛則含嗽并服

海藏云甘露飲爲血劑

地黃丸

治小兒痘疹口瘡喉腫痛牙疳臭爛

天門冬

麥門冬

玄參

各參兩

甘草

薄荷

各壹兩

右爲細末生熟地黃汁和丸櫻桃大每服一九溫

蜜水化服

甘桔防風湯

痘疹後餘毒咽喉痛

桔梗

甘草

防風

各等分

右剉散每服三錢水一盞煎至六分空肚溫服忌

酒薑椒熱物

玄參升麻湯

治痘疹後餘毒咽喉腫痛

升麻

玄參

甘草

各半錢

右剉散水一盞煎六分并查溫服痘疹熱甚涼服

射干鼠粘子湯

治痘疹後癰疽瘡毒

鼠粘子

貳錢

升麻

甘草

射干

各伍分

右剉散木一盞煎六分空肚服忌魚腥葱蒜

玉鎖匙

點嚥骨腫痛或垂下及喉舌強硬等證

硼砂

壹錢

朴硝

伍分

殭蠶

壹條

片腦

半分

右爲極細末咽喉腫痛每用少許以竹管吹之

加減射干鼠粘湯

治痘瘡熱毒上衝咽喉腫痛

射干

山豆根

白殭蠶

各壹錢

鼠粘子

紫草茸

紫苑各壹錢

桔梗

石膏

訶子

木通

各壹錢

升麻

蜈蚣分

甘草

伍分

右剉爲麤散每服四五錢水煎食遠服

利咽解毒湯

治痘咽喉痛首尾皆可用

山豆根

麥門冬

各壹錢

牛蒡子

炒

玄參

桔梗

各柒分

甘草

貳分

防風

伍分

藁豆

肆拾玖粒

右水煎服

三黃熟艾湯

痘後咽塞喉痺

黃連

黃芩

黃蘗

艾葉

各等分水煎服

腰痛

瘡疹發熱先腰痛者最忌經曰腰者腎之府也又曰
太陽所至爲腰痛蓋足太陽膀胱經爲十二經之首
其脉俠脊入循膂絡腎瘡疹之毒起於右腎之下循
足太陽膀胱散於諸經乃邪由裏傳表也如初發熱
其腰卽痛此邪由膀胱直入於腎故關節不利而腰
痛亟解毒以瀉少陰之邪發表以通太陽之經使邪
氣不得以深入瘡雖稠密或可愈也治若少緩則太
陽之邪由表以傳於陽少陰之邪由裏以傳於陰表
裏受病陰陽俱傷榮衛之脉不行臟腑之氣皆絕或

爲黑陷或爲癰塌終莫能救矣

凡發熱便腰痛者先服人參敗毒散

初熱

次服五苓

散加獨活細辛主之

薛痘瘡而見腰痛證者皆因腎經虛怯相火內燥真陰不能勝邪故腰作痛也急服地黃丸以防變黑歸腎乃克有濟大抵此痘因稟賦腎家精氣不足故目睛多白俗謂之折腰痘是也若平素面白眼白睛多行遲語遲者出痘必歸腎經預爲調補腎氣庶免此患一小兒十三歲眼睛多白或時面赤常患頸痛

尺脉洪數先君謂稟腎氣虛也黃芩料煎服而愈

至十五歲出痘先君云須多服前藥仍用地黃丸益氣湯更加倦怠乃以地黃丸大劑煎與恣飲又用大劑八珍湯痘漸出如式恪服前藥至暮歲二藥計十七斤餘而瘡先君每見嬰兒白睛多面色白或色赤令其預補脾腎以防出痘但信者少耳 一小兒出痘腰痛足熱發渴此稟腎虛火動也先君用大劑加減八味丸料煎與恣飲諸證漸退佐以大劑八珍加紫草糯米數劑膿漸灌仍用前藥而結痂用八珍湯而靨 一小兒出痘將愈因停食泄瀉作渴腰痛此脾腎虛弱也先君用加減八味丸料及五味異功散

渴瀉頓止又與六味丸料及八珍湯而靨 一小兒
面色常白目睛多白時常腰痛兩足時熱冬不衣綿
年九歲先君謂稟腎虛令每日服地黃丸至十歲出
痘腰痛發渴面赤飲冷用地黃丸每劑加肉桂半錢
煎與恣飲數劑之後熱渴頓止腰痛頓愈却去肉桂
仍與服之至五十餘劑而靨

加味地黃丸

熟地黃

酒浸蒸透曬乾
捌兩酒拌杵膏

山茱萸肉

乾山藥

五味子

炒各
肆兩

澤瀉

白茯苓

杜仲

鹿茸

肉桂厚者去皮取肉壹兩發熱者以此加之引虛火歸腎經而熱自止也

右各另爲末入地黃和勻量入米糊丸服煎服更

好

羌活當歸湯 治腰背痛初發熱時便宜服之

羌活

當歸

獨活

防風

川芎

黃蘗

各壹錢

柴胡

壹錢伍分

桂枝

柒分

槐仁

紅花

各捌分

酒水各半煎服

又方治腰痛有蒼朮漢防已

如神湯 治腰痛

當歸

桂皮

玄胡索

各等分爲末酒下二三錢

腹痛

婁痘腹痛多是痘毒當臨證消息 蕁內經腹痛皆

屬於寒惟有一證爲熱瘡疹腹痛皆屬毒熱也訣云
發熱肚中痛癰瘡腹內攻發多防不透發少更防癰
是已或有兼食積者 翁痘疹腹痛者由毒鬱於三

陰臍以上屬太陰當臍屬少陰小腹屬厥陰須分別

之腹脹者毒聚於腸胃也治法俱當升發解利痘毒

兼分利小便使毒氣上下分消則痛與脹自止故曰

痛隨利減脹以利消俗醫以厚朴行滯氣而不知升

發解利非其治矣亦有乳食停滯不消化而腹脹者

當以升發解利藥中加消食之劑所傷之物當審其
寒熱又有數日大便者大便行而痛脹自止亦未可
驟用硝黃也

定痛散 傷寒肚痛及冷氣痛

神麴

香附 各壹錢

山楂 貳錢

良薑

當歸

甘草 各伍分

右用薑三片棗二枚水煎服 手足逆冷加大附

子貳分

桂枝芍藥湯 治腹痛

桂枝

炙甘草 各壹錢

白芍藥 酒炒

生薑三片棗二枚水煎服

黃連湯 治熱毒在胃腹痛時或欲吐此藥能升降

陰陽

黃連

炙甘草

乾薑

桂枝

各貳錢

半夏

人參

各捌分

棗二枚水煎服

一味與功散 治小兒諸般釣證角弓反張胸膈臍

凸以透明沒藥爲末薑湯調下

紹定論云病有似是而非若同而異者蓋肢體厥冷而腹痛者此毒氣在裏也若不審諦必作極冷治之

反與熱藥爲害愈深未冷極者不問有無寒熱肢冷
腹痛必大便自利踈卧惡寒今身熱肢冷腹痛大便
不通乃熱毒在裏熱甚則發厥仲景所謂熱深厥亦
深也伏熱深而瘡疹不出者宜以蟬蛻末水煎服之
已出者亦可服毒氣得泄則四肢溫煖腹痛自止矣
前人論腹痛有虛實腸鳴自利而腹痛者爲虛痛是
冷也腹滿而不大便秘者爲實痛是熱也今腹中痛而
不大便又身熱耳尖冷脚冷爲瘡疹證明矣又有瘡
疹始發腹中有宿塊而痛者醫不能辨誤作食積下
之多夭橫矣

薛前證痘未出而發熱煩躁或作渴

飲冷大便堅實此熱毒壅滯也用疎利之藥萬凡

發熱腹中便痛者此毒氣內攻也急宜發表疎裏桂

枝大黃湯主之亦有外邪與毒相併致未盡出而腹

疼脹滿者宜參蘇飲去參苓加硝砂陳皮溫而出之

若原無腹痛發熱二三日後大便不通而痛者此燥

屎與毒相併而痛也三黃丸熱七物升麻丸初熱宣

風散痘發熱擇而用之有譫妄狂亂者三乙承氣湯主

之便秘原無腹痛或因飲冷水而痛者此冷痛也理

中湯吐利加桂心或因多食而痛者此食積痛也微

則木香大安丸傷食甚則備急丸傷食丁香脾積丸