

保產下總目

產後總論

血塊作痛

產後調治

惡露不下

惡露不止

外感發熱

火證發熱

陰虛發熱

氣虛發熱

乍寒乍熱

太陽感風

少陽感風

陽明感風

厥陰感風

少陰感風

風寒發厥

產後中風

虛極生風

咳嗽

喘促

尊勞

氣血

產後發瘧

鬱胃

下血

血暈

血脫

虛汗

頭痛

脅痛

不寐

心腹痛

臍腹痛

心痛

遍身痛

腹痛

不語

腰痛

頭暈

腿痛

四肢麻痺

脚氣



失音不語

狂言譎語

驚悸

怔忡

嘔吐

消渴

霍亂

泄瀉

泄痢

淋瀝

浮腫

小便不利

小便尿血

大便閉結

大便下血

血暈

外中風

中風

少風

風寒發熱

少風

少風

少風

風寒發熱

少風

少風

少風

風寒發熱

少風

少風

少風

風寒發熱

少風

少風

少風

風寒發熱



竹林女科證治卷三

保產下

產後總論

產後氣血大虛理宜峻補但惡露未盡峻補須防壅滯血能化又能生玫瑰無損原氣行中帶補方謂萬全無弊世以四物湯理產後誤人多矣葢地黃性寒白芍酸斂故也惟生化湯用之最當夫產後血塊宜消新血宜生若專消則新血不生專補則瘀血益滯厯考本草川芎當歸桃仁三味善去惡血驟生新血佐以炮姜甘草引入肺肝生血理氣則行中有補化



中有生實產後之至寶也因名曰生化湯凡病皆起於氣血之虛脾胃之弱而產後則氣血之衰脾胃之弱爲尤甚也是以丹溪立論必當大補氣血以爲先雖兼他證以未治之誠至論也若能擴充其意用藥施治則治產可以無大過矣蓋產後憂驚勞倦血氣暴虛諸證乘虛而入或有氣無專耗散或有食勿輕消導熱忌芩連寒忌桂附寒則血塊凝滯熱則新血崩流若中虛外感見三陽表證之多似可汗也產後而用麻黃則重竭其陽見三陰裏證之多似宜下也產後而用大黃則重亡其陰耳聾脇痛乃肝腎虛虧

惡血之停休用柴胡譎語汗出乃元氣虛弱似邪之
證毋用枳實厥有陽氣之衰難分寒熱非大補不能
回陽而起弱痺因陰血之虧無論剛柔非滋榮不能
舒筋而活絡他如乍寒乍熱發作有期證似瘧也若
作瘧治則遷延難愈神不守舍言語無倫病似邪也
君以邪治則危亡立見去血多而大便燥結菝蓉加
於生化非潤躁承氣之能通出汗多而小便短濇六
君倍用參芪茯苓必生液助津之可利加參生化頻
服能救產後之危長生活命屢用可調絕穀之證崩
漏脫肛多是氣虛下陷補中益氣湯堪用口噤拳攣

乃因血燥類風人參生化湯宜服若子宮入風而痛
甚宜用羌活養榮湯玉門寒冷而不閉洗用蛇床子
黃硫黃怔忡驚悸生化遠志安神之品語言恍惚安
神丸助血歸脾因氣而滿悶虛煩生化湯加木香爲
佐因食而吞酸呃逆六君加神麩麥芽爲良蘇木三
稜善能破血青皮枳殼最消脹滿一應耗血散氣之
劑發汗吐下之方只可施於壯實豈可用於產虛大
抵新產之後先問惡露如何塊痛未除未可遽加芫
朮腹中痛止補中益氣無疑至於亡陽脫汗氣虛喘
促頻服生化人參是用權也又以陰亡大熱血崩厥

暈速服生化原方以救急也王太僕曰治下禱下劑以緩急緩則路遠而力微急則味厚而力重故治產當遵丹溪而固本服藥宜效太僕以加頻此雖未盡產中之詳已不失乎產後之旨按此謂氣血隨胎而去必以大補為先其他皆屬可緩言雖近理而未免皆當過也故產後氣血俱去誠多虛證然有虛者有言之者有全實者凡此三者但當隨證隨人辨其虛不虛分治之不得執有成心概行大補以致助邪此實以不可不辨之真也

血塊作痛

產後血塊作痛多由產母難產過勞而成或調護失宜或寒邪凝滯以致血停作痛古法每用蘇木三稜



莪朮以迅攻之時醫多用歸尾紅花以急行之或延
胡牛膝以大破之他如用山查砂糖以消塊羨椒艾
酒以定痛亦非良劑至於治氣脹用烏藥香附枳順
之枳殼厚朴以舒之又有用青皮蘇子以下氣定喘
芩連梔柏以退熱除煩彼夫血枯便閉以承氣湯下
之而愈厥汗多小便濇以五苓散通之而愈秘此皆
重虛產母非徒無益反致變證百出蓋產後血塊固
宜消新血亦宜生必須行中帶補化中又生可稱善
治若生化湯能使塊消而痛止神清而氣復產後之
至寶也凡產兒下地未進飲食之先卽服一劑後再

服一劑可保產後一切危證

生化湯

當歸 八錢

川芎 三錢

炙甘草 五分

炮姜

用五分

桃仁

十粒去皮尖搗

水煎入陳酒六七匙沖服渣另用器

貯候三劑頭煎服完將三渣并作一劑水煎服

產後調治

產後百病皆血虛火盛瘀血妄行而已間有內傷飲食外感風寒然必先逐瘀補虛為主若不兼逐瘀但服參芪停滯之劑必有瘀血攻心即死者食肉太早亦然故產母但覺小水短少即是病生便須服藥調



理脾胃肝腎如不愈者必氣滯且逆蓋婦人凡事多
憂思恚怒憂思太過則氣結而血亦結恚怒太過則
氣逆而血亦逆甚則乳鞭脇痛要之女病皆因氣血
鬱結所以古方多用行氣藥

惡露不下

產後惡露不下有結聚成塊心胸煩悶臍下墜痛者
宜當歸血竭丸有兼受寒熱勞碌腰脊骨煩痛者宜
丹參散有寒熱交攻心慌昏沉腹中疼痛者宜通瘀
飲又有惡露方下忽然斷絕驟作寒熱臍腹百脈皆
痛如錐刺由冷熱不調或思慮動作氣所壅遏血畜



經絡者宜沒藥丸

當歸血竭丸

當歸

血竭

蓬朮

五靈脂

右為末米醋糊丸酒服二錢

丹參散

丹參一味曬乾為末酒服二錢

通瘀飲

當歸尾

大黃

各三錢

白朮

蜜炙

木通

各一錢

紅花

五分

桃仁

三十粒
搗如泥

水酒各半煎三沸入桃仁泥再煎一沸溫服



沒藥丸

當歸 一兩

白芍

桂心 各五錢

桃仁 尖炒去皮

沒藥

研各二錢五分 蝨蟲 去翅足炒

水蛭

炒焦各二十枚

右為末醋糊丸梧子大淡醋湯下三丸

惡露不止

產後惡露不止小便急痛者宜磨塊四物湯或血下

過多漸至瘦弱者宜八珍湯去甘草加厚朴黃柏阿

膠牡丹皮或下如豆汁紫黑過多者宜加味四物湯

或至月餘猶淋瀝不止已為陷下宜增益四物湯或

下不止至於數月及半載之久者宜千金方或惡血



不絕崩血不可禁腹中絞痛氣急者宜牛角腮丸或
惡露淋瀝不斷心悶短氣四肢乏弱頭心昏重五
煩熱面黃體瘦者宜牡蠣散若因血熱者宜清化飲
若傷衝任之絡者宜固陰煎加減用之若肝脾氣虛
不能收攝者宜補中益氣湯若氣血俱虛而淡血流
不已者宜十全大補湯若怒火傷肝而血不藏者宜
加減四物湯若風熱在肝而血下泄者宜一味防風
散服之神效

磨塊四物湯

熟地黃

當歸

白芍

川芎

延胡索

桃仁

去皮尖

肉桂

熟大黃

水煎服

八珍湯

人參

白朮

蜜炙

茯苓

炙甘草

熟地黃

當歸

白芍

川芎

各一錢

姜三片棗二枚水煎服

加味四物湯

熟地黃

當歸

各三錢

白芍

一二錢

川芎

蒲黃

阿膠

炒

蘄根

白芷

各一錢

水煎服



增益四物湯

熟地黃

當歸

各三錢

白芍 二錢

川芎

升麻

白芷

各錢

血餘灰 五分

水煎服

千金方

升麻 二錢

酏酒二鐘者取一鐘分二服

牛角腮丸

牛角腮

酥炙五兩

馬蹄殼

一個

生地黃

四兩

代猪石

乾姜

各三兩

阿膠

炒一兩

血餘灰

一兩即頭髮灰

右為末蜜丸白湯下

牡蠣散



牡蠣粉

龍骨

川芎

生地黄

茯苓

當歸

人參

艾葉

地榆

各一錢

炙甘草

五分

水煎服

清化飲

白芍

麥冬

去心各二錢

牡丹皮

茯苓

黃芩

生地黄

各二錢

石斛

一錢

水煎食遠服骨蒸多汗加地骨皮

一錢五分

熱甚而渴

或頭痛加石膏

一錢

下熱便澀加木通

一錢或黃柏

梔子如兼外發熱加柴胡

一錢

固陰煎



人參

熟地黃

各三錢

山藥

炒二錢

山茱黃

五錢

遠志

七分炒

炙草

一錢

五味子

十四粒

克絲子

炒香錢

水煎食遠服陰虛微熱而血不固者加川續斷

肝腎血虛小腹痛而血不歸經者加當歸

多濕或兼嘔惡加白朮

心虛不眠或多汗者加棗仁

櫻子肉錢二或醋炒又蛤錢一

補中益氣湯

人參

黃芪

炒

白朮

蜜炙

炙甘草

各一錢半

當歸

陳皮

五分

升麻

柴胡

各三分