

厚德堂集驗方萃編



經閉總論

婦人尺脈當勝而右手脈洪大者此和平無病之徵若或浮或滑
斷續不勻或肝脈沈細少力皆經閉而不通也蓋因本體虛弱及
色慾過度冷熱不節以致脾胃不和飲食少進久之新血不生遂
成閉塞矣或因墮胎傷血痢疾失血血去過多亦易致成此疾治
宜以生血補氣為主蓋氣旺則血生血生則經自行矣

一治婦女經閉不論虛實寒熱宜服此方

清熱通經湯

當歸

酒洗一錢

川芎

八分

白芍

酒炒一錢

生地黃

半錢

大黃

七分官桂

四分

厚朴

姜炒八分

枳殼

一錢

枳實

一錢

黃芩

一錢

蘇

木一錢

紅花

五分

桃仁

去皮尖十箇

烏梅

一箇

右

生薑

三片

水煎空心 温服不數劑而奏效

一論婦女經水不通腹中積塊癥瘕攻注刺痛宜服

歸朮破癥湯 歸尾 酒洗 赤芍 白芍 青皮 三稜 醋炒

木 醋炒各 香附 醋炒 烏藥 七分 官桂 蘇木 紅花 各五分

右剉一劑水煎入酒一盞空心服

一論婦女經閉一二年不通臍左下兼有塊積或吐血或便血發

熱咳嗽吐痰盜汗等證宜

養血調經丸 當歸 酒洗 川芎 一兩 白芍 酒炒 熟地黃 四兩 山茱

萸 酒蒸去 核 二兩 白茯苓 去皮 一兩 懷山藥 二兩 牡丹皮 一兩 梔子仁

炒 一兩 益母草 二兩 生地黃 酒洗 二兩 香附米 醋炒 二兩 陳皮 半兩 澤瀉



一兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服三錢空心淡姜

湯下

一治婦人血瘀作痛臍下脹滿或月經不行發熱體倦 當歸

桂心六分玄胡索

炒四兩

白芍

酒炒六分

血竭

六分

蒲黃

炒六分

右為末空心酒調下

消積通經丸

香附米

醋炒十兩

艾葉

醋炒二兩

當歸

酒洗二兩

川芎

一兩

赤芍

一兩生地黃

二兩

桃仁

去皮一兩

紅花

酒洗一兩

三稜

醋炒一兩

義木

醋炒一兩

乾漆炒一兩

右為細末醋糊為丸梧子大每服八十九臨卧

淡醋湯下

一治婦人月經不通鼻衄出血不止 侍郎張玉陽傳

當歸

一錢半



川芎一錢 白芍一錢 半 生地黄一錢 酒炒一分 知母一錢 黃柏一錢 鹽水炒

分桃仁一錢 去皮尖 紅花一錢 牡丹皮一錢 茅根一錢 側柏葉一錢 各二錢

大黃一錢 用紅花蘇木茜根共煮大 黃一日取出曬乾三錢 右判一劑水煎空心服

一治室女經水不行 當歸 生地黄 川芎 赤芍 荊芥穗

枳殼一錢 炒各 馬鞭草一錢 牡丹皮 杜牛膝 生蒲黃各五錢

桂心二分 烏梅半箇 右判一劑水煎服日二劑 過期不

行加澤蘭葉

一治室女經閉咳嗽發熱屬虛弱者宜

養血通經湯 牡丹皮 當歸各一錢 白芍 生地黄 陳皮

白朮去芦 香附各一錢 川芎八分 柴胡 黃芩各七錢 甘草四分

右判一劑水煎空心溫服

通經調氣湯治證同前

當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 生地黃

香附米

童便炒各一兩

牡丹皮

錢八 柴胡

錢六 黃柏

酒炒六錢 知母

童便炒八錢

牛膝

酒洗八錢

桃仁

去皮

紅花

二味量加

右判服如前法

一治婦人經閉不通不論新久下取良法

下取通經丸

乳香

沒藥

孩兒茶

巴豆

去壳

血竭

葱白

各五班貓五箇

右為末共搗為丸綿裹三層繫放筒口上

將絨繫住送入陰戶內三四寸許俟一炷香經水即下

一治婦人胃氣虛弱或悲哀過度怒氣傷肝以致吐血咳嗽發熱

盜汗經水不行治宜補中益氣湯加桔梗貝母兼進六味丸

補中益氣湯方見內傷門
六味丸方見婦人虛勞類



崩漏總論

婦人經脈忽然暴下不止者名曰血崩延綿日久不淨者名曰漏下皆由勞慾過度致傷衝任血海氣虛不能納制經血遂至失治法須大補氣血升舉脾胃之氣蓋脾胃為氣血之統攝陰陽之根蒂若不急加滋補恐去血過多漸至血脫氣竭甚可懼也然亦有內火甚熾迫血妄行者只宜瀉火滋陰不可妄投補劑蓋此中有寒有熱有虛有實惟在審證之分明寒熱毋混於所施庶無誤矣

脈徵

婦人漏下日久血崩數斗者脈急則死脈遲則生又曰脈小虛滑

者生大緊實數者死其寸口弦大者弦為藏大為孔藏則為寒孔則為虛虛寒相搏其脈為牢能辨此者庶無寒熱混施之誤矣

升陽除濕湯

當歸

酒洗五分

黃耆

一錢半

蒼朮

米泔浸一錢半

柴胡

一錢半

升麻

一錢半

甘草

一錢

藁本

錢各一

羌活

一錢半

獨活

一錢半

蔓京子

五分

蔓京子

七分

甘草

草

錢一

右剉作一劑水煎空心溫服少時以早飯壓之可

一服而愈又灸足太陰脾經血海穴二七壯此藥乃從

權之法因風勝濕為胃氣下陷而氣迫於下以收其血之

暴崩也佳後必須服黃芪人參當歸炙甘草之類數服以

服之

一治婦人崩漏多因氣於使而下者

黃耆

蜜炒五分

人參

五分

白朮

去蘆當歸身一錢酒洗川芎五分白芍一錢酒炒香附一錢黑蒲黃五分

熟地黃一錢地榆五錢升麻三分右剉一劑水煎空心服

一治婦人經水過多不止者 樗根皮七錢白芍兩黃芩兩

龜板兩黃柏錢香附子童便浸一宿二錢半右為末酒糊為丸

如梧子大每服五十丸空心溫酒白湯任下

一治婦人血崩氣血兩虛而兼熱者 當歸一錢酒洗川芎七分人參

一錢防風八分荆芥一錢黃芪鹽炒一錢白芍酒炒八分真阿膠珠炒一

錢艾葉醋炒一錢蒲黃炒黃連酒炒一錢半黃芩酒炒一錢白朮去蘆土炒生地

黃姜汁炒一錢半地榆一錢山梔子炒一錢甘草生三分右剉一劑水

煎空心溫服或姜棗煎服

一治婦人血崩或作肚腹刺痛者 蒲黃炒五靈芝 官桂

黃 甘草 錢各一 右為細末每服一錢姜湯調下

一治血崩惡露去多心神恍惚戰慄虛暈者宜

復元養榮湯 遠志肉 五分 人參 一錢 酸棗仁 一錢 黃芪 蜜炒一錢 荊

芥 八分 白芍 酒炒一錢 當歸頭 一錢 地榆 一錢 白朮 去蘆一錢 甘草 三分

右剉棗一枚水煎溫服 如虛極發暈不省人事口噤急

以醋噴其面又將鉄鉗燒紅浸入醋碗內沸起醋氣熏本

婦鼻邊此產後通用法也

一治婦人經候凝結黑血成塊左廂有血瘕水泄不止食有時不
化後血塊暴下并水泄俱作飲食減少形瘦弱血脫益氣古



聖人之法也先補胃氣以助生發之氣故曰陽生陰長諸甘藥為之先務也

益胃升陽湯

黃芪

蜜炒一錢半

人參

二錢

甘草

炙一錢

陳皮

一錢

白朮

去蘆

當歸

一錢

柴胡

五分

升麻

五分

神麴

炒一錢

生黃芩

二錢

右判一劑水煎服

腹痛加白芍三分肉桂少許

口乾

作渴加葛根五分

一異人傳授秘方治血崩如神

金鳳膏

白毛烏肉雄雞一隻吊死水泡去毛去腸雜不用將金櫻子之根洗淨切片裝入肚內酒煮令熟去藥將雞酒任意食之

一治血崩試效方

懷生地黃

用砂仁陳皮煎水蒸六分

牡丹皮六分

石棗

酒蒸去核六分懷山藥

五分

條芩酒炒八分

蒲黃炒八分

阿膠

炒八分

六分白芍酒炒八分

白朮

去芦炒六分黃連

姜汁炒八分陳皮

五分甘草

右合一劑生姜三片棗一枚不拘時服

一治婦人五十以上經脈暴行內經曰火主速不可以冷病治之

如下峻藥即死止可用黃連解毒湯以清其上加棕灰蓮殼

以滲其下然後用四物湯涼血和經可也

一方治血崩用槐花一兩百草霜半兩為末每服二錢燒紅秤錘

淬酒下

一方治風熱血崩荊芥穗燈火燒焦為末每服三錢童便調下

一方血虛內熱血不歸元而崩桂心燒存性為末每服一二錢米

飲調下

一方治血崩枯礬為末麩糊為丸指頂大每一丸好酒下

一方治血崩棕燒灰一撮好酒調空心一服立止

一方治血崩用益智仁為末每服二錢以燒紅秤錘淬黃酒調服

一方治血崩用精肉四兩百草霜二兩節過蘸喫即止

一方用乾驢糞為粗末入罈內燒烟令崩婦坐其上煙熏久自止

一方用腥腥草剉一劑水煎服立止

一方雞子一箇去黃入銀硃三錢攪勻燒存性溫酒下

一方蠶沙揀淨為末每服三錢空心溫酒調服



一方五靈脂炒盡烟為末每服一錢溫酒調下一方半生半炒

一方香附米炒黑為末每服三錢空心熱酒調服米飲亦可

一婦人崩漏面色黃或赤時覺腰間臍下痛四肢困倦煩熱

其經行先發寒熱二脇如束此脾胃虧損元氣下陷與相火

濕熱下迫所致以益氣湯加防風白芍黃柏炒

一女子漏下惡血月經不調或暴崩不止多下水漿之物或白帶

脫漏不止皆因飲食不節勞倦所傷或素有心氣不足致令

心火乘脾必怠惰嗜卧困倦乏力氣短氣急脾主滋榮週身

者也脾胃虛而心胞乘之故漏下月水不調也况脾胃為血

氣陰陽之根蒂也當除濕去熱抑風氣上伸以勝其濕又云

火鬱則發之以益氣湯去參朮陳皮加蒼朮藁本防風羌活
蔓荊子

一婦人經行太過血氣虛耗胃氣不足故經水妄行可以十全大
補湯去桂著加香附

一婦人血崩過服寒涼之劑其證益甚更加肚腹痞悶飲食不入
發熱煩躁脈洪大而虛此脾經氣血虛而發躁也今急用八
珍湯加炮姜以溫補之乃竟誤服止血降火之劑以致虛證
蜂起始信予言緩不及治矣

余思欲言一言而不可言者

今者世之養生者必曰血氣不和則百病生矣

余謂血氣不和則百病生矣然血氣不和之由

一氣不和則血不和血不和則氣不和

而氣不和者皆由乎

一氣不和則血不和血不和則氣不和

復附七

