




痘後辨症

種痘新書卷之九



痘後辨症賦

寧邑張

琰遜王氏編輯

西銘受師

受業曾衡波仝泰

痘結痂疔雖生意已成其八九餘毒未消而
是以眼合腹脹齒爲危候虛浮不退尙是齒機痂或成而反致
失聲前死恐爲黑腐腫未消而眼已先開眼開疑是內攻陽氣
極而狂叫喘呼腸胃傷而嘔嘔不寧至于冷風入胃則利下濃
粘熱滲膀胱則小便溺血熱毒逗留不化痂結而壯熱增寒經
絡各遺餘毒日哺而多其原多在午前爲實熱煩渴腮紅中

時方作是陰虛便調

毒弄舌心經熱盛何疑扶用

抬胸肺胃毒中有準身熱燎人而便秘恐來暴急驚風攸攸潮
熱兼泄瀉久變慢脾風症驗喪目于眼合羞明辨口疳于唇焦
齒黑寔熱下注大腸必有秘結之禍虛寒客留臟腑乃成泄瀉
之疴喘渴須分虛實驗症切勿差訛欲觀痼落之餘再審痼痕
之色桃紅潤澤榮衛俱安紫黑乾枯尚留風熱粉白爲氣血之
虛過過也應深逝走馬狀牙疳之烈月餘亦見長驅遍體赤瘰
乃是失於解利渾身青紫悉爲風寒所吹餘毒未消不特爲疽
爲癰見風太早恐其復發瘡痍此是先賢之秘訣余向後學以

宣傳

痘後調治法

痘至十五六日，醫齊其功已就。至是雖可無虞，第恐漿清痂薄，留餘毒爲殃。餘毒若在肌膚，是必爲疽，爲癰，疽癰旣形，則毒不內攻，此兒知其不喪，雖綿延亦可全生。若熱蘊肝經，則目紅頭痛，而眼合羞明，肺留餘熱，則咳逆痰涎，而瘡痕外著，實熱下注大腸，則大便或求膿血，裏急後重，致生痢痢之疴。餘熱若滲膀胱，其必陰囊腫脹，以致小便赤痛。若夫口瘡腐爛，齒血牙疳，狐惑瘡生，皆是胃經有毒。至若驚搐狂言，昏沉矇瞶，弄舌撮唇，悉是心家之熱。經絡若留餘毒，是以變生莫測。總隨症以調治，有熱則退其熱，有風則去其風，少謂痘家之症遂膠固而不通。

但用藥不宜太猛。恐元氣難在。寒涼良以大病之後。氣血未平。不惟病者必須慎其藥餌。卽未病者亦宜謹其起居。蓋洗浴太早。恐生浮腫。冒犯風寒。致生潮熱。慎服食物。致腹脹痛。痘痕損破。乃病瘡。嘆是以落痂之餘。最要避風寒。節飲食。莫速梳頭。莫早洗浴。不可出外行動。不可忍飢。過食熱物。慎勿多食生冷。切須禁忌。必待氣回血復。精神如故。臟腑安寧。然後可以無虞。痘收結痂。厚遲之三日。自落者吉。又痂色光潤。其癍帶紅。更無他症。飲食如常者吉。自食痘痂。雖有他症。任而不治。

痘後雜症

潮熱

痘後發熱

痘後發熱症有數端。有氣血回元而熱者。則悠。熱不煩不

渴。不一二日氣還血復而熱自退矣。不必服藥。又有痘後元

虧。或久坐。久視。勞動傷神而發熱者。只須安息調養。不必服藥。

又有感冒風寒而發熱者。必聲重鼻塞。惡寒惡風。宜用補中

益氣湯。人參。黃芪。白朮。茯苓。升麻。柴胡。炙草。

熱甚則以升柴爲君。加前胡有咳嗽。加陳皮。桔梗。半夏。南星。炒

芩。不過一二服。其熱自退。又有餘毒攻作。將發癰疽而潮熱

者。必痘漿清痂薄。熱而煩渴。舌有黃苔。遍身俱熱。有一二處尤

熱甚者。卽癰之所在也。治此宜解餘毒。精神旺者用。連喬飲。

連喬。牛子。柴胡。前胡。當歸。赤芍。防風。荆芥。

木通 車前 炒芩 炒連 虫退 活石 甘草 弱者加

人參 黃芪 大便秘者加酒大黃 或頭目大痛者餘毒土

攻目疾將作也仍以連喬飲去木通車前活石加升麻桔梗川

芎藭荷白芷蒙花菊花 目紅去當歸加胆草紅花生地 俱

必熱退痛止藥方可止然痘後元氣已虛解毒之藥必傷元氣

若毒清熱退即宜溫補以顧元神 又有氣血兩虛而熱者其

熱稍緩頭熱面不甚熱手足心熱手足背不熱精神怠倦大小

便利者乃虛熱也其熱多在午後故曰發在午前爲實熱申時

方作是陰虛治此宜用十全大補湯 又有餘毒不形痘癩而

特傳于肝肺而發熱者晝夜不息舌有黃苔或十指攣縮用生

痘落之症

地 柴胡 白芍 炒苓 姜虫 勾藤 牛子 知母 丹
皮 澤瀉 花粉 枣皮 甘草 此必血燥皮紅

痂落不落

痂黑唇紅而舌有苔其身有熱者此餘熱爲殃而不落也宜用
調元化毒湯與服解其餘熱外用細茶將膏共搗以絹盛之即
于痂上茶以解其熱膏以潤其燥其痂自落矣若痂薄唇白
而舌無苔者此元虛而血不潤故不落也宜用人參 黃芪
當歸 炙草 虫退與服外用雞膏與茶潤之而白落也又
有痘痂不落虛弱之甚昏沉不省人事者用人參清補湯入
參 黃芪 當歸 白朮 茯神 枣仁 麥冬 陳皮 甘

承氣方書 卷之二
草 又有痂乾陷八肌肉而不落者。用乳香二錢。輕粉二錢。共
爲末。用猪膏調敷。又或用鷹糞燒灰。馬齒莧汁。和蜜調敷。
又或過服辛熱。而痂不落者。用升麻。乾葛。防風。連喬
虫退。以去肌熱。而自落矣。

瘡後發痒

抓破成瘡

此皆血熱之症。宜用黃芩。黃栢生。紫草。甘草生。牛子。銀
花。生地。紅花。共煎油。搽之。卽愈。

瘡爛復灌

致成瘡疥

亦用前方與搽。或用黃豆燒灰。調油搽之。亦可。

瘡白

在此缺了

唇不蓋齒
飲食倍進

坐立動搖

瘡後諸瘡 數百字

蘇武傳卷之十一

贈其母子身亦益二人之善也

丙



漆梘剖開取其腹內之水洗之或用蜆壳煎水亦可蜆形如蚌壳生魚池泥中凡割漆者必用此壳俗呼漆梘其性涼而解毒又有用活石一兩甘草五錢共爲末調敷瘡上者名天水散凡痘痂之後抓破出血遍身復瀉膿漿成血風瘡每至春夏南風一起其瘡復發秋冬自愈但不纏染他人者俗呼痘風瘡也欲其不發須用火炙風池曲池三里諸穴內用苦參丸或花蛇酒與服則永不發矣

又方一掃光治一切瘡疥 銅綠 白礬生 大黃生 樟腦 流

黃 川椒 膽礬 梛子炙 白芷 水銀 錫 右方各等分

爲末另將錫融化入水銀攪勻然後入諸藥末調猪油敷上

苦參丸

苦參 炒枝 防風 只壳 玄參 獨活 黃連 黃芩

大黃

菊花

等分

共爲細末蜜調作丸如梧桐子大每服五十

丸酒送下

花蛇酒

用白花蛇一條蒸米數升先放酒曲次將布袋盛蛇

貯于酒曲之上然後將蒸米與酒藥和均頓于蛇上用帛封缸口候三七日開缸取酒將蛇去皮骨每服酒時配蛇全服再將酒調苦參末爲丸服愚謂只將蛇去其首置酒甕中入好

酒封固其口謾火煮熱候數目取酒與蛇並服

瘕癰

痘後忽然遍身青紫而發瘰癧者蓋血氣既虛肌膚未固倏感風邪故如是也用虫退末錢以生薑薄荷取汁調服令其發汗即愈

赤火流丹

一片通紅從頭起者過心不治從足起者過腎即死此惡毒暴發乘血橫行也宜內服 玄參 歸尾 紫草 紅花 石羔 連喬 赤芍 骨皮 車前 木通 防風 荆芥 淡竹葉 引外用馬蝗蜢三五條置紅腫處吐去惡血以洩其毒乃不延去 又俗呼天虹腫余紅此症其小便赤澀乃用 玄參 紅花 紫草 生地 防風 牛子 連喬 木通 車前 澤

瀉朱苓 活石 甘草與服外用川三漆磨好京墨塗之先用瓦鋒刺去毒血後用墨與三七塗之即愈

走馬牙疳

其先牙齦生痒時時出血繼而齦黑腐爛其齒漸落或每日落一齒或一日旋落數齒滿口齒俱落盡乃死見齒生痒即宜施治此蓋胃經蓄熱所致宜用人參石羔牛子甘草石斛與服以解脾胃之毒再用石羔牛子連喬黃芩生地紫草蛇床枯礬甘草煎水與噙即愈若牙齦腐爛則用蚕退散敷之 枯礬三錢

人中白

即尿脚焙乾二錢

五倍子

二錢

蚕退

燒一錢

蛇床子

二錢

共爲末

先用蟾蜍唾蘸米泔水洗淨水洗淨腐垢惡血然後以末藥敷

之。又救苦散亦治牙疳。人中白煨青黛五分。冰片一分。白
薑虫半錢寒水石三錢共爲末敷之。又用薑虫丹皮甘草心
連喬心生地銀花桑白皮沙參茯苓炒稻等分煎服。虛弱者加
人參。

唇口生瘡

上唇有瘡虫食其臟。其名曰狐。下唇有瘡虫食其肚。其名曰惑。
皆由裏熱生虫。內食臟腑。以及于肛。而外于唇之上下。乃有瘡
形也。必其人昏昏好睡。不思飲食。其聲嚶啞。而音不亮。卽狐惑
也。此最惡之候。必致鼻崩齒落失聲而死。宜用除慝丸治之。

黃連

二錢

盧薺

一錢

使君子肉

三錢

白蕪荑

一錢

乾蟬

五分

燒灰

川

練子肉

一錢

共爲末用烏梅洗淨去核搗爛和末爲丸米飯

又有口舌生瘡赤者名赤口瘡此心脾蓄熱也白者名白口瘡此心肺有熱也赤者用陰陽散白者用朱礬散又通用洗心散與服又通名鷺口瘡以鷺涎洗淨卽鷺喉煎水洗之亦可必洗淨乃可敷藥亦有洗之卽愈者又用糞脾虫蘸米汁水洗之者

陰陽散

黃連

三錢

乾薑

一錢

共爲末敷之

朱礬散

硃砂

二錢

白枯礬

一錢

共爲末敷之

洗心散

黃連

歸尾

生地

木通

薄荷

牛子

連翹

甘草等分煎服燈心湯引

桔梗

甘草等分煎服燈心湯引