

柴胡 苦辛微寒味薄氣升為陽主陽氣

下陷能引清氣上行而平少陽厥陰之

邪熱肝胆心包三焦相火時珍曰行少陽黃芩為佐行厥陰黃連為佐

宣暢氣血散結調經昂按人第知柴胡能發表而不知柴

胡最能和裏故勞藥血藥往往用之為足少陽經表藥為胆

清淨之府無出入其經在半表半裏法當和解小柴胡湯之屬是也若病在

太陽服之大早則引賊入門若病入陰經復服柴胡則重虛其表最宜詳慎

治傷寒邪熱仲景有大小柴胡等湯痰熱結實虛

勞肌熱寇宗奭曰柴胡本經並無一字治勞藥性論曰華子皆言補勞

傷醫家執而用之則誤無窮時珍曰勞有五若勞在肝膽心包有熱則柴胡

醫方集解卷二

發表之劑發者升之散之汗之也表者對裏而言也三陽為表三陰為裏而太陽為表

明為表之裏少陽為半表半裏也邪之傷人者由太陰少陰以及厥陰六經乃盡也治病者當及

其在表而汗之散之使不至于傳經入裏則病易已矣若表邪未盡而遽下之則表邪乘虛入裏或候補

之則內邪壅閉不出變成壞症者多矣經曰善治者治皮毛其次治肌膚其次治筋脉其次治

六府其次治五藏治五藏者半死半生也

麻黃湯仲景治傷寒太陽症邪氣在表發熱頭痛身痛腰

痛骨節痛項背強惡寒惡風但有一毫頭痛無汗而喘惡寒尚為在表

脉浮而緊寒邪外束陽不得越故鬱而為熱經曰人之傷寒則為病熱寒初中人必先表即足太

陽寒水之經太陽為諸陽主氣乃一身綱維本經之脉起目眚上腦下項循肩挾脊抵腰行于身後故所過之



乃手足厥陰少陽必用之藥。勞在脾胃，有熱或陽氣下陷，則柴胡為升清返熱，必用之藥。惟勞在肺腎者，不可用耳。寇氏一槩攢斥，殊非通論。昂按楊氏秦尤扶羸湯治肺痿成勞咳嗽聲啞體虛自汗，用柴胡為君，則肺勞亦有用之者矣。
嘔吐心煩邪在半表半裏，則多嘔吐。諸瘧寒熱，東垣曰：諸瘧以柴胡為君，佐以引經之藥。李士材曰：瘧非少陽經慎用。喻嘉言曰：瘧發必有寒有熱，蓋外邪伏于半表半裏，適在少陽所主之界，入與陰爭，陽勝則熱，出與陽爭，陰勝則寒，即純熱無寒為瘧，瘧溫瘧純寒無熱為牝瘧。要皆自少陽而造其極，偏補偏救弊亦必返還少陽之界。使陰陽協和而後愈也。謂少陽而兼他經則有之，謂他經而不涉少陽則不成其為瘧矣。脉縱屢遷而弦之一字實貫徹之也。昂按瘧之不離少陽猶咳之不離于肺也。談數云：張如閣久病瘧熱

處無不痛也。惡寒者，雖無風而惡寒。惡風者，當風而治惡之。故惡寒必兼惡風，惡寒有陰陽之分。惡風惟屬經，故三陰無惡風之症。風為陽邪，寒為陰邪也。厚病者曰身熱惡寒，熱在表也，熱在表而淺，邪畏正，故身熱而反惡寒。或言為寒在表，及熱在皮膚，寒在骨髓，皆謂之反。凡人之傷風暑濕，皆有汗，惟傷寒獨不汗出。寒者，又表實也。氣上逆故喘，邪在表故脉浮。傷寒脉緊而風脉緩者，寒動急而風緩散也。喻嘉言曰：冬傷寒，春傷溫，夏秋傷暑傷濕，此四時正病也。然夏秋亦有傷寒，冬春亦有傷暑傷濕，乃四時之客病，所謂異氣也。冬春正病有汗為傷風，無汗為傷寒。即夏秋正病有汗為傷暑濕，無汗為傷寒。亦治太陽陽明合病喘而胸滿，表邪壅盛，陽氣不得宣發，故逆而作喘。若去表甚近，非裏實，雖有陽明，然與太陽合病，尚為在表。宜汗不宜下。經曰：陽明病，脉浮，無汗而喘者，發汗則已。宜麻黃湯。又曰：陽明病，應發汗，反下之，此為大逆。或問兩經合病，當用兩經之藥，何以偏用麻黃湯耶？蓋邪自太陽而來，仍當提出太陽，不欲亦治哮喘症，客于背俞，復

時如火。年餘骨立。醫用葶附諸藥。熱益甚。孫琳授以小柴胡湯。三服脫然。琳曰。此名勞瘵。熱從髓出。加以剛劑。氣血愈虧。熱有在皮膚。在藏府。在骨髓。在骨髓者。非柴胡不可。若得銀柴胡。只須一服。南方者。力減。故三服乃效也。時珍曰。觀此。則得用藥之妙。而矣。昂按。據孫頭目赤。胸痞。脇痛。凡脇痛。多是肝木。有餘。宜小柴胡湯。加青皮。川芎。白芍。又左脇痛。宜汪血。行氣。右脇痛。宜消食。行痰。口苦耳聾。肝肺之邪。婦人熱入血室。衝為血海。即血室也。男女皆有之。柴胡在藏主血。胎前產後諸熱。小兒痘疹。在經主氣。五疳癰熱。散十二經。瘡疽血凝。氣聚功同。連翹治血熱。柴胡治氣熱。為少異。陰虛火炎。氣

感于寒而作。此湯散寒利肺。病哮喘者。雖服麻黃而不作汗。

麻黃 去節 桂枝 二 杏仁 七十枚 甘草 一兩 去皮尖 炙

數沸。去沫。內諸藥煎。熱服。覆取微汗。中病即止。

劑無汗再服。凡用麻黃。去節。醋湯畧泡。晒乾。備用。庶免發汗為先。汗出則愈。活人云。凡發汗。病症仍在者。三日內。可二三汗之。令腰以下。周徧為度。王海藏曰。表症當汗。脉浮急。汗之。脉沉緩。汗之。裏症當下。脉浮緩。下之。脉沉急。下之。三陽汗當急。而下當緩。三陰汗當緩。而下當急。按汗有大汗。解表。微汗。解肌之殊。下有急下。少與微和。參利之別。

此足太陽藥也。麻黃中空。辛溫氣薄。肺家喘藥。而走太陽。陽能開腠。散寒。從此入。仍從此出。桂枝辛溫。能引營分之邪。達之肌表。營衛和。始能作汗。杏仁苦甘。散寒而降

之邪。達之肌表。營衛和。始能作汗。杏仁苦甘。散寒而降



升者禁用。銀州者根長尺餘微白治

勞瘠良北產者如前胡而軟並良南產

者強硬不堪用外感生用內傷升氣酒

炒用根中及下降用稍有汗咳者蜜水

炒前胡半夏為使惡皂角

前胡辛以暢肺解風寒甘以悅脾理胸

腹苦泄厥陰之熱寒散太陽膀胱之邪

微寒一性陰而降功端下氣氣下則火

降而痰消火氣餘便是能除實熱治痰

熱哮喘咳嗽嘔逆火氣餘便是膈霍亂小兒疳氣

氣甘草甘平發散而和中經曰寒淫于內治以甘

以苦辛是已喻嘉言曰麻黃發汗其力最猛

如駟馬防其放逸耳李士材曰古云冬不用麻黃夏不用桂枝蓋以冬主閉藏不應疎泄夏令炎熱不宜發汗

經所謂必先歲氣毋伐天和是也又云夏月不用麻黃兩說相反何耶或舍時從症或舍症從時臨時變通并

乎其人耳李時珍曰仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用桂枝未有究其精微者津液為汗汗即血也在營則為

血在衛則為汗寒傷營營血內瀆不能外通于衛衛氣閉固津液不行故無汗發熱而惡寒風傷衛衛氣外泄

不能內護于營營氣虛弱津液不固故有汗發熱而惡風然風寒皆由皮毛而入皮毛肺之合也証雖屬太陽

然面赤拂鬱咳嗽有痰喘而胸滿非肺病乎蓋皮毛外閉則邪熱內攻故用麻黃甘草同桂枝引出營分之邪

達之肌表佐以杏仁泄肺而利氣汗後無大熱而喘者加石膏活人書夏至後加石膏知母是皆泄肺火之藥

是麻黃湯雖太陽發汗重劑實散肺經火鬱之藥屢理不密則津液外泄而肺氣虛虛則補其母故用桂枝同

有推陳致新之績明目安胎無外感者

忌用按柴胡前胡均是風藥但柴胡性升前胡性降為不同肝胆經風痰

非前胡不能除皮白肉黑味甘氣香者良半

夏為使惡皂莢忌火

麻黃 辛溫微苦僧繼洪云中牟產麻黃地冬不積雪性熱故過

服泄入足太陽勝兼走手少陰陽明大心過

而為肺家病藥發汗解肌去營中寒

邪衛中風熱調血脉通九竅開毛孔治

中風傷寒中猶頭痛溫瘧咳逆上氣寒風

鬱于肺經經曰諸氣膈鬱皆屬于肺痰哮喘喘哮喘宜瀉

本草前胡麻黃

甘草外散風邪以救表內伐肝木以防脾佐以木而固脾使以薑棗行脾之津液而和營衛者加厚朴杏仁以利肺氣也汗後脉沉遲者益肺氣也活人書加黃芩為陽旦湯以泄肺枝湯雖太陽解肌輕劑實為理脾救肺之藥傷寒即病者謂之傷寒不即病者謂之溫暑其原故一稱為傷寒其類則殊施治不得相混仲景之書專為即病之傷寒設不兼為不即病之溫暑設也今人或以為傷寒法治溫暑不過借用耳三陰傷寒寒症十居七八若溫暑但一于熱耳後人誤為通治遂疑諸熱劑不敢用是未悟仲景立麻黃桂枝湯之有所主有其時矣苟知非治溫暑之劑則羣疑冰釋矣又曰傷寒即發于冬寒之時寒邪在表閉其腠理非辛溫不能散之此麻黃桂枝等劑所以必用也溫病熱病發于暄熱之時鬱熱自內達外無寒在表故非辛涼苦寒苦酸之劑不能解之此桂枝麻黃等所以不可用而後人所處冰解散大黃湯千金湯防風通聖之類兼治內外者之所以可用也夫即病之傷寒有惡風惡寒之症者風寒在表表氣受傷也後發之溫熱病有惡風惡寒之症者必重感風寒而表氣亦受傷也若無新中之風寒則無惡風惡



麻黃而不出。赤黑斑毒。胃熱。一日斑症。汗。本草未載。赤黑斑毒。表虛不得再汗。非便閉。亦不可下。毒風癰痺。皮肉不仁。只宜清解其熱。

目赤腫痛。水腫風腫。過劑則汗多亡陽。

夏月禁用。汗者。心之液。過汗則心血為之動搖。乃驕悍之劑。丹溪以

人參麻黃同用。亦攻補法也。東垣曰。十劑曰。輕可去實。葛根麻黃之屬是也。邪

客皮毛。腠理閉拒。營衛不行。故謂之實。二藥輕清。可以去之。時珍曰。麻黃太陽

經藥。兼入肺經。肺主皮毛。葛根陽明經藥。兼入脾經。脾主肌肉。二藥皆輕揚發

散。而所入不同。王好古曰。麻黃治衛實。桂枝治衛虛。雖皆太陽經藥。其實營衛

藥也。心主營。為血。肺主衛。為氣。故麻黃為手太陰。肺之劑。桂枝為手少陰。心之

劑。時珍曰。仲景治傷寒。無汗用麻黃。有汗用桂枝。未有究其精微者。津液為汗。

寒之症。故仲景曰。太陽病。發熱而渴。不惡寒者。為溫病。如此。則知熱病亦如此。而不渴。惡寒者。非寒矣。或有不因新中風寒。亦見惡風惡寒之症。虛熱達于表。而傷表氣。所謂衛虛則惡風。營耳。非傷風惡風。傷寒惡寒也。溫病熱病。亦有耳。而後傳裏者。蓋鬱熱自內達外。外不能泄。還復入裏。成可攻之症。非如傷寒從表而始也。每見世人治溫病。誤攻其裏。亦無大害。誤攻其表。變不可言。此足明其熱之自內達外矣。間有誤攻致害者。乃春夏暴寒。所中之疫症。邪純在表。未入于裏。不可以溫病熱病同論。夫秋冬傷寒。真傷寒也。春夏傷寒。寒疫也。與溫病熱病。自是兩途。豈可同治。况傷寒直中陰經。與太陽雖傷。不及鬱熱。即傳陰經。為寒症。而當溫者。又與溫病熱病。大不同。其可混治乎。一陽子曰。傷寒傳足不傳手。非窮理之言也。草窗劉子。指足經所屬水土木。水遇寒而涸。冰土遇寒而圻裂。木遇寒而凋枯。故寒喜傷之。手經所屬金與火。金遇寒而愈堅。火體極熱。寒不能襲。故寒不能傷味者。奇之。將人身營衛經絡。上下截斷。不相聯絡。失血氣周流。瞬息罔間之旨矣。夫寒邪襲人。必先皮毛。灼熱鼻塞息粗。肺主皮毛。是手太陰肺。辛金先受病矣。海藏



汗即血也。在營則為血，在衛則為汗。寒傷營，營血內滯，不能外通，于衛氣閉固，津液不行，故無汗發熱而惡寒。風傷衛，衛氣外泄，不能內護，于營氣虛弱，津液不固，故有汗發熱而惡風。然風寒皆由皮毛而入，皮毛肺之合也，蓋皮毛外閉，則邪熱內攻，故用麻黃甘草同桂枝，引出營分之邪，達之肌表，佐以杏仁泄肺而利氣，汗後無大熱而喘者，加石膏。活人書：夏至後加石膏，知母皆泄肺火之藥。是麻黃湯雖太陽發汗重劑，實散肺經火鬱之藥。漿理不密，則津液外泄，而肺氣虛，虛則補其母，故用桂枝同甘草，外散風邪以救表，內伐肝木以防脾。佐以芍藥泄木而固脾，使以薑棗行脾之津液，而和營衛。下後微喘者，加厚朴杏仁以利肺氣也。汗後脉沉遲者，加人參以益肺氣也。活人書：加黃芩為陽旦湯，以瀉肺熱也。是桂枝湯雖太陽解肌輕劑，實為理脾救肺之藥也。

有傷寒自皮毛入之語。先師有桂麻羌芍之設，表之表之劑。然汗法舍皮毛，何自而解？更衣時兼正陽三陰裏之裏之劑。然下法舍大腸，何自而通？子謂金遇寒而愈堅，信乎陽氣怫鬱，舌胎言妄，心丁火病矣。先師有瀉心數法，亢極動血，上下煩蒸，厥陰心胞火，手少陽三焦火病矣。治有三黃柴芩數條，小便癰閉，手太陽小腸火病矣。治有五苓導赤之例。劉子謂火熱寒不能傷信乎。經又云：人之傷寒，則為病熱。既云病熱，則無水冰土折木枯之說。而有金燔火亢之徵矣。劉子何人，敢恃管見，惑世誣人哉。機要云：有厥陰經下利不止，脉沉而遲，手足厥逆，墮涕膿血，此難治。宜麻黃湯。小續命湯汗之。此有表邪縮于內，當瀉表而愈。張子和曰：殮泄以風為根，風非汗不出，有病此者，腹中雷鳴，水穀不分，小便滯澀，服瀉藥溫藥不效，炙中脫劑下數十，燥熱轉甚，津液枯竭，延余視之，脉浮大而長，身表微熱，用桂枝麻黃湯加薑棗煎連進三大劑，汗出終日，至旦而愈。次以胃風湯和其藏府，食進而安。經曰：春傷于風，夏必殮泄，故可汗而愈。按風屬木，脾屬土，木剋土故泄也。附大黃湯大黃兩半，芒硝大腹皮木通

發汗用莖葉煎十餘沸掠去浮沫或

用醋湯略泡，曬乾備用。亦有用蜜炙者。

無免止汗用根節無時出汗爲自汗屬陽虛夢中出汗爲盜

汗屬陰虛。用麻黃根蛤粉粟米等分爲末。裝盛撲之佳。時珍曰。麻黃發汗。駛不

能得根節止注。如影響。物理不可測。如此。自汗有濕。濕傷風。風愜氣虛。血虛。

腹虛冷虛胃熱瘕飲中晝亡陽赤痢等症皆可用蓋其性能行周身肌表引

然五藏亦各有汗。經曰。飲食飽甚。汗出。

出于腎。疾。恐。懼。汗。出。于。肝。搖。體。勞。苦。

厚朴白微爲使。惡辛夷。石膏。

荊芥一名
假蘇
辛薰而溫芳香而散入肝經

今復

甘草各一兩。桂心七錢半。桃仁廿一枚。治陽毒傷
解熱在內。恍惚如狂。被棺千金湯。苦參一兩。酒煮。

治天行熱毒垂死。冰解散
防風通聖散。見表裏門。

本方除桂枝加石膏名麻黃杏仁甘草石膏湯

下後不可更行桂枝湯。汗出而喘。無大熱者。

行。桂枝湯。桂枝既不可行。麻黃可行耶。無大熱。石膏可
行耶。喻嘉言曰。治傷寒。先分營衛。桂麻二湯。斷無混用。

之理此症太陽之邪雖從汗解然肺中熱邪未盡所以熱雖少止喘仍不止故用麻黃發肺邪杏仁下肺氣甘

草縵肺急石膏清肺熱即以治足太陽之藥通治手
太陰經也。倘誤行桂枝寧不壅塞肺氣而吐癰膿乎。亦

治溫瘧先熱後寒本方加白朮名麻黃加朮湯金匱治濕

家身體煩痛宜發汗本方去桂枝杏仁加附子名麻黃

附子湯治脉沉虛脹者爲氣水屬少陰發其汗即止

治溫瘧先熱後寒本方加白朮名麻黃加朮湯金匱治濕

家身體煩痛宜發汗本方去桂枝杏仁加附子名麻黃

附子湯金匱治脉沉虛脹者爲氣水屬少陰發其汗即止。

附子湯治脉沉虛脹者爲氣水屬少陰發其汗即止

氣分兼行血分其性升浮能發汗又云止

汗虛散風濕清頭目利咽喉治傷寒頭

痛中風口噤身強項直口面喎邪目中

黑花其氣溫散能助脾胃消食氣香入脾通利

血脉治吐血衄腸風崩中血刺產風血運

產後去血過多腹內空虛則自生風故

常有崩運之患不待外風襲之也荆芥

最能散血中之風華陀愈風散荆芥三

錢微焙為末豆淋酒調服或童便服諸

家云瘰癧瘡腫清熱散瘀破結解毒散

熱清則血為風病血病瘡家聖藥荆芥功本

本方除桂枝杏仁名甘草麻黃湯金匱治裏水

小便利重覆取汗本方去桂用麻黃不去杏仁

生名三拗湯局治感冒風寒咳嗽鼻塞

取其發連皮取其瀋甘草生用補中有發也

忌汗諸證仲景曰陽虛汗之則愈下之則死

痛宜汗之假令尺脈遲者不可發汗以營弱血少故也

若失小便者不可發汗發汗則四肢厥冷肺腎虛冷也

虛也淋家不可發汗發汗必便血亡耗津液反增客

熱也衄家亡血不可發汗發汗則陰陽俱虛針經

可發汗蓋為脈微也若浮緊者麻黃湯浮緩者桂枝湯

活人云脈微者黃汗則羸表虛熱聚故生瘡汗之則

荊芥主之非若防風能入骨肉也

連穗用

穗在于莖故善升發

治血炒黑用

凡血藥用山梔乾薑地榆樓櫚五靈脂等皆應炒黑

者以黑勝紅也

反魚鱉河豚驢肉

連翹

微寒升浮形似心

實似蓮房有瓣

苦心入心

故入手少陰厥陰

包心

氣分而瀉火兼

除手足少陽

三焦

手陽明經

大腸氣分濕

熱散諸經血凝氣聚

營氣壅遏衛氣鬱滯遂成瘡腫利

水通經殺蟲止痛消腫排膿

皆結者散之凡腫而

痛者為實邪腫而不痛為虛邪腫而為赤者為結熱腫而不赤為留氣停痰為

十二經瘡家聖藥

經曰諸瘡痛癢皆屬心火

表益虛熱愈甚而生風故變瘧

少陰病脈沉細數

為在裏不可發汗

少陰病但脈無汗而強

其血或從口鼻或從目出是名上厥下竭難治

數微弱者不可發汗脈沉遲為在裏反發其汗必

液越出大仁難表虛裏實必譫語

汗家重發汗必眩暈心下悸

有動氣者不可發汗

液心亡血液故離腹中上

傷寒傷風辨

傷寒鬱而後能發熱傷風即能發熱傷寒無汗傷風有汗傷寒無涕傷風有涕傷寒

手足微厥傷風手足背皆溫傷寒脈緊傷風脈緩

陰陽表裏辨

陽症之表發熱惡寒頭痛脊強便清不渴手足厥逆陽症之裏唇焦舌燥煩渴掀衣揚手擲足大

便秘結小便赤澀爪甲紅活身輕易于轉側脈浮洪數

陰症之裏不渴嗜臥引衣自蓋唇紫舌捲大便滑泄小便清白爪甲青黑身重難以轉側脈沉細數惟腹痛與

嘔陰陽裏症皆有之三陽經又有陰陽表裏之分太陽以熱在皮膚頭痛項強在經為表麻黃湯桂枝湯九味



紫蘇 味辛入氣分。色紫入血分。香溫散。

寒通心。利肺。開胃。益脾。氣香入脾。發汗。解肌。

和血。下氣。寬中。消痰。祛風。定喘。止痛。安胎。

利大小腸。解魚蠱毒。多服泄人真氣。

時珍曰同陳皮砂仁行氣安胎同藿香

烏藥溫中止痛同香附麻黃發汗解肌

同芎藭當歸和血散血同桔梗枳殼利

膈寬腸同藟子杏仁消痰定喘同木瓜

厚朴散濕解暑

治霍亂脚氣

鯉魚 蘇子與葉同功。潤心肺。尤能下氣。定喘。止嗽。消痰。利膈。寬腸。溫中。開鬱。

本草摘要 草 連翹紫蘇

桂枝湯 仲景 治太陽中風。陽浮而陰弱。發熱。頭痛。自汗。惡寒。

風惡寒。鼻鳴。乾嘔。關前為陽衛亦陽陽以候衛關後為

陰營亦陰陰以候營陽脉浮者衛中

風也陰脉弱者營氣弱也傷于風者頭先受之故頭痛

經曰陽浮者熱自發陰弱者汗自出風併于衛營弱衛

強故發熱自汗也衛虛則惡風營虛則惡寒自汗則皮

腠疎故惡風復惡寒也惡寒雖屬表亦有虛實之分無

汗惡寒為表實宜發汗汗出惡寒為表虛宜解肌鼻鳴

羌活湯以口渴尿赤熱入膀胱在府為裏五苓散湯以

以熱在肌肉目痛不眠在經為表葛根解肌湯以口渴

胃寒為熱漸入裏白虎加參湯若自汗狂譫熱亡胃

府為全入裏調胃承氣湯少陽以胸脇之間為半表半

裏表多小柴胡湯裏多熱盛者黃芩湯以上皆發熱

陽惡寒陽明自汗少陽多嘔皆三陽症也大抵陽症多

得之風寒暑濕邪生于太陽也陰症多得之飲食起居

七情邪生于少陰也故曰傷寒內傷者十居八九也

亦互云惡風後人謂傷寒惡寒傷風惡風誤矣及陽明

安胎。子降氣開鬱消痰定喘。表弱氣虛者忌用。葉腸滑氣虛者忌用于。炒研用。

薄荷 辛能散涼能清。本經溫蓋體。溫而用涼也。升浮。

能發汗搜肝氣而抑肺盛消散風熱清。

利頭目治頭痛頭風中風失音痰嗽口。

氣語滴舌胎。含漱眼耳咽喉口齒諸病。辛。

通竅而皮膚癰癧瘰癧瘡疥驚熱。凡小兒治。

驚藥俱宜骨蒸破血止痢。能治血痢。血痢病在凝滯。

辛能散涼能清。虛人不宜多服。能發汗疎表。月多服泄人元氣。

蘇產氣芳者良。薄荷。虎之酒也。蜈蚣。雞之酒也。桑椹。鳩之酒也。兩草魚之酒也。食之皆醉。被猫傷者薄荷汁塗之。

病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗。脉遲汗出屬陽明。

以微惡寒尚兼太陽仍當從外解肌斷其入胃府之路。

桂枝芍藥生薑甘草。兩三兩二兩大棗十二枚。

更啜稀熱粥以助藥力溫覆取微似汗不可令如水瀉。

漓汗出病差停後服服一劑盡病瘕猶在者更作服。

此足太陽藥也仲景以發汗為重解肌為輕中風不可。

大汗汗過則反動營血雖有表邪只可解肌故以桂枝。

湯少和之也經曰風淫所勝平以辛涼佐以苦甘以甘。

緩之以酸收之桂枝辛甘發散為陽臣以芍藥之酸收。

佐以甘草之甘平不令走泄陰氣也薑辛溫能散散寒止嘔。



雞蘇一名水蘇。
一名龍腦薄荷。

辛而微溫。清肺下氣。

理血辟惡而消。穀治頭風目眩肺痿血

痢吐衄崩淋喉。腥口臭邪熱諸病。
局方有龍

腦雞蘇丸。方莖中。虛似蘇葉而微長密齒

面鰯氣甚辛烈。

木賊溫微甘苦。中空輕揚與麻黃同形

性亦能發汗解肌升散火鬱風濕入足

厥陰少陽血分益肝膽治目疾退翳膜

翳乃肝邪鬱遏。及疔痛脫肛腸風痔瘻

不能上通于目。赤痢崩中諸血病。

本草黃芩草。薄荷雞蘇木賊浮萍

棗甘溫能助此不助于發散。又以行脾之津液。

衛者也。麻黃溫助于發散。故不用薑棗而津液得通矣。

龐安時曰。若無汗。小便數。或手足逆身冷。不惡寒反惡

熱者。慎不可用。又自汗。小便數者。不可服。自汗為陽虛

小便數為下焦虛。寒初病。表裏俱虛。病不在表。服此重

汗。竭其津液。是虛虛也。經曰。脈浮緊發熱。汗不出者。不

可與。脈緊為傷寒。與之則表益實。而汗愈難出矣。傷寒

例曰。桂枝下咽。陽盛則斃。承氣入胃。陰盛則亡。周揚俊

曰。風既傷衛。則衛氣疎。不能內護于營。而汗自出矣。汗

者。血之液也。苟非用血藥。以桂枝和營散邪。以芍藥護

營。固裏。則不但外邪不出。且入而為裏患矣。然後知和

浮萍 辛散輕浮。入肺經達皮膚。能發揚。

邪汗。丹溪曰。浮萍發汗甚于麻黃。止搔癢消渴。搗汁服。

生于水又能下水。氣利小便。治一切風。

濕癰疾。浮萍一味蜜丸酒服治三十六種風。濃煮汁浴。治惡疾瘡癩遍身。

燒煙辟蚊。紫背者良。

蒼耳子。一名萆耳。即詩卷耳。苦甘性溫。善發汗散。

風濕上通腦頂。下行足膝。外達皮膚。治

頭痛目暗齒痛。鼻淵肢攣。痺痛癰瘡。

疥。采根葉熬。名萬應膏。遍身搔癢。作浴湯佳。去刺酒。

拌蒸忌猪肉。聖惠方云。葉搗汁治產後痢。

營弱衛強。陰虛陽必痿之。故用桂枝發其汗。此乃調其營氣。則衛氣自和。風邪無所容。遂自汗而解。若非麻黃能開腠理。發出其汗也。汗多用桂枝者。以之調劑。則邪從汗出。而汗自止。非桂枝能開汗孔也。仲景治表虛製此湯。用桂枝為君。桂枝辛熱。助陽為藥。甘草佐之。若腹中急痛。乃製小建中湯。藥為君。芍藥酸寒。主收補中。桂枝甘草佐之。一治裏虛。又曰。以桂枝易肉桂。治感寒腹痛之神藥。中熱腹痛。去桂加黃芩。許叔微曰。仲景百一十二方。桂枝獨冠其首。今人全不用。何也。昂按仲景治傷寒。用麻黃桂枝。而全不用。羌活防風。是古人亦有所未備也。故潔古製羌活湯。黃耆湯。川芎湯。海藏製神木散。白朮湯。皆用羌活防風。以代之。黃耆川芎湯。附補門。神木白朮湯。見後。

本方加白朮。川芎。羌活。防風。飴糖。名疏邪實表湯。節治

同。陶氏製此。以白朮為君。以代桂枝湯。喻嘉言曰。坐令

古之黃耆湯。海藏之白朮湯。而來。又按節菴所著傷寒六書。盡易仲景原方。參合後賢法。以代桂枝。麻黃葛

天麻 辛温入肝經氣分。莖氣強陰通血。

脉强筋力疎痰氣治諸風眩掉頭旋眼。

黑語言不遂風濕痺音頑痺小兒驚癇音諸。

眩掉皆属肝木肝病不能榮筋故見前症。天麻入厥陰而治諸疾肝氣和平諸。

疾自血液衰少及類中風者忌用。風藥能燥。

血故也。昂按風藥中須兼養血藥制其燥也。養血藥或兼搜風藥宣其滯也。古。

云治風先治血。根類黃瓜莖名赤箭有。

風不動無風反搖一名定風。豈明亮堅實。

者佳。濕紙包煨熟切片酒浸一宿焙用。

秦艽 音交 苦燥濕辛散風去腸胃之熱益肝。

根青龍等劑在後人誠為便用。故世之嗜節菴者。勝。

仲景以節菴為捷徑。以仲景為畏途。節菴之書。在。

景之書晦。如節菴者可謂潔古海藏輩之功。而。

沙實為操莽也。本集採節菴方論頗多。然不能無。

者以節菴之功罪。本方去芍藥生薑名桂枝甘。

不妨互見于世也。治發汗過多。又手冒心。心下悸。欲得按者。汗多則亡陽。

虛悸而又手冒心也。桂枝益氣固表。甘草補中助陽。本方加附子。名桂枝加附子。

湯。仲景治太陽病發汗遂漏不止。惡風。小便難。四肢微急。

汗多亡陽。無以衛外。故惡風。汗多則便自少。兼膀胱無。

陽不能化氣。故便難。汗多則無液以養筋。兼有風入而。

增其勢。故四肢微急。與桂枝湯以和榮衛。加附子以助元陽。本方去芍藥加附子。名。

桂枝附子湯。仲景治傷寒八九日風濕相搏。身體痛煩不。

能轉側。不嘔不渴。脉浮虛而澹。八九日。再經之時。邪多。

在裏而復身體痛煩者。

在裏而復身體痛煩者。

在裏而復身體痛煩者。

在裏而復身體痛煩者。

在裏而復身體痛煩者。

在裏而復身體痛煩者。

膽之氣養血榮筋。風藥中潤劑。治風寒散藥中補劑。

濕痺。經曰風寒濕三氣雜至合而為痺。風勝為行痺。寒勝為痛痺。濕勝為着痺。痺在于骨則體重。在脉則血澀。在筋則拘攣。在肉則不仁。在皮則寒通。

身攣急。血不榮筋。虛勞骨蒸。時珍曰手足陽明。陽明有濕則手足酸痛。寒熱有熱則日晡潮熱。骨蒸聖惠方治急勞煩熱。素

芫柴胡各一兩。甘草五錢為末。每服二錢。治小兒骨蒸潮熱。食減瘦弱。秦艽炙

甘草各一兩。每服一二錢。錢。錢。乙加薄荷五錢。疸黃酒毒腸風

瀉血口噤牙痛。齒下齩屬手陽明大腸經。張潔古曰秦艽能去

下牙痛及濕勝風淫之症。小兒牛

本經風熱濕勝風淫之症。小兒牛

點服兼治黃疸煩渴便赤。形作羅紋相交長太黃

風濕相搏也。煩風也。痛濕也。不嘔不渴。裏無邪也。故知為風濕相搏。脉浮風也。澹濕也。浮而澹知寒濕但加附予以散寒濕。本方加芍藥生薑各一兩。

兩名桂枝新加湯。仲景治傷寒汗後身痛脉來微者。血虛也。正氣虛矣。外邪豈能出乎。與桂枝湯以解未盡之邪。加芍藥人參。斂陰以益營血。本方

草一半。加芍藥一倍。名桂枝加芍藥湯。仲景治太陽誤下

腹痛屬太陰症。表症未罷而誤下。表邪乘虛而入裏。當作結胸。則仍屬太陽經。今不胸滿而腹

滿。是那已入太陰經。然但腹滿時痛。尚非大實之痛。故但用桂枝以安太陽。倍芍藥以和太陰。本方加

大黃。名桂枝加大黃湯。仲景治表症誤下。大實痛者。別見

門本方去桂。加茯苓白朮。名桂枝去桂加茯苓白朮湯。

仲景治服桂枝湯或下之。仍頭項強痛。發熱無汗。心滿微

景治服桂枝湯或下之。仍頭項強痛。發熱無汗。心滿微



白左紋者良。蔓瀘為使。畏牛乳。

猪苓草 苦辛。生寒。熟温。治肝腎風氣。四

肢麻痺。筋骨冷痛。腰膝無力。風濕瘡瘍。

若痺痛由脾腎兩虛。陰血不足。不由風

濕而得者。忌服。風藥能燥血江東人呼猪

為猪。其草似猪。發臭。故名。唐成訥有進猪苓表。宋張

詠進猪苓表云。其草金枝銀線。素莖紫

莖。對節而生。頗同蒼耳。臣喫百服。眼目

清明。即至干服。鬚髮烏黑。筋力輕健。效驗多端。以五月五日六

月六日。七月七日。九月九日。採者尤佳。去粗莖。留枝葉花。實酒拌。蒸晒九次。蜜

痛。小便不利。表症未退。復增滿痛。便秘邪已內陷。故

薑以散滿祛寒。白朮茯苓以生津瀉水。合薑棗以和胃。安內即所以攘外也。本方加厚朴杏

仁。名桂枝加厚朴杏仁湯。仲景治太陽病下之微喘表未

解也。桂枝湯以解表。杏朴以下逆氣。本方去芍藥。生薑加茯苓。名茯苓

桂枝甘草大棗湯。甘瀾水煎。仲景治汗後臍下悸。欲作奔

豚。汗後臍下悸者。心虛而腎氣發動也。腎積名奔豚。腎氣逆欲上凌心。故用茯苓伐腎邪。桂枝治奔豚。甘草

大棗助脾而平腎。益土以制水。甘瀾水者。用瓢揚萬遍。水性鹹而重揚之則甘而輕。取其不助腎氣也。

本方合麻黃湯。名桂麻各半湯。仲景治太陽症如瘧狀。熱多

寒少。寒多為病進。熱多為病退。陽勝陰也。本方二分合麻黃湯一分。名桂

枝二麻黃一湯。仲景治太陽病已大汗。形如瘧。日再發。再