

虛火補之
上人參
天雄
桂心

中人參
黃耆
丁香
木香
草果

下附子
桂心
硫黃
人參
沉香

烏藥
破故紙

本熱寒之上
黃岑
連翹
梔子
知母

玄參
石膏
生地黃

中黃連
連翹
生苧
石膏

下黃蘗
知母
生苧
石膏
地骨皮

牡丹皮

本病噎膈反胃中滿腫脹吐嘔瀉利霍亂腹痛
消中善饑不消食傷飲食胃管當心痛支兩脇
標病發熱蒸蒸身熱身寒發狂譫語咽痺
上齒痛口眼歪斜鼻痛衄血赤瘡

胃實瀉之濕熱大黃 芒硝

飲食巴豆 神麴 山查 阿魏 礞砂

鬱金 三稜 輕粉

胃虛補之濕熱蒼朮 白朮 半夏 茯苓

橘皮 生薑

寒濕乾薑

附子

草果

官桂

丁香

肉豆蔻

人參

黃耆

本熱寒之降火石膏

地黃

犀角

黃連

標熱解之解肌升麻

葛根

豆豉

大腸屬金主變化爲傳送之官

本病大便閉結泄痢下血裏急後重瘰癧脫肛

腸鳴而痛

標病齒痛喉痺頸腫口乾咽中如核魴魴貝黃

手大指次指痛宿食發熱寒慄

腸實瀉之熱

大黃

芒硝

桃花

牽牛

巴豆

石膏

郁李仁

氣

枳殼

木香

橘皮

檳榔

腸虛補之氣

皂莢

燥

桃仁

麻黃

杏仁

地黃

乳香

松子

當歸

肉蓯蓉

濕

白朮

蒼朮

半夏

硫黃

陷

升麻

葛根

脫

龍骨

白堊

訶子

栗殼

烏梅

白礬 赤石脂 禹余糧 石榴皮

本熱寒之 清熱秦艽 槐角 地黃 黃芩

本寒溫之 溫裏乾薑 附子 肉豆蔻

標熱散之 解肌石膏 白芷 升麻 葛根

小腸主分泌水穀爲受盛之官

本病大便水穀不利小便短小便閉小便血小

便自利大便後血小腸氣痛宿食夜熱旦止

標病身熱惡寒噤痛頰腫口糜耳聾

實熱瀉之氣 木通 猪苓 滑石 瞿麥

澤瀉 燈草

血 地黃 蒲黃 赤茯 卮子 丹皮

虛寒補之氣 白朮 棟實 茴香 砂仁

神曲 扁豆

血 桂心 玄胡索

本熱寒之

降火黃蘗 黃芩 黃連 連翹 卮子

標熱散之 解肌藁本 羌活 防風 蔓荊子

膀胱主津液爲胞之府氣化乃能出號州都之

官諸病皆干之

本病小便淋瀝或短數或黃赤或白或遺失或氣痛

標病發熱惡寒頭痛腰脊強鼻塞足小指不用

實熱瀉之泄火滑石猪苓澤瀉茯苓

下虛補之熱黃蘗知母

寒桔梗升麻益智烏藥山茱萸

本熱利之降火地黃梔子茵陳牡丹皮

黃蘗地骨皮

標寒發之發表麻黃 桂枝 羌活 蒼朮

防已 黃耆 木賊

七方

岐伯曰氣有多少形有盛衰治有緩急方有大
小又曰病有遠近症有中外治有輕重近者奇
之遠者偶之汗不以奇下不以偶補上治上制
以緩補下治下制以急近而奇偶制小其服遠
而奇偶制大其服大則數少小則數多多則九
之少則一之奇之不去則偶之偶之不去則反

佐以從之。所謂寒熱溫涼，反從其病也。○

曰：臟位有高下，腑氣有遠近，病症有表裏，用藥有輕重。單方爲奇，復方爲偶。心肺爲近，腎肝爲遠。脾胃居中，腸膈胞膽亦有遠近。識見高遠，權以合宜。方奇而分量偶，方偶而分量奇，近而奇，偶制多數服之；遠而奇偶，制少數服之。則肺服九，心服七，脾服五，肝服三，腎服一，爲常制也。方與其重也，寧輕；與其毒也，寧善；與其大也，寧小。是以奇方不去，偶方主之；偶方不去，則反佐以

同病之氣而取之、如口瘡服涼藥不効、反噤官
桂、服理中湯之類、是也、完素曰、流變在乎病、主
病在乎方、制方在乎人、方有大小、緩急、奇偶、複
也、制方之體、本乎氣味、寒熱溫涼四氣、生于天
酸、苦、辛、鹹、甘、淡六味、成于地、是有形爲味、無形
爲氣、氣爲陽、味爲陰、辛、甘、發散爲陽、酸、苦、湧泄
爲陰、鹹、味、湧泄爲陰、淡、味、滲泄爲陽、或收、或散、
或緩、或急、或燥、或潤、或奠、或堅、各隨臟腑之症、
而施藥之品味、乃分七方之制也、故奇偶複三

方也大小緩急者四制之法也故曰治有緩急方有大小

大方岐伯曰君一臣二佐九制之大也君一臣三佐五制之中也君一臣二佐三制之小也又曰遠而奇偶制大其服近而奇偶制小其服大則數少小則數多多則九之少則二之完素曰身表爲遠裏爲近大小者制奇偶之法也假如小承氣湯調胃承氣湯奇之小方也大承氣湯抵當湯奇之大方也因其攻裏而用之也桂枝

麻黃、偶之小方也、葛根、青龍、偶之大方也、因其發表而用之也、故曰、汗不以奇、下不以偶、張從正大方有二、有君一臣二佐九之大方、病有兼症而邪不一、不可以三味治者、宜之有分量、大而頓服之大方、肝腎及下部之病、道遠者宜之、王太僕以心、肺爲近、腎、肝爲遠、脾胃爲中、劉河間以身表爲遠、身裏爲近、以予觀之、身半以上其氣上天之分也、身半以下其氣下地之分也、

小方從正曰、小方有二、有君一臣二之小方、病無兼症、邪氣專一、可以一二味治者、宜之、有分兩少而頓服之小方、心肺及在上之病者、宜之、徐徐細呷是也、完素曰、肝腎位遠、數多則氣緩、且牽制不能速達于下、必大劑而數少、取其迅急下走也、心肺位近、數多則氣急下走、不能升發于上、必小劑而數多、取其易散而上行也、王氏所謂肺服九、心服七、脾五、肝三、乃五臟生成之數也、

緩方岐伯曰補上治上制以緩補下治下制以
急急則氣味厚緩則氣味薄適其病所遠而中
道氣味之者食而過之無越其制度也王冰曰
假如病在腎而心氣不足服藥宜急過之不以
氣味飼心腎藥凌心心復益衰矣餘上下遠近
例同完素曰聖人治上不犯下治下不犯上治
中上下俱無犯故曰誅伐無過命曰大惑好古
曰治上必妨下治表必連裏用黃芩以治肺必
妨脾用茯苓以治腎必妨心服乾姜以治中必

俗上服附子以補火必涸水從正曰緩方有五
有甘以緩之之方甘草糖蜜之屬是也病在胸
膈取其畱戀也有丸以緩之之方比之湯散其
行遲慢也有品味件多之緩方藥衆則遞相拘
制不得各騁其性也有無毒治病之緩方無毒
則性純功緩也有氣味俱薄之緩方氣味薄則
長于補上治上比至其下藥力已衰矣

急方完素曰味厚者爲陰味薄爲陰中之陽故
味厚則下泄味薄則通氣味厚者爲陽氣薄爲

陽中之陰、故氣厚則發熱、氣薄發泄、是也。好古曰、治主宜緩、緩則治其本也、治客宜急急、急則治其標也、表裏汗下、皆有所當緩、有所當急、從正曰急、方有四、有急病急攻之急方、中風關格之病是也、有湯散蕩滌之急方、下因易散而行速也、有毒藥之急方、毒性能上涌下泄、以奪病勢也、有氣味俱厚之急方、氣味俱厚、直趨于下而力不衰也。

奇方王冰曰、單方也、從正曰奇方有二、有獨

一物之奇方病在上而近者宜之有藥合陽數
一三五七九之奇方宜下不宜汗完素曰假如
小承氣湯奇之小方也大承氣抵當湯奇之大
方也所謂因其攻下而爲之也桂枝麻黃偶之
小方也葛根青龍偶之大方也所謂因其發散
而用之也

偶方偶方有三有兩味相配之偶方有古方相
合之偶方古謂複方病在下而遠者宜之有藥
合陰數二四六八十之偶方宜汗不宜下王太