

卯 5

45

加減
易
秘
方

事

冊



口力秘

減方

靈



加減靈秘十八方

胡嗣廉纂

瘦樵程永培校

防風通聖散

治一切諸風或風熱走注疼痛麻痺者或腎水
真陰衰虛心火邪熱暴甚而僵仆或卒中久不
語或一切暴瘖而不語語不出聲而成風癰者
或洗頭風或破傷風或中邪昏冒者并小兒諸
疳積熱或驚風惡熱有一時所不能辨者或瘡



北京中医药大学图书馆藏

疹熱甚怫結而反出不快及出而陷將死或入
人小兒風熱瘡疥及久不愈者或頭生屑遍身
出黑黧紫白斑駁或面鼻生紫赤風刺癢疹俗
呼爲肺風者或成風癰世傳爲大風疾者或腸
風痔漏并解酒過熱毒兼治產後血液損虛以
致陰氣衰殘陽氣鬱甚爲諸熱證腹滿泄痛煩
渴喘悶譫妄驚狂或熱極生風而熱燥鬱舌強
口噤筋惕肉瞤一切風熱燥證鬱而惡物不下

腹滿撮痛而昏者兼治大小瘡及惡毒并墮馬打撲傷損疼痛或因而熱結大小便澀滯不通或腰脇疼痛腹滿喘悶者並皆治之除惡物過多而不吐者不宜服之

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

芒硝

連翹

薄荷

麻黃

不去節
各半兩

石膏

桔梗

黃芩

各壹兩

白朮

山梔子

荊芥穗 各貳錢半

滑石

叁兩

甘草

貳兩

右咬咀如麻豆大每服壹兩生薑參片同煎溫

服日再服

勞汗當風汗出爲皸鬱乃瘞勞汗出於元府脂

液所凝去芒硝倍加芍藥當歸發散元府之風

當調其榮衛俗云風刺

生癰疹或赤或白加麻黃鹽豉葱白出其汗麻



黃去節并去芒硝鹹走血而內凝故不能發汗
當依前方中加四物湯黃連解毒三藥合而服
之日二服故內經曰以苦發之謂熱在肌表連
內也

小便淋閉去麻黃加滑石連翹煎藥湯調木香
末二錢七麻黃主表不主裏故去之

腰脇痛走注疼痛者加硝石當歸甘草一服各
二錢調車前子末海金沙末各一錢內經曰腰



者腎之府若破傷風者如在表則辛以散之在裏則苦以下之兼散之汗下後通利血氣祛逐風邪者每一兩內加荊芥穗大黃各二錢調全蝎末一錢羌活末一錢

諸風潮搐小兒急慢驚風大便結秘邪熱暴甚腸胃乾燥寢汗咬牙夜竄睡語筋轉驚悸肌內蠕動每一兩加大黃一錢梔子二錢調茯苓末

二錢

肌肉蠕動者調羌活末一錢經曰肌肉蠕動

曰微風

風傷於肺咳嗽喘急每一兩加半夏桔梗紫苑
各二錢

打撲傷損支節疼痛腹中惡血不下每一兩加
當歸大黃各三錢半調沒藥乳香末各二錢

解利四時傷寒內外所傷每一兩內加益元散

一兩葱白十莖鹽豉一合生姜半兩水一大碗



煎至五七沸或煎一小碗溫冷服一半以筋
之卽吐罷後服一半稍熱服汗出立解

飲酒中風身熱頭痛如破者加黃連鬚

白十莖煎服立愈慎勿用桂枝麻黃湯解之

頭旋腦熱鼻塞濁涕時下每一兩加薄荷黃連

各二錢半內經曰膽移熱於腦則辛額鼻淵鼻

淵者濁涕下不已也王注曰膽液下澄則爲濁

涕下不已如水泉故曰鼻淵也此爲足太陽脈



與陽明脈俱盛也

氣逆者調木香末一錢服之

小續命湯 十一味

通治八風五痺痰厥等疾以一歲爲總六歲爲別藥內隨證細分加減自古名醫不能越此

麻黃 去節

人參

黃芩

芍藥

甘草 炙

川芎

杏仁

麩炒去皮尖

防已

官桂

去麁皮各一兩



力派暴利

防風

一兩半

附子

炮去皮
臍半兩

右除附子杏仁外搗爲麤末後入二味勻每服

五錢水一鍾半生姜五片煎至一鍾去粗稍熱

食前服

方一 無附子防風生姜有當歸一兩

春加麻黃一兩

夏加黃芩七錢

秋加當歸四兩

冬加附子半兩

精神恍惚加茯神遠志



骨節煩痛有熱者去附子倍芍藥

心煩多驚者加犀角半兩

骨間冷痛者倍用桂附

嘔逆腹脹者倍人參加半夏一兩

燥悶大便澁者去附子倍芍藥入竹瀝一合煎服

臟寒下利者去防己黃芩倍附子一兩加白朮

一兩



北京中醫藥大學圖書館藏

便利產後失血并老人小兒加麻黃桂心甘草
各二兩

治或歌哭或笑語無所不及加麻黃人參桂枝
白朮各三兩

自汗者去麻黃杏仁加白朮

脚弱加牛膝石斛各一兩

身疼痛加秦艽一兩

腰疼加桃仁杜仲各半兩

失音加杏仁一兩

平胃散

治脾胃不和肚腹疼痛霍亂嘔吐或泄瀉不止
四時不伏水土山嵐瘴氣并傷寒疫癘之疾並
皆治之

蒼朮

五兩

陳皮

厚朴

姜製
各三兩

甘草

炙二兩

每服五錢生姜三片棗一枚煎不拘時溫服瀉



脾溼加茯苓丁香白朮爲調胃散一法加藿香
半夏加乾姜爲厚朴湯

瘟疫時氣二毒傷寒頭痛壯熱連鬚葱白三寸
豆豉三十粒煎三二服微汗出愈

五勞七傷脚手心熱煩躁不安百節酸疼加柴
胡痰嗽瘧疾加姜製半夏

本臟氣痛加茴香水氣腫滿加桑白皮

婦人赤白帶下加黃耆



飲冷傷食加高良姜 酒傷加丁香

滑脫泄瀉加肉豆蔻

風疾四肢沉困加荊芥 腿膝冷痛加牛膝

渾身虛壅拘急加地骨皮

腿膝溼痺加兔絲子 白痢加吳茱萸

赤痢加黃連 頭風加藁本

轉筋霍亂加楠木皮

七邪六極耳鳴夢洩盜汗四肢沉重腿膝酸痿

