

傷寒論條辨卷之五

新安方有執中行甫著

桐川陳廷柱斟鐫

渭南嚴式誨重刊

辨太陰病脈證并治第六

凡九條
方二

一陰經皆屬藏藏病不易治雖然治之得其道則反
易愈由其不似陽經之數於變也三陰惟太陰之
條目少者孤藏也然以大槩言之首尾只病三陽
而病者極多蓋太陽主表先太陽而病者常也天
人之自然也各經之自中鑿說也無此事理也且
三陽當病之時得治則愈又沉一入陽明則不復



轉所以病陰證而病者絕少臨病切要仔細端詳
不可苟且忽略謠俗專以交口陰陽偶爾中傷執
爲陰證下醫又快售乃習迷而同醉遂致普遍大
謬數音速○夫以病在三陽而謂之陽證病在三陰而謂之陰證非甚高遠難知也而徇俗者乃
謬固執迷而不醒
道之不明有以夫

①太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自
痛若下之必胃下結鞭

太陰脾經也其脈起於大指之端上循膝股內廉
入腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本靈樞曰是動則
舌本強食則嘔胃脘痛腹脹身體皆重是主脾所
生病者舌本痛體不能動搖食不下蓋脾爲胃之
合自利益甚者脾苦溼病而不能爲胃以行其津
液水穀不分也時腹自痛者靈樞曰足太陰之別

名曰公孫去本節之後一寸別走陽明其別入絡
腸胃實則腸中切痛是也胷下結鞭者足太陰之
脈其支者復從胃別上膈注心中故誤下則邪反聚其別也

②太陰中風四肢煩疼陽微陰澀而長者爲欲愈

四肢四末也脾主四末素問曰風淫末疾是也陽
微陽經無邪也陰澀太陰統血血凝氣滯也長陽
氣勝也陽主發生故邪自退而病欲愈也

③太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯

浮爲在表太陰之脈尺寸俱沈細今見浮則邪見
還表可知然浮爲風宜桂枝湯者以太陰之中風
言也○方見
太陽上篇

④自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之宜

服四逆輩



自利不渴溼勝也太陰溼土故曰有寒四逆之輩皆能燠土以燥溼故曰溫之也

⑤傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在太陰太陰當發身黃若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實穢腐當去故也

此條二節自不能發黃已上與陽明第四十一條上節同下節相反蓋同感異變而各成一家之證也然彼以至七八日反大便秘為轉陽明此以至七八日暴下利穢腐當去為脾家實何也蓋脾主為胃以行其津液暴下利則脾得以為胃行其津液矣所以脾為實而證為猶繫太陰也彼大便秘者由脾不能為胃行其津液而反為約所以為轉陽明也然則一脾胃也而反覆之變不同有如此者醫之為道豈可以易易言哉

⑥本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也

桂枝加芍藥湯主之

桂枝加芍藥湯方

於桂枝湯方內更加芍藥三兩隨前共六兩餘依

桂枝湯法

腹滿時痛者脾受誤傷而失其職司故曰屬太陰也
也以本太陽病而反下也故仍用桂枝以解之以
太陰之被傷而致痛也故倍芍藥以和之

⑦太實痛者桂枝加大黃湯主之

桂枝加大黃湯方

桂枝

三兩
去皮

大黃

一兩

芍藥

四兩

甘草

二兩
炙

生薑

二兩
切

大棗

十二枚
擘



右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三服

此承上條而又以胃家本來實者言本來實者言本有宿食也所以實易作而痛速故不日陽明而日大實例之變也桂枝加大黃者因變以制宜也然日桂枝加則補方者當一例如上文云云不當載成方且以本方加也而用芍藥六兩水七升不合數皆後人之苟用者當斟酌焉

⑧太陰爲病脈弱其人續自利便設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也

此承上條申致戒謹之意

⑨太陰病欲解時從亥至丑上

亥子丑太陰所王之三時也欲解者正王則邪不勝也

辨少陰病脈證并治第七 凡四十六條方十五



三陰先太陰者太陰正位中宮統倉稟也少陰居下而先於厥陰者陰道逆自下而上也

①少陰之爲病脈微細但欲寐也

少去聲下皆同○少陰腎經也脈微細者少陰居於極下其脈起於小趾之下也靈樞曰是主所生病者嗜臥但欲寐嗜臥也蓋人肖天地天地之氣行於陽則闢而曉行於陰則闔而夜故人之氣行於陽則動而寤行於陰則靜而寐然則病人但欲寐者邪客於陰故也

②少陰病始得之反發熱脈沈者麻黃附子細辛湯主之

麻黃附子細辛湯方

麻黃

二兩去節

細辛

二兩

附子

一枚炮去皮破八片

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內藥煮



取三升去滓溫服一升日三服

發熱邪在表也脈沈少陰位北而居裏也以裏居裏邪在表而發熱故曰反也以邪在表不在裏故用麻黃以發之以其本陰而標寒故用附子以溫之細辛辛溫通於少陰用之以佐主治者以其專導經而向導也

③少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之

附子湯主之

附子湯方

附子

二枚去皮破八片

茯苓

三兩

人參

二兩

④白朮

四兩

芍藥

三兩

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

口中和謂不燥不渴裏無熱也少陰之脈貫脊脊背也背字从北从肉北天地之陰方也北肉爲背人身背陰之處也陽脈在背根陰之義也經傳謂背爲陽者其猶謂桂枝發汗與夫曆家謂月行速之意歟腎居北方其行屬水生於天一故曰少陰然則陰寒湊於少陰宜乎背惡寒而他處不惡也灸之以火者火能助陽而陰自消也主之以附子者附子溫經而寒自散也人參甘寒補其氣以扶陽於生芍藥酸平收其陰而爲陽之附茯苓甘淡淡以利竅逐水以消陰甘以入心順火以從陽朮味甘苦苦以燥溼制水而燠土甘以益脾和中而固本也

④少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能制水故令色白也



醫藥大學圖書館版權所有

欲吐不吐心煩者少陰之脈循喉嚨其支者從肺出絡心注胃中故也自利者腎氣實水無制也虛故引水自救釋上文之渴也白寒色也病形悉具以其本病之口燥舌乾言也小便白者至未反覆申明上文所以曉人勿認煩渴爲熱以致誤之意

⑤病人脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利

陰陽俱緊傷寒也傷寒不當有汗故謂汗爲反出亡與無同古字通用無陽者汗乃血之液陰主血寒爲陰而傷血陰邪湊於少陰陰盛矣故謂無陽以爲之衛護而汗所以反得自出也咽痛者少陰之脈循喉嚨也其藏屬水所以不惟咽痛而復吐利水無制也

⑥少陰病脈細沈數病爲在裏不可發汗

細沈而數裏熱也故曰病爲在裏不可發汗惡虛其表也

⑦少陰病脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱
澀者復不可下之

微者氣不充故曰無陽無陽則化不行故汗不可
發也尺以候陰弱澀者陰血不足也故謂復不可
下蓋少陰藏寒其官作強有出無入有虛無實有
補無瀉所以汗下皆不可行而反覆丁寧以示禁
止如

⑧少陰病欬而下利譫語者被火氣劫故也小便必
難以強責少陰汗也

少陰之脈從足走腹循喉嚨其支別自肺自下而
上者也受火之劫火性炎上循經而蒸爍於肺肺
傷則氣逆所以欬也下利者少陰屬水其藏虛寒
劫迫則滑脫也滑脫而虛故生熱亂而譫語也強
責謂過求也小便與汗皆血液也少陰
少血劫汗奪血則小便之涸竭故難也

⑨少陰病下利若利自止惡寒而倦臥手足溫者可治

下利陰寒盛也自止寒邪退也惡寒而倦臥其藏本虛寒也手足屬脾溫者脾土和也土和則萬物生故曰可治也

⑩少陰病惡寒而踰時自煩欲去衣被者可治

惡寒而踰承上條而言也時或自煩欲去衣被陽熱復也猶之手足溫故亦曰可治也

⑪少陰病脈緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈緊反去者爲欲解也雖煩下利必自愈

緊寒邪也自下利脈暴微者陰寒內泄也故謂手足爲反溫言陽回也陽回則陰退故謂緊反去爲欲解也夫寒邪在陰而脈緊得自利脈暴微手足溫緊去爲欲解者猶之邪在陽脈數而熱得汗出



脈和身涼數去爲欲愈之意同陰陽勝復之理也

③少陰中風陽微陰浮者爲欲愈

陰陽詳見二難三難陽微風邪散而表氣和也陰浮者裏氣勝而邪外出也

④少陰病欲解時從子至寅上

子丑寅陽生之時也各經皆解於其所王之時而少陰獨如此而解者陽進則陰退陽長則陰消且天一生水於子子者少陰生王之

⑤少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必便血也

膀胱屬太陽太陽者六經之長也爲諸陽主氣與少陰腎爲合陰從陽化裏熱達表故一身手足盡熱也熱在膀胱太陽多血腎司開闔陰主下降故熱亂則血出於二便也



北京中醫藥大學圖書館版權所有

⑤少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何

道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭爲難治

必動其血者汗爲血之液不得汗則得血也或從口鼻或從目出者迫則錯經而妄逆也下厥以少

陰居下而熱深言也上竭以妄逆言也

⑥少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脈不至

者灸少陰七壯

陰寒吐利法當厥逆者以無陽也手足不逆冷則陽自若而脾胃和故以熱爲反發者婉詞也然陽自若則陰爲有制脾胃和則五臟六腑皆得以受其氣而生也灸之者以其有可生之道所以通其經以遂其生也

⑦少陰病惡寒身踈而利手足逆冷者不治

陰盛則陽絕
故曰不治

⑥ 少陰病吐利燥煩四逆者死

陰寒吐利而至於燥煩津液內亡而成
枯竭也加之四肢厥逆脾土敗絕也

⑦ 少陰病下利止而頭眩時時自冒者死

頭眩俗謂昏暈是也諸陽在頭然則下利止而頭
眩者津液內亡而陰已虛竭陽無依附浮越於外
而神氣散亂故
時時自冒也

⑧ 少陰病四逆惡寒而身踰脈不至不煩而躁者死

四肢溫和爲順故以厥冷爲逆不順也踰不伸也
陰主屈故也諸證具見而脈又不至則陽已先絕
可知矣不煩而躁
孤陰亦欲自盡也

⑨ 少陰病六七日息高者死



息呼吸氣也歎聲曰息言歎息之聲高而散漫無接續生息之意蓋陽氣欲絕故其聲息如此

⑤少陰病脈微沈細但欲臥汗出不煩自欲吐至五

六日自利復煩躁不得臥寐者死

脈微沈細但欲臥少陰之本病也汗出而不作煩熱無陽也欲吐經中之邪不退也自利藏病進也更復煩燥不得臥寐者陽欲絕而擾亂不寧也

⑥少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以

二三日無裏證故微發汗也

麻黃附子甘草湯方

麻黃

二兩

甘草

二兩

附子

一枚炮
去皮

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥

煮取三升去滓溫服一升日三服

無裏證謂不吐利燥煩嘔渴也以無裏證而表又不見故用附子以佐麻黃雖曰微發汗而用甘草以易細辛蓋亦和解之意也

⑤少陰病得之二三日以上心中煩不得臥黃連阿

膠湯主之

黃連阿膠湯方

黃連_{四兩} 黃芩_{二兩} 芍藥_{二兩} 雞子黃_{二枚} 阿膠_{三兩}

右五味以水五升先煮三物取二升去滓內膠烱盡

小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服

少陰本欲寐反心中煩不得臥者風邪客於裏熱甚而裏不和也黃連黃芩清膈以除風擁之裏熱

