

歸承氣湯

當歸

大黃 各一兩

芒硝 半兩

甘草 九錢

右剉如麻豆大每服二兩水一大椀入生薑五片棗十枚同煎至半椀去滓熱服若陽狂奔走罵詈不避親疎此陽有餘陰不足大黃芒硝去胃中實當歸補血益陰甘草緩中加生薑棗胃屬土此引至于胃中也經所謂微者逆之甚者從之此之謂也以大利為度微緩以爪蒂散加防風藜蘆吐其病立愈後調法洗心散涼膈散解毒湯等藥調治之

治熱入血室發狂不認人牛黃膏

牛黃 二錢半

朱砂 三錢

腦子 一錢

蔚金 三錢

甘草 一錢

牡丹皮 三錢

心爲細末煉密爲丸如皂子大新水化下

恭熱者局方中雄黃解毒丸 治久熱者局方中妙香丸

治虛勞骨蒸煩熱下血者錢氏地黄丸 治虛熱不能食

者脾虛也宜以厚朴白朮陳皮之類治之 治實熱能食

者胃實也宜以梔子黃芩或三黃丸之類治之蔚金紫胡

亦可 治未熱惡寒而渴白虎湯也 膚如火燎而熱以

手取之不甚熱爲肺熱也目白睛赤煩躁或引飲獨黃芩

一味主之水煎 兩脇下肌熱脉浮弦者柴胡飲子主之

兩脇肋熱或一身盡熱者或日哺臍熱者皆爲血熱也四  
順飲子主之夜發熱主行陰乃血熱也四順桃仁承氣選  
用當視其腹痛血刺痛與有表入裏腹中轉失氣燥結之  
異晝則明了夜則譫語四順飲子證與桃仁承氣相似不  
可不辨也發熱雖無脇熱亦爲柴胡證晝則行陽二十五  
度氣藥也大抵則柴胡夜則行陰二十五度血藥也大抵  
四順飲子

### 內傷論第十五

論曰人之生也由五穀之精化五味之備故能生形經曰  
味歸形若傷于味亦能損形令飲食反過其節腸胃不能

勝氣不及化故傷焉經曰壯火食氣氣食少火壯火散氣  
少火生氣痺論曰飲食自信腸胃乃傷或失四時之調養  
故能爲人之病也經曰氣口緊盛傷于食心胃滿而口無  
味與氣口同氣口者乃脾之外候故脾胃傷則氣口緊盛  
夫傷者有多少有輕重如氣口一盛脉得六至則傷于厥  
陰乃傷之輕也櫛柳丸主之氣口二盛脉得七至則傷于  
少陰乃傷之重也煮黃丸厚朴丸主之氣口三盛脉得八  
至則傷于太陰臍塞悶亂甚則心胃大痛兀兀欲吐得吐  
則已俗呼食迷國是也經曰上部有脉下部無脉其人當  
吐不吐則死宜吐之以瓜蒂散如能則無治也經曰高

者因而越之下者引而竭之是也

檳榔丸

檳榔 二銖半

陳皮 五銖

木香

牽牛 頭末半兩

右爲細末醋糊爲丸如桐子大每

服十五丸至二十丸

米飲下生薑湯亦可

煮黃丸

雄黃 二兩 另研

巴豆 五銖 生用 去皮 研爛入雄黃末

右二味并研入白麵二兩同并和

研勻滴水爲丸如桐

子大每服時先煎漿水冷沸下藥

二十四丸煮三十沸

撈入冷漿水中沉水冷一時下一丸

一日二十 四時也加至微利

為度用浸藥水送下此藥脇下  
痙癖痛如神

瓜蒂散

瓜蒂 三錢

赤小豆 三錢

右為細末溫水調一錢以吐為度如傷之太重備急丸

獨行丸皆急藥也

金露丸 治天行時疾內傷飲食心下痞悶

大黃 二兩

枳實 炒五錢

牽牛 頭末二兩

桔梗 二兩

右同為細末燒飯為丸如桐子大每服二五十丸食後

溫水下如常服十丸二十丸甚妙

治氣不下降食難消

常服進食逐飲

枳實丸

枳實

楚炒五錢

白朮

一兩剉

右爲細末燒飲爲丸如桐子大每服五十丸米飲下  
治飲食不化心腹膨悶櫛柳丸主之如甚則脇肋虛脹  
煮黃丸主之治氣不下降飲食難消金露丸主之

諸癰論第十六

經曰夏傷于暑秋必病癰蓋傷之淺者近而暴發傷之重  
者遠而痼癰痼者久癰也是知夏傷于暑溫熱閉藏而不  
能發泄于外邪氣內行至秋而發爲癰也初不知何經受  
之隨其動而取之有中三陽者有中三陰者大抵經中邪

氣其證各殊同傷寒論之也故內經曰五臟皆有瘧其治各別在太陽經者謂之風瘧治多汗之在陽明經者謂之熱瘧治多下之在少陽經者謂風熱瘧治多和之此三陽受病皆謂之暴瘧發在夏至後處暑前此乃傷之淺者近而暴也在陰經則不分三經總謂之溫瘧當從太陰經論之其病發在處暑後冬至前此乃傷之重者遠而爲瘕瘵者老也故謂之久瘧氣居西方宜毒藥療之瘧之爲病因內積暑熱之氣不能宣泄于外而爲瘧也當盛夏之時能食寒涼之物而助陰氣者後使有暑熱之氣微者自消矣更時復以藥踈利臟腑使邪氣自下內經曰春食涼夏食

寒秋食溫冬食熱是謂春夏養陽秋冬養陰人能于飲食起居之間順四時之氣而行之邪氣何由得生也

治瘧病處暑前頭痛項強脉浮惡寒有汗桂枝羌活湯

桂枝

羌活

防風

甘草

各半兩

右爲麤末每服半兩水一盞半煎至一盞溫服清迎發而服之如吐者加半夏麴等分

治瘧病頭痛項強脉浮惡風無汗者麻黃羌活湯

麻黃

去節

羌活

防風

甘草

各半兩

同前服如吐者加半夏麴等分

治法瘧如前證而夜發者麻黃桂枝湯主之

麻黃

一兩去節

甘草

多二錢

桃仁

三十箇  
去皮尖

黃芩

五錢

桂

二錢

右五味同爲細末依前服桃仁味苦甘辛肝者血之海  
血聚則肝氣燥經所謂肝苦惡食甘以緩之故桃仁  
散血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪此  
湯發散血中風寒之劑

治瘧病身熱目痛熱多寒少脉長睡卧不安先以大柴胡  
湯下之微利爲度如下過外微邪未盡者宜服白芷湯  
其邪

白芷

一兩

知母

一兩七錢

石膏

四兩

右爲麤末同前服

治瘧無他證隔日發先寒後熱寒少熱多宜桂枝石膏湯

桂枝五錢

石膏二兩五錢

知母二兩五錢

黃芩二兩

石爲粗末分作三服每服水一盞同前煎服間日者邪氣所舍深也

治瘧寒熱大作不論先後此太陽陽明合病也謂之太爭寒作則必戰動經曰熱勝而動也發熱則必汗泄經曰汗出不愈知爲熱也陽盛陰虛之證當內實外虛不治必傳入陰經也桂枝芍藥湯主之

桂枝三錢

黃耆二兩

知母二兩

石膏二兩

芍藥二兩

右爲粗末每服五七錢至半兩水煎如前藥服之寒熱轉大者知太陽陽明少陽三陽合病也宜用桂枝黃芩湯和之

柴胡二兩二錢

黃芩四錢半

人參四錢半

半夏四錢

甘草四錢半

石膏五錢

知母五錢

桂枝二錢

右爲粗末依前服之服藥已如外邪已罷內邪未已再詮下藥從卯至午時發者宜以大柴胡湯下之從午至酉時發者知其邪氣在血也宜以桃仁承氣湯主之前項下藥微利爲便以小柴胡湯微其微邪之氣立止

之後及處暑前發瘧漸瘦不能食者謂之瘵瘧此邪氣深遠而中陰經爲久瘵也

治久瘵不能飲食胸中鬱鬱如吐欲吐不能吐者宜吐則已當以藜蘆雄黃散吐之

藜蘆散

大藜蘆末

半錢

溫蘆水調下以吐爲度

雄黃散

雄黃

瓜蒂

赤小豆

各二錢

右爲細末每服半錢溫水調下以吐爲度

治秋深久瘵胸中無物又無痰癖腹高而食少俗謂瘵氣

入腹宜蒼朮湯主之

蒼朮

四兩

草烏頭

二錢

杏仁

三十個

右爲粗末都作一服水三升煎至一半均作三服一日服盡迎發而服局方中七宣丸治瘧之聖藥也局方中神効飲子乃瘧疾聖藥也又名交結飲子

### 吐論第十七

論曰吐有三氣積寒也皆從三焦論之上焦在胃口上通於天氣主內而不出中焦在中脘上通天氣下通地氣主腐熟水穀下焦在臍下下通地氣主出而不納是故上焦吐者皆從于氣氣者天之陽也其脉浮而洪其證食已暴

吐瀉欲飲水大便燥結氣上衝而膏發痛其治當降氣和中  
吐焦吐者皆從于積有陰有陽食與氣相假爲積而痛  
其脉浮而弱其證或先痛而後吐或先吐而後痛治法當  
以吐藥去其積檳榔木香行其氣下焦吐者皆從于塞地  
道也其脉沉而遲其證朝食暮吐暮食朝吐小便清利大  
便秘而不通治法當以毒藥通其閉塞溫其寒氣大便秘  
通作以下焦藥和之不令大便秘結而自愈也

治上焦氣熱上衝食已暴吐脉浮而洪宜先和中桔梗湯

桔梗

一兩半

半夏麴

二兩

陳皮

二兩

枳實

二兩

白茯苓

去皮 一兩

白朮

二兩半

厚朴

一兩 薑製炒香

右咬咀每服一兩水一盞煎至七分取清溫調木香散  
二錢隔夜空腹食前服之三服之後氣漸下吐漸止然  
後去木香散加芍藥二兩黃耆一兩半每料中即筭加  
上件分兩依前服之病愈則已如大便燥結食不盡下  
以大承氣湯去硝微下之少利爲度再服前藥補之如  
大便復結又依前再微下

木香散

木香

檳榔

各等分

右爲細末前藥調服

治暴吐者上焦氣熱所衝也經曰諸嘔吐酸暴下下

屬于火脉洪而浮者荆黃湯主之

荊芥穗 一兩

人參 五錢

甘草 二錢半

大黃 三錢

右為麤末都作一服水二盞煎至一盞去滓調檳榔散

二錢空心服

檳榔散

檳榔 二錢

木香 一錢半

輕粉 少許

右為細末用前藥調服如為丸亦可用水浸蒸餅為丸如小豆大每服二十丸食後

治上焦吐頭發痛有汗脉弦鎮青丸主之

柴胡 二兩 去苗

黃芩 七錢半

甘草 半兩

半夏 湯洗 半兩