

# 中國科學技術典籍通彙

任繼愈 主編  
河南教育出版社



中國科學院  
中國科學院  
中國科學院

# 中國科學技術典籍通彙

醫學卷 六(下)

中國科學技術典籍通彙

余瀛鰲 主編  
河南教育出版社

(豫)新登字03號

中國科學技術典籍通彙

醫學卷(一——七冊)

出版 河南教育出版社  
總發行 河南教育出版社  
印刷 中國·鄭州  
中國·上海  
中國·上海  
版次 一九九四年六月第一版  
一九九四年六月第一次印刷  
開本 十六分之一 (787×1092mm)  
印張 四九〇·七五  
插頁 二九

ISBN 7-5347-1360-9/Z·38

中國科學技術典籍通彙  
醫學卷

主編 余瀛鰲

副主編 王樹芬 嚴康維

編委（按姓氏筆劃爲序）

王樹芬 李洪曉 余瀛鰲 陳湘萍 萬芳  
嚴康維

中國科學技術典籍通彙 醫學卷 (第六分册下)

目 錄

本草綱目 (明·李時珍)..... 六一九九一

欽定四庫全書

子部  
本草綱目卷十七上

拜校官太醫院醫官臣姜晟  
編修臣倉聖脈覆勛

總校官庶吉士臣何思鈞  
校對官主事臣陳文樞  
謄錄監生臣莊承簪

本草綱目

欽定四庫全書

本草綱目卷十七

草之六

毒草類四十七種

大黃

本經

商陸

本經

狼毒

本經

防葵

本經

狼牙

本經

欽定四庫全書

本草綱目  
卷十七目錄

蘭茹

本經

大戟

本經

澤漆

本經

甘遂

本經

續隨子

開寶

葇砦

本經 即  
天仙子

雲實

本經

蓖麻

唐本博  
張迎附

常山蜀漆

本經 吐莖山 土紅山附

菝蘆

本經 山慈石 參 果根 馬腸根附

木菝蘆

拾遺

附子

本經

已上卷十七上

天雄

本經

側子

別錄

漏籃子

綱目

欽定四庫全書

本草綱目 卷十七目錄

烏頭

本經

白附子

別錄

虎掌天南星

本經

由跋

本經

茺蔚

開寶 附 蔞草 附 著

半夏

本經

蚤休

本經

鬼臼

本經

射干

本經

鳶尾

本經

玉簪

綱目

鳳仙

綱目

坐墊草

圖經 押 不蘆附

曼陀羅花

綱目

羊躑躅

本經 山躑躅 羊不啻草附

芫花

本經

欽定四庫全書

本草綱目 卷十七目錄

蕘花

本經

醉魚草

綱目

莽草

本經

茵損

本經

石龍芮

本經 胡椒 附

毛茛

拾遺 附 蔞草 附

牛扁

本經 附 建草 附 瓦

葶麻

圖經



格注草 唐本

海芋 綱目 山根附 蓮

鈎吻 本經

已上卷十七下

右附方舊一百三十四新四百九十五

欽定四庫全書

本草綱目 卷十七目錄

四

本草綱目卷十七目錄

本草綱目

欽定四庫全書

本草綱目卷十七上

明 李時珍 撰

草之六 毒草類一 十七種

大黃 本經 下品

釋名黃良

經將軍之 火參 普膚 如其色也 將軍之號

當取其致快也 果曰推陳致新如哉 定禍亂以致太平所以有將軍之號

集解

別錄曰大黃生河西山谷及隴西二月八月米根火乾 普曰生蜀郡北郡或隴西二月卷生黃

欽定四庫全書

本草綱目 卷十七上

赤其葉四四相當莖高三尺許三月花黃五月實黑  
八月采根根有黃汁切片陰乾弘景曰今采益州北  
部汶山及西山者雖非河西隴西好者猶作紫地錦  
色味甚苦澹色至濃黑 西川陰乾者勝北部日乾亦  
有大乾者皮小焦不如西耐蛀堪久此藥至動利粗  
者便不中服 恭曰紫子莖並似羊蹄但莖高六七尺  
而脆味酸堪生吹葉粗長而厚根紅者亦似宿羊蹄  
大者乃如盤長二尺其性濕潤而易蛀壞火乾乃佳  
作時燒石使熱橫寸截若石上博之一日微燥以繩  
穿眼乾今出宕州涼州西羌蜀地者皆佳幽并以北  
者新細氣力不及蜀中者陶言蜀地不及隴西其矣  
藏器曰凡用當分別之若取和厚深沈能攻病者可  
用蜀中似牛舌片緊硬者若取瀉散快推陳去熱  
者當取河西錦文者頌曰今蜀川河東陝西州郡皆  
有之以蜀川錦文者佳其次秦隴來者謂之土毒大  
黃正月內生青葉似蔥麻大者如扇根如芋大者如

六一九九三

益長一二尺其細根如牛蒡小者亦如芋四月開黃  
花亦有青紅俗稱蕎麥花者莖青紫色形如竹二八月  
米根去黑皮切作橫片火乾蜀大黃乃作緊片如牛  
舌形謂之牛舌大黃二者功用相等江淮出者曰土  
大黃二月開花結細實時珍曰宋祁益州方物圖言  
蜀大山中多有之赤莖大葉根巨若益藥市以大者  
為枕紫地錦文也今人以莊浪出者為  
最莊浪即古涇原隴西地與別錄相合

**正誤** 頃曰鼎州出一種羊蹄大黃治疥瘡甚效初生  
條出穗五七莖相合花葉同色結實如蕎麥而輕小  
五月熟即黃色呼為金蕎麥三月采苗五月采實陰  
乾九月采根破之亦有錦文亦呼為土大黃時珍曰  
蘇說即老羊蹄根也因其似大黃故謂之羊蹄大黃  
實非一類又一種酸模乃山大黃也狀似羊蹄而  
生山上所謂土大黃或指此非羊蹄也俱見本條

欽定四庫全書

本草綱目  
卷十七上

根修治

雷曰凡使細切以文如水旋斑緊重者到片  
蒸之從已至未晒乾又酒洗水蒸之從未至

亥如此凡七次晒乾却酒浸蜜水再蒸一伏時其大  
黃必如烏青樣乃晒乾用鐵器曰凡用有蒸有生有  
熟不得一藥用之承曰大黃米時皆以火石煨  
乾貨賣更無生者用之亦不須更多炮炙蒸煮

氣味苦寒無毒

別錄曰大寒善曰神農雷公苦有毒  
扁鵲苦無毒李當之大寒元素曰味

苦氣寒氣味俱厚沈而降陰也用之須酒浸煨熟者  
寒因熟用酒浸入大陽經酒洗入陽明經餘經不用  
酒果曰大黃苦峻下走用之于下必生用若邪氣在  
上非酒不至必用酒浸引上至高之分驅熱而下如  
物在高巔必射以取之也若用生者則遺至高之邪  
熱是以愈後或目赤或喉痺或頭腫或腸上熱疾生  
也時珍曰凡病在氣分及胃寒血虛并姪奴產後並  
勿輕用其性苦寒能傷元氣耗陰血故也之才曰黃

岑為之使無所畏權  
曰忌冷水惡乾漆 主治下瘀血血閉寒熱破癥瘕  
積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中  
化食安和五臟經本平胃下氣除痰實腸間結熱心腹  
脹滿女子寒血閉脹小腹痛諸老血留結別錄通女子

經候利水腫利大小腸貼熱腫毒小兒寒熱時疾煩  
熱蝕膿甄權通宣一切氣調血脈利關節泄壅滯水氣  
溫瘴熱瘧大明瀉諸實熱不通除下焦濕熱消宿食瀉  
心下痞滿元下痢赤白裏急腹痛小便淋瀝實熱燥

欽定四庫全書

本草綱目  
卷十七上

結潮熱譫語黃疸諸火瘡

時珍

發明 之才曰得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚志怒  
心下悸氣得消石紫石英桃仁療女子血閉宗  
真曰張仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯用大黃  
黃芩黃連或曰心氣既不足而不用補心湯更用瀉

心何也答曰若心氣獨不足則當不吐衄也此乃邪  
熱因不足而容之故今吐衄以苦泄其熱以苦補其  
心益一舉而兩得之有是證者用之無不效惟在量  
其虛實而已震亨曰大黃苦寒善泄仲景用之瀉心  
湯者正因少陰經不足本經之陽亢甚無輔以致陰  
血妄行飛越故用大黃瀉去亢甚之火使之平和則  
血歸經而自安夫心之陰氣不足非一日矣肺與肝  
俱各受火而病作故黃芩救肺黃連救肝肺者陰之  
主肝者心之母血之合也肝肺之火既退則陰血復  
其舊矣寇氏不明說而云邪熱客之何以明仲景之

欽定四庫全書

本草綱目  
卷十七上

四

意而開悟後人也時珍曰大黃乃足太陰手足陽明  
手足厥陰五經血分之藥凡病在五經血分者宜用  
之若在氣分用之是謂誅伐無過矣瀉心湯治心氣  
不足吐血衄血者乃真心之氣不足而手足厥陰心包  
絡足厥陰肝足太陰脾足陽明胃之邪火有餘也雖  
曰瀉心實瀉四經血中之伏火也又仲景治心下痞  
滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯主之此亦瀉脾胃  
之濕熱非瀉心也病發于陰而反下之則作痞滿乃  
寒傷營血邪氣乘虛結于上焦胃之上脘在于心故  
曰瀉心實瀉脾也素問云太陰所致為痞滿又云濁  
氣在上則生脹脹是矣病發於陽而反下之則成結  
胸乃熱邪陷入血分亦在上脘分野仲景大陷胸湯  
九皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪而降其濁氣也若  
結胸在氣分則只用小陷胸湯痞滿在氣分則用半  
夏瀉心湯矣成無已註釋傷寒論亦不知分別此義  
成無已曰熱淫所勝以苦泄之大黃之苦以瀉滌痰

熱下燥結而泄胃強頌曰本草稱大黃推陳致新其  
效最神故古方下積滯多用之張仲景治傷寒用處  
尤多古人用毒藥攻病必隨人之虛實寒熱而處置  
非一切輕用也梁武帝因發熱欲服大黃姚僧坦曰  
大黃乃是快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委  
頓梁元帝常有腹痛諸醫咸謂宜用平藥可漸宜  
通僧坦曰朕洪而實此有宿妨非用大黃無瘥理帝  
從之遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻衆病其偶  
中便謂此方神奇其差誤則  
不言用藥之失可不成哉

**附方** 舊十四新 **吐血衄血** 治心氣不足吐血衄血者  
三十七 **吐血刺痛** 瀉心湯主之大黃二兩黃  
連黃芩各一兩水三升煮一升 **吐血刺痛** 川大黃一  
兩服取利 張仲景金匱玉函 **傷寒痞滿** 病發於  
煎三五沸無時服 簡要濟東方 **傷寒痞滿** 陰而反

本草綱目

欽定四庫全書

本草綱目  
卷十七上

五

下之心下滿而不痛按之濡此為痞也大黃黃連瀉  
心湯主之大黃二兩黃連一兩以麻沸湯二升漬之  
須臾絞汁分作二次 **熱病譫狂** 川大黃五兩炒微  
溫服 仲景傷寒論 **傷寒發黃** 方同上 氣壯者大  
升煎如膏每服半匙 **傷寒發黃** 方同上 氣壯者大  
冷水下 聖惠方 **傷寒發黃** 方同上 氣壯者大  
宿平且煎汁一升入芒消一兩 **傷寒發黃** 方同上 氣壯者大  
緩服須臾當利下 傷寒類要 **腰脚風氣** 作病大黃  
基子和少酥炒乾勿令焦搖節每用二錢空心以水  
三大合入薑三片煎十餘沸取湯調服當下冷腹惡  
物即痛止 崔 **一切壅滯** 經治痞悶消食化積瘵瘵  
元亮海上方 **一切壅滯** 經治痞悶消食化積瘵瘵  
用大黃四兩牽牛子半炒生四兩為末煉蜜丸如梧  
子大每服十九白湯下並不損人如要微利加一二  
十九 衛生寶鑑用皂莢熬膏和丸名墜痰丸 **痰為**  
又名全真丸金宣宗服之有驗賜名保安丸 **痰為**

**百病** 滾痰丸治痰為百病惟水瀉胎前產後不可服  
用大黃酒浸蒸熟切晒八兩生黃芩八兩沈香  
半兩青礞石二兩以焰消二兩同入砂罐固濟煨紅  
研末二兩右各取末以水和丸梧子大常服一二十  
丸小病五六十九丸緩病七八十九丸急病一百二十九  
溫水吞下即卧勿動候藥運上焦痰滯次日先下槽  
粕次下痰涎未下再服王隱君歲合 **男女諸病** 無極  
四十餘斤愈疾數萬也 養生主論 **男女諸病** 無極  
婦人經血不道赤白帶下崩漏不止腸風下血五淋  
產後積血癥瘕腹痛男子五勞七傷小兒骨蒸潮熱  
等證其效甚速宜六癸日合之用錦紋大黃一斤分  
作四分一分用童尿一盞食鹽二錢浸一日切晒一  
分用醇酒一盞浸一日切晒再以巴豆仁三十五粒  
同炒豆黃去豆不用一分用紅花四兩泡水一盞浸  
一日切晒一分用當歸四兩入淡醋一盞同浸一日  
去歸切晒為末煉蜜丸梧子大每服五十九空溫

六一九九五



酒下取下惡物為驗未下再服此武心腹諸疾三物  
當高士孫碧雲方也 醫林集要 心腹諸疾 三物  
九治心腹諸疾卒暴百病用大黃巴豆乾薑各一兩

搗篩蜜和搗一千杵九小豆大每服三九凡中客卒  
忤心腹脹滿痛如錐刀氣急口噤停尸卒死者以暖  
水或酒服之或灌之未和更服三九腹中鳴轉當吐

下便愈若口已噤者折齒灌之入喉即瘞此乃仲腹  
景方可空裝秀改為散用不及九也 圖經本草 腹

中痞塊 大黃十兩為散醋三升蜜兩匙和煎九梧子  
大每服三十九生薑湯下吐利為度 外臺

秘腹腸積塊 風化石灰末半斤瓦器炒極熱稍冷入  
要 大黃末一兩炒熱入桂心末半兩兩膠炒

下未醋攪成膏攤布貼之 又方大黃二兩朴消一  
兩為末以大蒜同搗膏和貼之或加阿魏一兩尤妙

丹溪 久患積聚 二便不利上搶心腹脹滿宮食大  
心法 黃白芍各二兩為末水丸梧子大

每湯下四十九日三 脾癖疳積 不拘大人小兒錦紋  
以知為度 千金方 大黃三兩為末醋一

蓋沙鍋內文武火熬成膏傾瓦上日晒夜露三日再  
研用船上硫黃一兩形如琥珀者官粉一兩同研勻

十歲以下小兒半錢大人一錢半米飲下忌一切生  
冷魚肉只食白粥半月如一服不愈半月之後再服

若不忌口不如勿 小兒無辜 疳積或頭乾黃聾  
服 聖濟總錄 或作疳疔疔瘡諸狀多者

大黃煎主之大黃九兩錦紋新實者若微朽即不中  
用削去皮搗篩為散以好米醋三升和置瓦盆中於

大鑊內浮湯上炭火慢煮候至成膏可九乃貯器中  
三歲兒一服七九梧子大日再服以下出青赤腹為

皮若不下或下少稍稍加九若下多又須減之病重  
者七八劑方盡根大人亦可下之此藥惟下宿腹不

今兒利也須禁食毒物乳母亦禁 小兒諸熱 大黃煨  
之一加木香一兩半 雀知梯方 熱黃茶

各一兩為末煉蜜九麻子大每服五九至十骨蒸積  
九瀉湯下加黃連名三黃九 錢氏小兒方 煎取四

熱 漸黃瘦大黃四分以童子小便五六合煎取四  
熱 合去滓空腹分為二服如人行五里再服 廣利

方 赤白濁淋 好大黃為末每服六分以雞子一個破  
頂入藥攪勻蒸熟空心食之不過三服

愈 簡相火秘結 大黃末一兩牽牛頭末半兩每服  
便方 三錢有厥冷者酒服無厥冷五心

煩蜜湯服 劉諸痢初起 大黃煨熟當歸各二三錢  
河間保命集 壯人各一兩水煎服取利

或加檳榔 熱痢裏急 大黃一兩浸酒半日 忽喘悶絕  
集簡方 煎服取利 集簡方

不能語言涎流吐逆 牙齦動搖氣出轉大絕而復蘇  
名傷寒併熱霍亂大黃人參各半兩水二盞煎一盞

熱服可安 食已即吐 胸中有火也大黃一兩甘草  
危氏得效方 二錢半水一升煮半升溫服

仲景金 婦人血癖 作痛大黃三兩酒二升煮  
匱玉函方 十沸頓服取利 千金真 產後

血塊 大黃末一兩頭醋半升熬膏九梧子大每  
服五九溫酒化下良久當下 千金方 乾血

氣痛 大黃酒浸晒乾四兩為末好醋一升熬成  
膏九莖子大卧時酒化一丸服大便利一二行

紅漏自下乃調經仙藥也 婦人嫁痛 小戶腫痛也大  
或如香附 董氏集驗方 黃一兩酒一升

煮一沸頓服 男子偏墜 作痛大黃末和醋塗 濕熱眩  
千金方 之乾則易 梅師方

運 不可當者酒炒大黃為末茶清服 小兒腦熱常欲  
二錢急則治其標也 丹溪纂要

大黃一分水三合浸一夜一歲兒服半合 暴赤目痛  
餘者塗頂上乾即再上 姚和衆至寶方

四物湯加大黃酒煎 胃火牙痛 口含水一口以紙  
服之 傳信通用方 搽蘇大黃末隨左右

齒鼻立止 風熱牙痛 紫金散治風熱積壅一切牙痛去口氣大有奇效好大黃

瓶內燒存性為末早晚搽牙救去都下一家尊貨此藥兩宮常以數千贖之其門如市也 千金家藏方

風蟲牙痛 銀常出血漸至崩落口臭極故大黃米泔浸軟生地黃各旋切一片合定貼上一夜

即愈未愈再貼忌說話 口瘡糜爛 大黃粘麩等分為聖引入風 本事方 未擦之吐涎 聖

患鼻中生瘡 主大黃杏仁搗勻猪脂和塗 又方生大黃黃連各一錢麝香少許為末生油

調搽 仙茅毒發 古服出口方 傷損瘀血 三因方難見仙茅下 鳴散治從

高墜下木石壓傷及一切傷損瘀積病不可忍並以此藥推陳致新大黃酒蒸一兩杏仁去皮三七粒

細研酒一盃煎六分雞鳴時服至晚取下瘀血即愈和濟方治跌壓瘀血在內服滿大黃當歸等分炒

欽定四庫全書

本草綱目

研每服四錢溫酒 打撲傷痕 瘀血凝注或作潮熱者服取下惡物愈 大黃末薑汁調塗一夜

黑者紫二夜紫者白 杖瘡腫痛 大黃末醋調塗之童也 源湖泉簡方 尿亦可調 醫方摘

金瘡煩痛 大便不利大黃黃芩等分為末蜜九凍先食水下十九日三服 千金方 凍

瘡破爛 大黃末水調塗 湯火傷灼 莊浪大黃生研蜜之 衛生寶鑑 調塗之不惟止痛

又且滅殺此乃金山寺神 灸瘡飛蝶 因父灸訖火痴人所傳方 洪邁夷堅志 便退瘡內鮮肉

片飛如蝶形而去痛不可忍是火毒也大黃朴 蠟 消各半兩為末水服取利即愈 張果醫說

咬瘡 大黃末塗 火丹赤腫 過身者大黃磨水腫毒初之 醫說 火丹赤腫 過身者大黃磨水腫毒初

起 大黃五倍子黃蘗等分為末新 癰腫焮熱 作痛大 汲水調塗日四五次 簡便方 癰腫焮熱 作痛大

調塗之藥即易不過數易即 乳癰腫毒 金黃散用川 運甚驗神方也 肘后方 大黃粉草各

一兩為末好酒熬成膏收之以桐攤貼瘡上仰卧仍 先以溫酒服一大匙明日取下惡物 婦人經驗方

大風癩瘡 大黃煨一兩皂莢刺一兩為末每服方寸 下再服即取下如亂髮之蟲取盡乃服雄 黃花蛇藥名通天再造散 十便良方

葉氣味酸寒無毒主治置薦下辟虱蟲 相感 志

商陸 本經 下品 釋名遠蕩 音逐 當陸 開章柳 國白昌 開馬尾 廣夜呼

本經時珍曰此物能逐蕩水氣故曰遠蕩訛為商陸 又訛為當陸北音訛為章柳或云枝枝相值葉葉相

當故曰當陸或云 多當陸路而生也 集解 別錄曰商陸生咸陽川谷如人形者有神恭曰

赤白花者根白二月八月采根日乾頃曰俗名章柳 毒保界曰所在有之葉大如牛舌而厚脆赤花者根

欽定四庫全書

本草綱目

根多生於人家園圃中春生苗高三四尺青葉如牛 古而長莖青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朶根如蘿 筍而長八九月采之爾雅謂之蓮蕩廣雅謂之馬尾

易經謂之菟陸教曰一種亦昌苗葉絕相類不可服 之有傷筋骨消腎之毒惟花白年多者仙人采之作 補可下酒也時珍曰商陸昔人亦種之為蔬取白根

及紫色者擊破作唾殺之亦可種子根苗莖並可洗 蒸食或用灰汁煮過亦良服丹砂乳石人食之尤利 其赤與黃色者有毒不可食按周憲王救荒本草云

章柳幹粗似雞冠花幹微有線揚色微紫赤極易生

植

根修治

數曰取花白者根銅刀刮去皮薄切以東流  
水浸兩宿漉出架甑蒸以黑豆葉一重商陸  
一重如此蒸之從午至亥取出  
豆葉暴乾剉用無豆葉以豆代之

氣味辛平有毒

別錄曰酸權曰甘有大毒忌犬肉大  
能伏砒砂砒石雄黃拔錫粒曰赤者但可貼腫服之  
傷人痢血不已殺人令人見鬼神張仲景曰商陸以  
水服殺人果曰商陸有毒陽中之陰其  
味酸辛其形類人其用藥水其效如神 主治水腫疝

瘰癧除癰腫殺鬼精物

經本  
療胸中邪氣水腫痿痺

欽定四庫全書

本草綱目  
卷十七上

薄切醋炒塗喉外良

甄權  
通大小腸瀉蠱毒墮胎熒腫

毒傳惡瘡

明大

發明

弘景曰方家不甚用惟療水腫切生根雜鯉魚  
煮作湯服道家乃散用之及煎釀服皆能去尸

蟲見鬼神其實子亦入神藥花名芎花尤良頃曰古  
方術家多用之亦可單服五月五日采根竹筴盛掛

屋東北角陰乾百日搗篩并華水調服云神仙所秘  
法也時珍曰商陸苦寒沈也降也陰也其性下行專

於行水與大戟甘遂益異性而同功胃氣虛弱者不  
可用方家治腫滿小便不利者以赤根搗爛入射香

三分貼于臍心以帛束之得小便利即腫消又治濕  
水以指畫肉上隨散不成文者用白商陸香附子炒

乾出火毒以酒浸一夜日乾為末每服三錢米飲下  
或以大蒜同商陸煮汁服亦可其莖葉作蔬食亦治

腫疾嘉謨曰古讚云其味酸辛其形類  
人藥水貼腫其效如神斯言盡之矣

附方

新舊九  
濕氣脚軟 梓柳根切小豆大煮熟更以綠  
豆同煮為飯每日食之以瘰為

度最效

斗門方 水氣腫滿 外臺秘要用白商陸根去皮切  
升更以粒米一大盂同煮成粥每日空心服之取微  
利不得雜食 千金龍用白商陸六兩取汁半合和  
酒半升看人與服當利下水取效 梅師方用白商  
陸一升羊內六兩水一斗煮取六升去滓和葱豉作  
臚食 腹中暴癢 有物如石痛刺啼呼不治百日死多  
之 安樂勿覆冷即易晝夜 瘰癧如石 在腸下堅硬生商  
勿息 孫真人千金方 瘰癧如石 陸根汁一升杏仁

一兩沒去皮搗如泥以商陸汁絞吉泥大煎如錫每

服藥許空腹熱酒服以利下惡物為度 聖惠方

欽定四庫全書

本草綱目  
卷十七上

產後腹大

聖滿喘不能卧上 聖散用樟柳根三兩大  
戰一兩半甘遂炒一兩為末每服二三錢  
熱湯調下大便宜利為度此乃 五尸注痛 腹痛脹急  
主水聖藥也 潔古保命集 上攻心胸旁攻兩脇痛或硬塊涌起用商  
陸根煎以食盛更五煎之取效 肘後方 小兒痘毒  
小兒將痘發熱失表急作腹痛及膨脹弩氣乾霍亂  
由毒氣與胃氣相搏欲出不得出也以商陸根和葱  
白搗傳臍上斑 疔疔出 耳卒熱腫 生商陸削尖納入

方免無虞

摘玄方 喉卒攻痛 商陸切根炙熱隔布熨之 瘰癧喉痺 攻痛  
冷即易立愈 圖經本草 瘰癧喉痺 生商  
陸根搗作餅置臍上以艾炷于一切腫毒 商陸根和  
上炙三四壯良 外臺秘要

傳日再易之

石癰如石 堅硬不作膿者生商陸根  
搗搽之燥即易取軟為度



亦治濕漏諸病 瘡傷水毒 高陸根搗末布裏乾之  
張大仲方 瘡傷水毒 冷即易之 千金方

日暮水服方寸七乃卧思念所故事即於眠中醒悟

也 蘇頌

狼毒 本經 下品

釋名 時珍曰觀其名知其毒矣

集解 別錄曰狼毒生秦亭山谷及奉高二月八月采  
根陰乾陳而沈水者良弘景曰宕昌亦出之乃

言止有軟故地生蛇食其根故為難得亦用大山  
者今用出漢中及建平云與防葵同根但置水中沈

者是狼毒浮者是防葵俗用亦稀為探服內要藥耳  
春曰今出秦州成州秦亭原在二州之界秦隴地寒

元無蛇蛇此物與防葵都不同類生處又別太山漢  
中亦不聞有陶說謬矣志曰狼毒葉似商陸及大黃

莖葉上有毛根皮黃肉白以實重者為良輕者為力  
劣秦亭在隴西奉高是太山下隴陶云沈者是狼毒

浮者是防葵此不足為信假使防葵秋冬采者堅實  
得水皆沈狼毒春夏采者輕虛得水皆浮且二物全

別不可比類此與麻黃橘皮半夏枳實具葉黃為六  
陳也保昇曰根似玄參惟虛浮者為方也頌曰今隴

西州郡及遼石州亦有之狀如馬志所說時珍曰狼  
毒出秦晉地今人往往以草蘭茹為之誤矣見蘭茹

也 下

根氣味辛平有大毒 大明曰苦辛有毒之才曰大豆  
為之使宜醋炒慈來白蘆根古

本草綱目

斯蜜陀 主治欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣惡瘡  
僧也

鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸 除胸下積僻 別錄

治痰飲癥瘕亦殺鼠 明合野葛納耳中治聾 北朴

附方 舊四新六 心腹連痛 作服用狼毒二兩附子半兩搗  
篩蜜九梧子大一服一九二

日二九三日止三九止又從一九起 九種心痛 一蟲二  
至三九止以蠶為度 肘後方

四博五食六飲七冷八熱九氣也又治連年積冷流  
注心胸及落馬墮車瘀血中惡等證九痛九用狼毒

炙香共朱英湯泡巴豆去心炒取霜乾薑炮人參各  
一兩附子泡去皮三兩為末煉蜜九梧子大毒空心

溫酒下一九 腹中冷痛 水投險結心下停痰兩脇痞  
和劑局方 滿按之鳴轉逆害飲食用狼

毒三兩附子一兩旋覆花三兩搗末蜜九梧子 陰疝  
大母服三九食前白湯下日三服 肘後方

欲死 九縮入腹急痛欲死狼毒四兩防風二兩附子  
三兩燒以蜜九梧子大母服三九日夜三度白

湯下 兩脇氣結 方同腹中 一切蟲病 川狼毒片末  
肘後方 冷痛方 一切蟲病 每服一錢用

錫一皂子大沙糖少許以水化開卧時 乾濕蟲疥 狼  
空腹服之次早即下蟲也 集效方

不拘多少搗爛以猪油馬油調搽患處方 陸勿以被  
家頭惡藥氣傷面此維揚潘氏所傳方 蘭氏經驗

方 積年疥癩 狼毒一兩一半生研一半炒研輕粉三  
合水銀三錢以茶末少許於瓦器內以

津液擦化為末同以清油浸藥高一寸三日待藥乾  
油清遇夜不見燈火煎油塗瘡上仍以口鼻於藥蓋

上吸氣取效 積年乾癬 生痂搽之黃水出每塗陰雨  
水顯方 即痒用狼毒末塗之 聖惠

本草綱目

方惡疾風瘡狼毒秦朮等分為末每服方寸七溫酒下日一二服千金方

防葵本經上品

釋名房苑別錄梨蓋本經利茹吳普又名壽離方蓋農果曰根葉似葵花子根香

味似防風故名防葵

集解別錄曰防葵生臨淄川谷及嵩高太山少室三月三日采根暴乾普曰莖葉如葵上黑黃二月

生根根大如桔梗根中紅白六月花白七月八月實白三月采根恭曰此物亦稀有襄陽望楚山東及與

州西方有之與州者乃勝南者為陝蜀地也頌曰今惟出襄陽地他郡不聞也其葉似葵每莖三葉一本

十數莖中發一幹其端開花如蕙花景天輩而色白六月開花即結實根似防風香味亦如之依時采者

欽定四庫全書

乃沈水今乃用枯朽狼毒膏之極為謬矣時珍曰唐時隴西成州貢之蘇頌所說詳明可據

正誤弘景曰防葵今用建平者本與狼毒同根猶如三建其形亦相似但置水中不沈爾而狼毒陳

久者亦不能沈矣教曰凡使防葵勿誤用狼毒緣真相似而驗之有異效又不能切須審之恐誤人疾其

防葵在葵州沙上中生米得二十日便生益用之惟輕為妙恭曰狼毒與防葵都不同類生處亦別嚴

曰二物一是一上品善惡不同形質又別陶氏以浮沈為別後人因而用之將以防葵破堅積為下品之物

與狼毒同功今古因循逆無甄別殊為誤

根修治教曰凡使須揀去蟲末用甘草湯浸一宿澆出暴乾用黃精自然汁一二升拌了土器中

妙至汁盪用

氣味辛寒無毒別錄曰甘苦普曰神農辛寒桐君扁鵲無毒岐伯雷公黃帝辛苦無毒惟

曰有小毒主治疝瘕腸洩膀胱熱結溺不下欬逆濕瘡癩

癩驚邪狂走久服堅骨髓益氣輕身本經療五臟虛氣

小腹支膈臚脹口乾除腎邪強志中火者不可服令

人恍惚見鬼別錄久服主邪氣驚狂恭主瘰癧氣塊勝

眈宿水血氣瘤大如盤者悉能消散治鬼瘡百邪鬼

魅精怪通氣甄

發明時珍曰防葵乃神農上品藥黃帝岐伯桐君雷公扁鵲吳普皆言其無毒獨別錄言中火者服

欽定四庫全書

之令人恍惚見鬼陳延之小品方云防葵多服令人

速患恍惚如狂按難經云重陽者狂脫陽者見鬼是

豈上品養性所宜乎是豈寒而無毒者乎不然則本

經及蘇恭所列者是防葵功用而別錄所列者乃似

防葵之狼毒功用非防葵也狼毒之亂防葵其來亦

速矣不可不辨古方治蛇瘕蠶瘕大方中多用防葵

皆是狼毒也

附方舊一腫滿洪大防葵研末溫酒服一刃圭至二

方新二癩狂邪疾上方傷寒動氣傷寒汗下後臍左有動

木香黃芩柴胡各半兩每服半兩水一盞半煎八分溫服雲岐子保命集

狼牙本經下品

釋名牙子經本狼齒別錄狼子別錄犬牙吳普抱牙吳普支蘭李當  
之弘景曰其牙似獸之齒牙故有諸名

集解別錄曰狼牙生淮南川谷及宛旬八月采根暴乾中濕腐爛生衣者殺人普曰紫青根黃赤六七月華八月實黑正月八月采根保昇曰所在有之苗似蛇莓而厚大深綠色根黑若獸之牙三月八月采根日乾須白今江東汴東州郡多有之時珍曰范子計然云出建康及三輔色白者善

根氣味苦寒有毒別錄曰酸普曰神農黃帝苦有毒桐君辛峻伯雷公扁鵲皆無毒之

才曰蕪夷為之使惡地榆泉肌主治邪氣熱氣疥瘡惡瘍瘡痔去白

蟲經本治浮風瘙痒煎汁洗惡瘡甄權殺腹臟一切蟲止

欽定四庫全書

本草綱目 卷十七上 十六

赤白痢煎服大

附方新四金瘡出血狼牙草並葉熟搗貼之肘后方小便弱血金

狼牙草焙乾入蚌粉炒槐花百藥煎等分為末每服三錢米泔空心調服亦治酒病衛生易簡方

白諸蟲狼牙五兩搗末蜜丸麻子大隔宿不食明旦以漿水下一合服盡即瘥外臺秘要蟲

瘡瘻瘻六月以前采狼牙葉以後用根生吹咀以木葉敷之瘡火炮熟於瘡上熨之冷即止楊

行方小兒陰瘡狼牙草濃煎汁婦人陰瘻狼牙二兩洗之千金方婦人陰瘻蛇牀子三

兩煎水熱洗婦人陰蝕瘡爛者狼牙湯用狼牙三兩外臺秘要

浸湯溫洗日四五遍聾耳出汗狼牙研末綿裹日毒張仲景金匱玉函

蛇傷螫獨並狼子根或紫搗爛射工中人有瘡狼根夏取葉搗汁飲四五崔氏方牙冬取

商茹

釋名雖婁別錄掘居音結白者名草商茹時珍曰商茹

根牽引之貌掘居當作拮据詩云予手拮据手口共作之狀也

集解別錄曰商茹生代郡川谷五月采根陰乾黑頭華五月實黑根黃有汁亦黃色三月采葉四月五月采根弘景曰今第一出高麗色黃初斷時汁出凝黑

如漆故云漆頭次出近道名草商茹色白皆燒鐵煎頭今黑以當漆非真也須曰今河陽溫齊州亦有之

欽定四庫全書

本草綱目 卷十七上 十七

二月生苗葉似大戟而花黃色根如蘿蔔皮赤黃肉白初斷時汁出凝黑如漆三月間淺紅花亦淡黃色

不著子陶隱居謂出高麗者此近之又有一種草商茹色白古方兩用之故桃僧坦治癰疽生惡肉有白

藟茹散傳之看肉盡便停止但傳諸膏藥若不生肉又傳黃芪散惡肉仍不盡者可以漆頭赤皮商茹為

散半錢和白糖散三錢和傳之觀此則赤白皆可

用也時珍曰范子計然云商茹出武都黃色者善草

商茹出建康白色今亦處處有之生山原中春初生

商茹二三尺根長大如蘿蔔葉青壯或有歧出者皮

黃赤肉白色破之有黃漿汁莖葉如大戟而葉長微

潤不苦尖折之有白汁抱莖有粗葉相對圓而出尖

葉中出莖莖中分二三小枝二三月間細紫花結實

如豆大一顆三粒相合生青熟黑中有白仁如續隨

子之狀今人往往皆呼其根為狼毒誤矣狼毒葉似商陸大黃草根無漿汁