

新刊
醫
學
集
成

醫學集成卷之八

後學

義烏

傅滋

續註

牙病六十七

丹溪云 牙疼或出血屬熱胃口熱有風有寒有虫有濕

熱矣

按東垣云齒者腎之標骨之餘上觀鍊於脾土

以陽明之脈貫絡也手陽明悲寒飲而喜熱足

陽明喜寒飲而悲熱亡甚則齒動脫作痛不已有

惡寒者有惡熱痛者有惡寒惡熱痛者有惡熱飲

火寒飲多痛者有動搖痛者有齒齲齲則痛者有齒齲

為疳疳所蝕血水而痛者有齒齲齲則痛者有齒齲

風邪但者風而痛者有為虫所蝕其齒缺少而色變

為虫牙痛者有痛而臭不可近者蓋齒為關門腎之

榮骨之餘也賢衰則齒豁精固則齒堅大腸虛則齒

露大腸壅則齒浮熱風則攻於頭面眼目齒齲則齒

脫為痔亦有氣鬱而致者學者誠能求

其本而察之吸疾弗參者未之有也

實熱腫痛調胃藥氣加黃連又方升麻白芷防風剗

芥蒲苛桔梗甘草之類或為未綿又方胡桐決射香

擦之○上引牙痛灸足三里下引牙痛灸三間一名

在大小指次指本牙大痛胡椒華撥升麻寒水石薄

奇○走馬牙疳乾姜棗燒存性枯礬為末付

節療云牙床腫痛動搖或黑爛脫落世人皆作賢虛治

此屬陽明經溫熱蓋齒雖屬腎而主於牙床上下床

屬陽明大腸與胃猶木生於土也腸胃傷於美酒厚

味膏粱目滑之物致溫熱上攻則牙床不清而為腫

為痛或出血或生虫故齒不得安而動搖黑爛脫落

也宜瀉明之濕熱則牙床清寧而齒自安固矣

東垣治一婦人齒痛甚口吸涼風則暫止閉口則復作
乃濕熱也用黃連胡桐淚苦寒消苛荊芥辛涼治濕
熱為主升麻行陽明為使牙者骨之餘以旱蝟骨灰
鋪之為佐射香少許入肉為引用細末擦之痛減半
又以調胃承氣去硝加黃連治其本二三行而止

附一

寒中風邪客腦則腦痛項筋急袒露則痛

虫蝕色變痺痛用蟾酥又方巴豆烟熏之

牙疼生草烏尖芒硝等分為末擦之又方蒲苛荊

芥細辛為末擦漱又方蟾酥塗綿上陰乾如米粒許
寒牙縫。牙齦腫頃針刺出血如血汚難刺者烙鐵
物烙其齒又灸頰車二穴

清胃散

治牙痛

川歸

黃連

二分 生地 三分

升麻

牡丹皮

五分

右剉姜水煎服

卷滑散

麻黃

去根節

卷滑

半錢

防風

半錢

細辛

升麻

訶胡

蒼朮

各五分

白芷

三錢

黃連

骨灰

二錢 桂

為末漱淨擦之

牙疼

土茯苓五分 青蘊三錢 水二碗煎一椀熱

漱又方烏頭熱艾葉二株川椒十粒濃煎漱出爽効

治五散氣

草薺根木鱉子為末搗鼻

風氣走注痛

藥本剪草細辛熱漱

骨槽風

皂角不蛀者去子入杏仁一枚在原子

位燒存性為末入青鹽少許搗之

牙痛

巴豆一粒大蒜一瓣杵爛為丸綿裹一七塞

鼻中左右半時即去之久則藥汁入耳內二次刻

二方

倒摘刺取刀烟綿蘸塞痛處即止

走馬牙疳一時腐爛即死以婦人溺桶中白垢火煨一

錢銅綠三分射香一分半再研付

風神牙

此藥一校去核入巴豆一粒合起炙焦出

火毒研細以紙擦入孔中十數次効又方天仙子燒
灰以竹筒抵牙熏之即死或韭菜子如法熏之皆可
取牙 草烏草撥各一兩半川椒細辛各三兩右末每少許
揩之牙自落

一方 皂角樹上蚍子或白蛆或草烏川椒細辛

白芷散

治大寒犯腦牙疼

草豆蔻 麻黃各半黃芪 升麻各一錢吳茱萸

白芷各四分川歸 熟地各五分藁本三分桂枝二分

羌活八分為末線之

牙痛出血不止 調胃承氣蜜丸服之

腎虛痛

八味丸

降腫虛壅而痛

三因安腎丸

擦牙方

去風生血黑髮漱腎

川歸

川芎

地黃

青鹽

石膏

各一

細辛

半兩

為末擦之

牙縫出血者

槐條嫩葉杵爛付牙關

牙疼

萊豆六粒胡椒七粒韭菜根一錢右同杵

爛用綿裹如豆大咬牙上痛甚者先用燒酒漱後付

○鼻病六十八

丹溪云鼻為肺之竅因心肺上病而不利也有寒有熱

寒邪傷於皮毛，氣不利而壅塞，熱壅清道，寒則表之，熱則分達。面鼻紫黑，面為陽中之陽，鼻居面中，一身之血運到面鼻，皆為至清至精之血。多酒之人，酒氣熏蒸，面鼻得酒血為極熱，血得冷污濁凝結不行，故也。治宜化滯血，生新血，四物加酒炒片芩酒拌紅花、茯苓、陳皮、甘草，生薑煎調，五靈脂末服，氣弱加芪酒制。

酒釀鼻乃血熱入肺

治同前方

或用桐油入黃連以天

吊藤燒油熱付之。又方：硃黃入羅蔔內煨乳香、輕粉，烏頭尖酥調付，或鴨嘴膽熱付，或以一炮為末，蜜丸。

凡彈子大空心膽一丸白湯下

或曰酒查者貴得性所治邪氣也於鼻通

氣出入之道路或曰因飲酒氣血壅滯於鼻通於鼻通

生

經鼻塞肉乃肺氣盛

枯礬末脂綿裹塞鼻數日自

消或瓜蒂末綿裹塞或木通細辛附子蜜丸綿裹納

鼻中或吹風通聖散加三棱山茱萸海藻並酒浸炒

末服之

鼻淵

脂移熱於腦則辛頰鼻淵通聖散一兩兩可黃連各二

錢

雜著云鼻塞不開者鼻或但寒月多塞或畧感風寒便

塞不時舉發者世俗皆以為肺寒而用解表開利辛
溫之藥不効殊不知此是肺經素有火邪鬱甚則喜
得熱而惡先寒故遇寒使塞遇感便發也治法清肺
降火為主而佐以通氣之劑若如常鼻塞不聞香臭
者再審平素只作肺熱治之清金瀉火消痰或丸藥
湯化或末藥輕調緩服久服無不効矣此予所親見
而治驗者其平素原無鼻塞舊證一時偶感風寒而
致鼻塞聲重或流清涕者作風寒治之

鼻尖微赤及生瘡

辛夷研末入腦射少許綿裹納

之或以批把蕪去毛煎湯調消風散

或半耳內后位

之或白鹽常擦之

麝澤通氣散

治鼻不聞香臭

羌滑

剉滑

防風

升麻

葛根

各三錢

炙甘草

蒼朮

各二錢

川椒

白芷

各一錢

麻黃

各一錢

冬加

黃連

黃柏

右剉加姜棗煮水煎服

防風湯

治鼻淵

黃芩

人參

甘草

川芎

麥門冬

各一錢

防風

半斤

右為末湯

調下

治鼻淵并臭

俗名控腦砂

沉香

少許

宿砂

二斤

雄黃

皂角

各火

白牛毛

磁葉

各二

右為末吹

治鼻淵并臭

俗名控腦砂

俗名控腦砂

俗名控腦砂

俗名控腦砂

俗名控腦砂

俗名控腦砂

俗名控腦砂

入有少血加花子

驗方

絲瓜藤三丈燒為末酒下或殼亦可

鼻赤又生瘡

白龍丸末逐日洗面如澡豆法更甚

以時以湯洗去又宜間服龍虎丹一貼又方黃柏苦

參攢榔末付或青黛槐花杏仁研付或乳汁調杏仁

未付

治紅影

治風熱上攻面鼻赤刺癢疹俗呼肺風

船上硫黃白礬

各半

為末黃丹少許染與病面色同

每上半錢津液塗之兼服升麻湯下瀉青丸

○ 瀉血六十九

諸血證辨法

瀉瀉弱為亡血細弦瀉按之虛為

脫血浮弱按之絕為下血煩數者吐血沉弦必衄
為吐血太陽大而浮必衄吐血脈輕在肌肉及自滑
睛暈黃衄未止氣為失血瀉為少血脈來懸鉤為衄
血常脈上至而搏血衄身熱者死腸澼下膿血弦絕
則死滑大則生吐血唾血脈滑小弱者生弦強者死
血溫身熱脈躁者死熱則血氣脈沉小留連或微者
易治浮大洪數者難治

凡血證身熱脈大者難治大邪勝也身涼脈靜易治正氣復也

衄血大抵與吐血同火載血上錯經妄行衄血者血出於鼻也同間

云切者陽熱滯於足陽明而上熱則血氣行焉
經云怒氣逆甚則吐血暴瘳內逆則肺根隔而逆
一取天府穴又足太陰胃之脈從腎上貫肝入肺中
循候龍其病則飢不欲食面如土色咳喘則有血夫
氣者陽也血者陰也氣主煦之血主濡之今血多行
上出於口鼻者皆是陽虛陰虛有升無降其血逆大
故也

涼血行血為主犀角地黄湯入樽蓋犀角能解上時又

花代之又云可○內經謂身熱則死寒則生亦是大
物加即金亦可

槩言之豈無熱生而寒死者乎必兼症詳之可也

一方

荊芥穗研服或用蘿蔔上半截杵汁服又滴鼻孔并

灸大椎穴

在頂後第一椎上針入五分灸隨年啞門穴在頂後又髮際針入三分

二穴俱能止或用寒水紙於腦脇大椎三處貼之

本草以萱草根研汁一盞入姜汁半盞細呷之治衄

衄血吐血上行 山茶花為末入童便姜汁好酒調

服加鬱金尤妙又方鬱金末童便姜汁酒調服

經血逆行或血腥或吐血或唾血服韭汁最好

雜著云凡酒色過度損傷肺腎真陰咳嗽吐痰衄吐咳

咯血等證誤服參芪等日溫之藥則病日增世人不

識徃上服之致不救者多矣

東垣云傷寒衄血者仲景言不可發汗為脉微也若浮

緊者麻黃湯浮緩者桂枝湯已微者二藥俱不可用

宜黃芩為藥湯雜病見血多責其熱如衄血出於肺

以犀角升麻梔子黃芩芍藥生地紫生丹參阿膠主

之湯

或曰實者犀角地黃湯虛者小續命湯加黃芩主之吐血衄血皆可治

治一貧者虛弱氣促精神短少衄血吐血以麥門冬二

分人參歸身二分黃芪甘草各一錢五味五枚作一

服水煎熱服愈繼而至冬天居大室卧大熱坑而吐

血再求治此又虛而有太熱在內上氣不足陽氣外

虛當補表之陽瀉裡之熱夫冬寒衣薄是重虛其陽

表有大寒墜過裡熱火邪不得舒暢故血出於口憶

仲景傷寒論有云太陽傷寒當以麻黃湯發汗而不