

人股部十五

○股陰疽

與附骨疽參看

靈樞云發於股陰名曰赤施不急治六十日死在兩
股之內不治十日死 鬼遺云陰疽發腿髀及陰股
始發腰強數飲不能多七日發堅腫脹惡疼心煩躁
死不治

或問大股之內陰囊之側生毒何如曰在左爲上馬
癰在右名下馬癰在肚門傍名肚門癰俱屬足太陽
經濕熱七情不和憂憤所致宜服內補黃芪湯內托
羌活湯十全大補湯選用勝金丹

者一

上馬
下馬
癰

粒金丹八陣散下之嘔吐不食

九六脉

微或代冷汗不止煩躁狂妄小便不利泄瀉者不治
未潰之先宜服臺閣紫微丸

按足三陽之脉在外

皆曰髀足三陰之脉在內皆曰股今日大股之內陰
囊之側則屬三陰經而厥陰爲多明矣乃以爲足太
陽不亦謬乎

一人腿內側患癰未作膿而腫痛以

內托黃芪柴胡湯二劑稍愈又一劑而消

一人腿

內患癰漫腫作痛四肢厥咽龍寒發寒熱諸治不應

乃邪鬱經絡而然也用五香連翹湯一劑諸證少退

又服大便秘行二次諸證悉退而愈

一人年二十餘

股內患毒日久欲求內消診脉滑數知膿已成因氣
血虛不潰刺之膿出作痛用八珍湯稍可但膿水清
稀用十全大補湯三十餘劑而痊蓋膿出反痛者虛
也一僧股內患腫一塊不痛不潰治托裏二十餘
劑膿成刺之作痛予謂腫而潰潰而反痛此氣血虛
甚也宜峻補之彼云氣無補法予曰正氣不足不可
不補補之則氣化而痛自除遂以參芪歸朮熟芩治
之兩月餘而平大抵瘡瘍先發為腫氣血鬱積蒸
肉為膿故多痛膿潰之後腫潰肌寬痛必漸減而痛
愈盛者氣血不足也卽丹溪河間虛其

○股陽疽

靈樞云發於股陽名曰股陽疽其狀不甚變色癰腫內薄於骨不急治三十日死矣

或問腿外側髁下五六寸生疽何如曰此名伏兔發寒熱大作疼痛徹心焮腫無頭是也屬足陽明胃經先賢謂不治之證早覺早治爲上急隔蒜灸灸而炮起者可治無炮者難治服活命飲加牛膝木瓜漢防已紫金丹勝金丹汗之壯實者八陣散一粒金丹下之一人股外側患癰漫腫大痛以內托黃芪湯酒煎二劑少可更以托裏數劑潰之而愈一人年踰

二十稟弱左腿外側患毒三月方潰膿水清稀肌肉
不生以十全大補湯加牛膝二十餘劑漸愈更以豆
豉餅灸月餘而痊 一婦腿癰久而不愈瘡口紫陷
膿水清稀予以爲虛彼不信乃服攻毒之劑虛證蜂
起復求治灸以附子餅服十全大補湯百餘貼而愈
一人腿癰內潰針之膿出四五碗許惡寒畏食脉
診如絲此陽氣微也以四君子加炮附子畏寒少止
又四劑而止以六君子加桂數劑飲食頗進乃以十
全大補及灸附子餅兩月愈 一老腿癰膿自潰忽
發昏瞢脉細而微此氣血虛極也以大補之劑而甦

一人腿癰無筋攣痛脉弦緊用五積散加黃檗柴

胡蒼朮而痊 一婦左腿痛不能伸脉弦緊按則瀋

以五積散二劑痛少止又二劑而止以神應養真而

愈 脉弦緊瀋屬寒故用五積散辛熱以散之 一人右腿赤腫焮痛脉沉

數用當歸拈痛湯四肢反痛乃濕毒壅遏又況下部

藥力難達非藥不對證遂砭患處去毒血仍用前藥

一劑頓減又四劑而消 一人年踰五十冬患腿癰

脉數煩躁飲冷便秘腫痛焮甚此熱淫于內也宜用

苦寒之藥投清涼飲倍加黃芩其勢頓退更以四物

湯加黃芩而愈 一人年三十連得憂患作勞好色

左腿外側廉紅腫如栗醫以大府實與承氣兩貼下
之又一醫與大黃朱砂血竭三貼而脉大實後果死
此厥陰多氣少血經也 一人腿癰膿成針之出膿
二碗許飲托裏藥一劑大發熱更用聖愈湯二劑而
止翌日惡寒不食脉細如絲以人參壹兩熟附叁片
薑棗煎服而愈但食少不寐更以內補黃芪湯而平
一人腿腫發熱惡寒以補中益氣湯治之彼以爲
緩乃服芩連等藥熱愈盛復請予治以人參養榮湯
二十餘劑而潰更以參芪歸朮炙甘草肉桂月餘而
斂 一人年踰三十左腿微腫痛日久肉色如故不

思飲食東垣云瘡瘍腫下而堅者發于筋骨此附骨
疽也乃真氣虛濕氣襲于肉理而然蓋諸虛皆稟于
胃食少則胃弱法常助胃壯氣以六君加藿香當歸
數劑飲食漸進更以十全大補湯而愈 一人遍身
走痛兩月後在脚面結腫未幾腿股又患一塊脉輕
診則浮重診浮緩此氣血不足腠理不密寒邪襲虛
而然以加減小續命湯四劑及獨活寄生湯數劑疼
痛頓去更以托裏藥倍加參芪歸朮百貼而愈 南
司馬王荆山腿腫作痛寒熱發渴飲食如常脉洪數
而有力此足三陽經濕熱壅滯用檳蘇敗毒散一劑

而寒熱止再劑而腫痛消更用逍遙散而元氣復兩
月後因怒腫痛如錐赤暈散漫用活命飲二劑而痛
緩又用八珍湯加柴胡山梔丹皮而痛止復因勞役
倦怠嬾食腿重頭暈此脾胃氣虛而不能升舉也用
補中益氣湯加蔓荊子而安 一儒者兩腿腫痛肉
色不變惡寒發熱飲食少思肢體倦怠此脾氣不足
濕痰下注也以補中益氣加半夏茯苓芍藥二劑寒
熱退而腫痛消又十餘劑脾胃壯而形體健 一男
子患此入房兩腿硬腫二便不通余謂腎開竅於二
陰乃肝腎虧損也用八珍丸料加車前子牛膝而二

便利用補中益氣湯而腫硬消喜其年少得生
上舍內痛如等處已如故面黃燥食痛甚作嘔此痛
傷胃也用六君子以壯其脾胃用十全大補以助其
膿而針之更用飛湯倍加參芪苓歸麥門五味遠志
貝母而瘡斂
一男子因負重飲食失節胸間作痛
誤認爲瘡毒服大黃等藥在腿股腫肉色如故頭痛
惡寒喘渴發熱脉洪大而無力此勞傷元氣藥損胃
氣而然耳用補中益氣湯四劑又用十全大補湯數
劑喜其年少而愈

○附骨疽

丹溪云環跳穴痛防生附骨疽以蒼朮佐黃蘗之辛
行以青皮冬加桂枝夏加黃芩體虛加杜牛膝以生
甘州爲使大料煎入生薑汁食前飲之痛甚者恐十
數貼發不動少加麻黃一二貼又不動恐疽將成急
掘地成坎以火煨紅沃以小便赤體坐其中以席圍
下體使熱氣薰蒸腠理開氣血暢而愈 或問附骨
疽何以別之曰凡患流注未盡則餘毒附骨而爲
疽在股外屬足太陽陽明經在股內屬足厥陰足少
陰經又云風濕折熱熱壅而結骨成疽蓋骨者腎之
餘腎虛則骨冷而遂附着於骨也骨冷則氣愈滯而

血愈積但能爲腫不能爲膿流注者傷寒之餘毒骨
疽者流注之壞證也流注非傷寒之罪乃醫者表之
未盡也骨疽非流注之過乃庸醫涼藥之誤也又云
久得厚味及醉後沙水或履冰霜雪寒入髀樞積痰
瘀血相搏而成疽初起覺熱無時寒乍熱而無汗
久則痛深入骨而不移處按之痛不止者是也初覺
卽隔蒜灸之以多爲上宜勝金丹烏金散汗之壯實
者一粒金丹下之或八陣散久則極陰生陽寒化爲
熱肉腐而成膿膿成則宜烙十全大補湯加牛膝木
瓜補之有久潰毒結留連展轉經歲不已腐出朽骨

者骨雖出而不愈有終身之咎視其白膿清稀者碎
骨初脫肉深難取膿白而稠者碎骨將出肉淺可取
大抵久腐出骨不論強弱老幼必須補益使氣血和
暢正氣漸復邪氣漸退自然收斂十全大補湯人參
養榮湯在所當用未成膿者以冲和膏貼之盖有獨
活能動盪氣血也已潰者宜服何首烏散此藥能調
和陰陽也

薛附骨疽有因露卧風寒深襲於骨者

有因形氣損傷不能起發者有因剋伐之劑虧損元
氣不能發出者有因外敷寒藥血凝結於內者凡此
皆宜灸熨患處解散毒氣補接陽氣溫補脾胃為主

若飲食如常先用仙方活命飲解毒散鬱隨用六君子湯補托榮氣若體倦食少但用前湯培養諸臟使邪不得勝正若膿已成卽針之使毒不得內侵帶生用針亦無妨如火針亦不痛且使易斂其隔蒜灸能解毒行氣葱熨法能助陽氣行壅滯此雖不見於方書余常用之大効其功不能盡述唯氣血虛脫者不應 一女髀樞穴生附骨疽在外側廉少陽經分始末用五香湯十宣散一日惡寒發熱膈滿猶大服五香湯一夕喘死此升散太過孤陽發熱于上也

一人年踰四十夏患附骨癰予以火針刺去瘀血更

服托裏藥而愈至秋忽不飲食痰氣壅盛勞則口舌
生瘡服寒藥腹痛彼疑爲瘡脾胃脉輕取似大按之
無力此真氣不足虛火炎上也治以八味丸彼不信
自服二陳四物湯幾殆復請予仍以前丸治之而愈
一人附骨癰畏針不開醫膝通潰脉數發渴煩躁
時嗽飲食少思齊氏曰瘡瘍煩躁時嗽腹痛渴甚或
泄利無度或小便如淋此惡證也膿出之後若脉洪
數難治微瀉遲緩易治刺之膿出四五椀卽服參芪
歸朮大劑翌日脉稍斂更服八珍湯加五味子麥門
肉桂白斂三十餘貼脉緩膿稠三月乃愈
一老腿

患附骨疽腫硬大按方痛口乾脉弱腫聚不潰飲食
少思予謂腫下而堅者發於筋骨肉色不變者發於
骨髓遂托以參芪等藥三十餘劑膿雖熟不穿予謂
藥力難達必須針刺不聽至旬日方刺涌出清膿五
六碗然衰老氣血不足養毒又久竟不救大抵瘡
疽旬日不退宜托之有膿刺之有腐肉取之虛則補
之此十全之功也一人患貼骨疽腿細短軟瘡口
不合以十全大補湯外灸附子餅貼補藥膏調護得
宜百貼而愈一人環跳穴患附骨疽彼謂小瘡服
敗毒藥外以寒藥敷貼因痛極針之膿瘀大泄方知