

傷寒懸解卷四

昌邑黃元御坤載著

太陽經中篇

五十六章

太陽壞病

太陽風寒有正治之法。桂枝麻黃是也。陽偏盛者。恐異日
之人陽明。則有大青龍。白虎湯。早清其燥熱。陰偏勝者。恐
異日之入三陰。則有小青龍。五苓散。預去其濕寒。處治不
差。病在太陽一經。自當應藥而解。不成壞病。醫不知此實
其實而虛其虛。若汗若吐若下若溫鍼補瀉異施。遂成壞



傷寒懸解卷四

昌邑黃元御坤載著

太陽經中篇

五十六章

太陽壞病

太陽風寒有正治之法。桂枝麻黃是也。陽偏盛者。恐異日
之人陽明。則有大青龍。白虎湯。早清其燥熱。陰偏勝者。恐
異日之入三陰。則有小青龍。五苓散。預去其濕寒。處治不
差。病在太陽一經。自當應藥而解。不成壞病。醫不知此實
其實而虛其虛。若汗若吐若下若溫鍼補瀉異施。遂成壞



病非復太陽本色矣。壞病者，卽後日之陽明與三陰也。陽盛而泄其陰，則入陽明；陰盛而亡其陽，則入三陰。桂枝麻黃之證，變爲亢陽孤陰，是以日壞。至於陽明，俟其府熱內實一下而愈，猶爲逆中之順。然而府邪傷陰，失於急下，亦伏死機。則順中之逆，正自不少。若夫三陰陰盛陽負，動羅危亡，則逆居強半，而順不十三。仲景於是，有救逆之法，隨證處治，轉逆爲從，元通微妙，良工苦心矣。

太陽壞病提綱一

太陽五十四

桂枝麻黃太陽風寒主方也。若至三日之久，正將入陽明。

太陰之期業經汗下溫鍼而病仍不解則事當大壞未必猶在太陽卽太陽未罷而亦未必尙屬太陽桂枝之證是宜審觀脈證另立新法故總立壞病之綱詳開救逆之門也。

太陽病三日已發汗若吐若下若溫鍼仍不解者此爲壞病桂枝不中與也觀其脈證知犯何逆隨證治之

太陽病治之得法當解於本經不至入府傳藏而成壞病若至三日之久已經發汗吐下溫鍼諸治而病不解則不在太陽定緣誤治入別經而成壞病當觀其脈證知其所

犯何逆隨證治之曰壞病者非太陽之本病故也。

壞病提綱二

太陽五十五

本發汗而復下之此爲逆也。若先發汗治不爲逆。先本下之而復汗之爲逆。若先下之治不爲逆。

申明上章逆字之義。風寒外閉宜辛溫發散而不宜下。燥熱內結宜苦寒攻下而不宜汗。若表邪未解裏邪復盛則宜先汗而後下。若裏邪急迫表邪輕微則宜先下而後汗。錯則成逆矣。若治法得宜先後不失不爲逆也。

太陽壞病入陽明去路

十五章

陽明從燥金化氣。陽旺之人。表鬱則燥動。然不經誤治。津液未耗。燥氣之作。何至遽盛。及其汗下溫鍼。傷津亡液。燥氣大發。經府合邪。乃成下證。雖不如三陰之險。然陰虧陽亢。亦伏危機。未可率然也。

太陽壞病入陽明桂枝證一 太陽五十六

太陽病先發汗不解而復下之。脈浮者不愈。浮爲在外。而反下之。故令不愈。今脈浮。故知在外。當須解外。則愈。桂枝湯主之。

方在太陽五

太陽病先發汗不解而復下之。設內有府熱。則下之當愈。

若使脈浮則表邪未解。必不能愈。以浮爲邪在表。遺其外邪而反下之。故令不愈。當須解外則愈。宜主桂枝也。此太陽表證未罷。而內有府熱。固當下也。然必外解而後可下。若發汗未解而遽下之。設脈猶見浮。則外必不愈。故仍以桂枝解外。

發汗亡津證二

太陽五十七

大下之後復發汗。小便不利者。亡津液故也。勿治之。得小便利必自愈。

膀胱者州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。土濕金鬱氣

不化水。土濕木鬱不能行水。皆令小便不利。小青龍五苓散證之。小便不利。悉緣土濕而水停。則小便之不利。必因濕旺。若汗下之後。而見小便之不利。是津液亡泄。燥而非濕也。然別無熱渴之證。則其燥未甚。勿用治之。俟其津液續復。得小便一利。必自愈也。汗下之後。小便不利。陽虛之人。則陽亡而病濕。陰虛之人。則陰亡而傷燥。此不見陽亡濕動之證。故知是亡津傷燥也。此亦人參白虎證。而燥熱未作。則病勢最輕。故不須治之。

麻杏甘石證三

太陽五十六

發汗後不可更行桂枝湯。若汗出而喘，無大熱者，可與麻黃杏仁甘草石膏湯主之。

汗後表寒未解，鬱其肺氣，熱蒸皮毛，竅開而不能透泄，故汗出而喘。表得汗泄，故外無大熱。麻黃發表，杏仁降逆，石膏清金，甘草培土，則表裏俱解矣。此亦大青龍證之輕者。以在汗後，故不用青龍。汗後不可行桂枝，亦大概言之。他如發汗已解，半日許復煩，可更發汗，宜桂枝湯。未嘗必禁桂枝也。

麻黃杏仁甘草石膏湯

十七

麻黃

四兩

杏仁

五十枚

甘草

二兩

石膏

半斤碎綿裹

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取

二升去滓溫服一升

汗後作喘證四

太陽五十九

發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘。

推原上章喘字之義汗出亡津液燥渴飲水飲水太多而

汗後陽虛不能消散水停則肺氣壅遏故必喘以水灌之

皮毛外閉肺氣鬱阻故亦喘也。

麻杏甘石證五

太陽六十

傷寒集解 卷四 五
下後不可更行桂枝湯。若汗出而喘無大熱者。可與麻黃杏仁甘草石膏主之。

下後表寒未解。鬱其肺氣。肺鬱生熱。蒸發皮毛而不能透泄。故汗出而喘。表寒裏熱。宜麻杏甘石雙解之可也。

下後不可行桂枝。亦大概言之。他如傷寒醫下之續得下利。清穀。章救表宜桂枝湯。又傷寒大下後復汗。心下痞。章解表宜桂枝湯。太陽病先發汗不解而復下之。脈浮者。不愈。章當須解外則愈。桂枝湯主之。未嘗必禁桂枝也。

人參白虎證六 太陽六十一

服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者白虎加人參湯

主之

方在太陽
三十九

服桂枝湯後汗出表解而津液亡泄裏熱則增是宜白虎清裏而大汗之後大作煩渴而脈又洪大是亡津而氣亦泄也津由氣化靈樞決氣上焦開發宣五穀味薰膚充身澤毛若霧露之溉是爲氣此當益氣以生津故加人參素問評熱論脈燥疾不爲汗衰者死以精氣消亡無以滲灌其枯燥也白虎而加人參使清氣降灑化而爲露滋潤枯涸滌洗煩燥莫善於此矣

人參白虎證七 太陽六十二

傷寒若吐若下後七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升者。白虎加人參湯主之。
方在太陽

三十九

吐下之後。氣奪津傷。七八日不解。燥熱內盛。而自裏達表。表裏俱熱。熱蒸竅泄。時時惡風。舌上乾燥。而心內焦煩。欲飲水數升之多。主以人參白虎。清金而泄熱。化氣而生津也。

表裏俱虛證八 太陽六十二

太陽病先下之而不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因致
冒冒家汗出則自愈所以然者汗出表和故也得裏未和然
後下之

太陽病先下之而不愈傷其陰液因復發汗傷其陽津表
陽裏陰以此俱虛表陽虛則陰氣外束裏陰虛則陽氣內
鬱陽氣內鬱而不外達其人因致昏冒冒家汗出則自愈
所以然者汗出則衛氣外達經脈和暢陰退而陽宣也表
和之後得裏未和然後下之

調胃承氣證九

太陽六十四



北京中医药大学图书馆藏

發汗後惡寒者虛故也。不惡寒反惡熱者實也。當和胃氣與

調胃承氣湯。

方在陽明二十

陽虛之人汗則亡陽。陰虛之人汗則亡陰。汗後惡寒者氣

泄而陽虛故也。故防入少陰。不惡寒反惡熱者津傷而陽

實故也。是已入陽明。將成大承氣證。宜早以調胃承氣和

其胃氣。預奪其實也。

陰陽俱虛證十

太陽六十五

太陽病中風以火劫發汗。邪風被火熱。血氣流溢。失其常度。兩陽相薰灼。其身發黃。陽盛則欲衄。陰虛則小便難。陰陽俱

虛竭身體則枯燥。但頭汗出。劑頸而還。腹滿微喘。口乾咽爛。或不大便。久則譫語。甚者至噦。手足躁擾。捻衣摸床。小便利者。其人可治。

太陽中風。以火劫發汗。邪風一被火熱。血氣流溢。而失其常度。外劫之火。與內鬱之陽。兩相薰灼。其身發黃。上之陽盛。則欲衄。下之陰虛。則小便難。陰液陽津。俱至虛竭。身體則枯燥不潤。陽氣上燔。但頭汗出。劑頸而還。裏氣臍鬱。而爲脹滿。肺氣壅阻。而爲微喘。火炎於上。口乾而咽爛。其時或不大便。久則衛鬱莫泄。濁氣薰心。而爲譫語。甚者胃氣

衝逆而爲嘔。噦或手足躁擾。捻衣摸床。凡此諸證。總以表裏壅遏。熱無泄路。故鬱悶懊懷煩亂如是。宜以辛涼之藥。雙泄表裏。若小便利者。是陰氣未絕。其人可治也。此證濕熱鬱蒸。宜以麻黃石膏泄其表熱。大黃芒硝泄其裏熱。半夏生薑降其逆。猪苓滑石滲其濕。表裏雙清。則神氣慧爽矣。

火熱入胃證十一

太陽六十六

太陽病二日反躁。反熨其背而大汗出。火熱入胃。胃中水竭。躁煩。必發譫語。十餘日振慄自下利者。此爲欲解也。故其汗