

癰疽外篇序

老子曰：惟其病，是以不病。上工不治已病，治未病。是以不病為病，使人尊節愛養而無病也。古之君子，形非不勞也，精非不搖也，但御之以節，不使其弊與竭耳。六淫非不中也，七情非不觸也，但處之有方，不使其賊與害耳。今也則不然，形則役而不休，精則勞而致乏。於是六淫之擾得以戕身，七情之惑得以喪志，不能防禦於未病之前，僅藉救

療於已病之後為醫工者苟不揣病練術於平素
烏足補偏救弊於臨證耶於治瘍也亦然善夫輪
扁之言曰不徐不疾得之於手應之於心口不能
言也古書古人之糟魄也糟魄之中精神寓焉讀
古書者當咀味其精神不可僅甘其糟魄故能求
已之所不知於古人之所知求已之所不善於古
人之所善度不知者可知不善者可善矣爰以此
意輯繕雜瘍治療為癰疽外篇

道光庚子冬日曹永序

目錄

金瘡第一

丁惡瘡第二

諸癰癭瘤第三

三

丹蟲第四

大凡惡疾癰癭第五

陽瘡第六

六

陰瘡第七

婦人乳第八

楊梅瘡第九

內癰第十

雜療第十一

瘍醫蛾術錄卷三

武進曹禾學

癰疽外篇

金瘡折傷第一

洗冤錄骨脉論三篇

人兩手指甲相連者小節小節之後中節中節
之後者本節本節之後肢骨之前主掌骨掌骨
上生掌肉掌肉後可屈曲者腕、在起高骨者



手外踝右起高骨者右手踝二踝相連生者臂

骨輔臂骨者髀骨三骨相繼者肘骨前可屈曲

者曲肘曲肘上生者髑音如骨嫩音如髑骨上生者肩

髑音魚肩髑之前者橫髑骨橫髑骨之前者

髀骨髀骨之中陷者缺盆盆即血缺盆之上者頸

頸之前者嚦喉嚦喉之上者結喉結喉之上者

肱、兩旁者曲頤曲頤兩旁者頤、兩旁者頰

車頰車上者耳、上者曲鬢曲鬢上行者頂、



前者顙門顙門之下者髮際髮際正下者額

下者眉際眉際之末者太陽穴太陽穴前者目

目兩旁兩小眥音恣兩小眥上者上臉下者下臉

正位能瞻視者目瞳子瞳子近鼻者兩大眥近

兩大眥者鼻山根鼻山根上印堂印堂上者腦

角腦角下者承枕骨脊骨下橫生者髑音寬骨體

腋間髑骨兩旁者釵骨釵骨下中者腰門骨釵骨

下連生者腿骨腿骨下可屈曲者曲腓曲腓上



生者膝蓋骨膝蓋骨下生者脛骨脛骨旁生者

骹

音恒

骨骹骨下外起高大者兩足外踝內起高

大者兩足內踝脛骨前垂者兩足跂骨跂骨前

者足本節本節前者小節小節相連者足指甲

指甲後生者足前跌跌四陷者足心下生者足

掌骨掌骨後生者踵

肉

踵後生者脚跟也

人有三百六十五節按周天三百六十五度男

子骨白婦人骨黑髑髌骨男子自項及耳并腦

後共八片有蔡州人腦後橫一縫當正直下至髮

際別有一直縫婦人只六片腦後橫一縫當正

直下無縫牙有二十四或二十六或三十二或

三十六胸前骨三條心骨一片狀如錢大項與

脊骨各十二節自項至腰共二十四髓骨上有

十九節合之得二十有四大是項之大肩井及左

右飯匙骨各一片左右肋骨男子各十二條八

條長四條短婦人各十四條男女腰間各有一



骨如掌有八孔作四行樣。手脚各二段。男子
左右手腕及左右肱骨邊皆有髀骨。婦人兩
足膝頭各有頓骨隱在其間。如指大。手掌脚板
各五縫。手脚大指并脚第五指各二節。餘十
四指並三節。尾蛆骨若猪腰子。仰在骨節下。男
子者其綴脊處凹。兩邊皆有六瓣如稜角。周有
九竅。婦人者其綴脊處平直。周有布六竅。大小
便處各一竅。

正面致命十六處

頂心
偏左
偏右
顙門
額顙
額角

兩太陽穴
兩耳竅
咽喉
胸膛
兩

乳
左
心坎
肚腹
兩脇
右
臍肚
腎囊

婦人產門
女子陰戶

正面不致命三十六處

兩眉
右
眉叢
兩眼胞
兩眼睛

兩腮頰
兩耳
兩耳輪
兩耳垂



鼻準

鼻竅

人中

上下唇吻

上下

牙齒口舌

頷頰

牙齒口舌

頷頰

頷頰

頷頰

食氣嚥

食氣嚥

食氣嚥

食氣嚥

血盆骨

兩肩甲

兩腋

兩腋

兩腋

兩腋

兩腋

兩腋

兩腋

兩曲

兩手腕

兩手腕

兩手腕

兩手腕

兩手腕

兩手腕

兩手腕

兩手腕

十指

十指

十指

十指

十指

十指

十指

十指

膝

膝

膝

膝

膝

膝

膝

膝

膝

膝

兩脚腕

兩脚腕

兩脚腕

兩脚腕

兩脚腕

兩脚腕

兩脚腕

兩脚腕

背面致命六處



腦後

兩耳根右左

脊背

脊脅

兩後脇右左

腰眼

背後不致命二十處

髮際

項頸

兩臂膊右左

兩肘右左

兩手

腕右左

兩手背右左

十指右左

十指甲右左

兩

後肋

兩臀右左

穀道

兩腿右左

兩曲腓

左

兩腿肚右左

兩腳踝右左

兩腳右左

兩腳根

右

兩腳心右左

十趾右左

十趾肚右左

十趾



甲縫左右

穀曰病源云被金及所傷若瘡邊乾急肌肉不生
青黃汁出瘡旁邊寒清肉消臭敗前出赤血後出黑
血如熟爛骨及血出不止白汁隨出或中絡脉解
內陰股天聰眉角橫斷腓腸乳上及與鳩尾攢毛
小腹尿從瘡出氣如賁脉及腦出者多凶少愈凡
金瘡通內血多內漏若腹與兩脇脹滿不能食者
死或傷中於腹則氣激腸從瘡孔出如斷而一頭

見者不可連兩頭見者可連

法有治

若腹痛短氣不

得飲食者大腸一日半死小腸三日死若截斷諸

解身軀肘中及腕膝髀若踝際亦可連續

法有治

若

傷經筋致榮衛不得循行雖愈則筋急不能屈伸

或血脉虛竭榮衛傷穿風氣得入五藏受寒則瘕

其狀口急背直搖頭馬鳴腰為反折須臾大發氣

息如絕汗出如雨救遲者死卒無汗者為中風邊

自出黃汁者為中水並欲瘕作急治之瘡不在瘡處

者為傷經絡亦死更有創愈後因驚而腫按之激
手躍動大者如盂小者如豆名曰盜血由內未充
滿因作勞而血涌出皮中雖不散亦不成膿盜血
之滿為加血二血不可妄破、則血出不止設止
亦令人氣短命絕再著凡則腫著水則膿傷氣多
效傷津多渴生多煩血竭多驚創愈犯房室多血
汁重出裏縛不如法每敗壞生虫內有破骨斷筋
伏血腐肉缺及竹刺不出令瘡久不能愈或重寒

傷榮重熱傷衛筋勞結急肉勞筋驚腫骨勞折沸
難以屈伸血脉勞者變化作膿榮衛不通膿留結成癰
外臺金瘡禁忌序引肘後曰金瘡去血當忍渴而
食乾食肥脂若飲粥食鹹則致血溢殺人莫救又
忌嗔怒言笑思想陰陽行動作勞若食酸鹹酒熱
羹臃音壘輩皆能令瘡腫痛甚以至於死差後須百日
半年始可稍復常又曰傷諸跳脉藏府輸皆是
死處及破腦出血不能言目直視咽聲沸口唾出

手妄舉皆必死。腦雖破而無諸候者可生。又腕傷
候曰卒被重物壓。逆或從高墜下致吐下血。則為
內損有瘀血者。其人喜妄不欲聞物聲。胸滿唇萎
舌青口燥。但欲漱水不欲嚥。無熱脉微大。腹不滿
自言腹滿者。是其候也。汗當出不出而內結。則為
留血。其人胸滿口乾。臍痛渴無寒熱。或腹滿口燥
不渴。唾如漿。凡出血多脉虛細者生。實大者死。瘀
在內腹脹脉雖者生。弱者死。傷折後盜汗為髓斷。