

亥 21
3-1<9

黃帝內經素問補註釋文

九



黃帝內經素問卷之三十七

全

黃帝內經素問卷之三十六

全

黃帝內經素問卷之三十五

全

黃帝內經素問卷之三十四

全



南京中医药大学图书馆版权所有

黃帝內經素問

黃帝內經素問卷之三十一

上海涵芬樓影印正統道藏本

黃帝內經素問卷之三十五

黃帝內經素問卷之三十四



南京中醫藥大學
南京中醫藥大學圖書館版權所有

黃帝內經素問補註釋文卷之三十四 宣十

唐太僕今啓玄子王冰次註

宋光祿卿直祕閣林億等校正

宋守尚書屯田郎孫兆重改誤

骨空論篇

黃帝問曰余聞風者百病之始也以鍼治之奈何

始初也

岐伯對曰風從外入令人振寒汗出頭痛身重惡寒



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

風中身形則腠理閉密陽氣內拒寒復外
勝勝拒相薄榮衛失所故如是

治在風府

風府穴也在項上入髮際同身寸之一寸
宛中督脈足太陽之會刺可入同身寸

五十一

之四分若灸者可灸五壯○新校正云按
風府注氣穴論氣府論中各已注與甲乙
經同此注云督脈足太陽之會可灸五壯
者乃是風門熱府穴也當云督脈陽維之
會留三呼不可灸乃是



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆
1951

調其陰陽不足則補有餘則寫

用針之道必法天常盛寫虛補此其常也

大風頸項痛刺風府風府在上椎

上椎謂大椎上入髮際同身寸之一寸

大風汗出灸諽諽諽諽諽諽在背下俠脊傍三十

所厭之令病者呼諽諽諽諽應手

諽諽穴也在肩胛內廉俠第六椎下兩傍各同身寸之三寸以手厭之令病人呼諽諽之聲則指不動矣足太陽脉氣所發刺可入同身寸之六分留七呼若灸者可灸



五壯諺諺者因取爲名爾

搏音

從風憎風刺眉頭

謂攢竹穴也在眉頭陷者中脉動應手足
太陽脉氣所發刺可入同身寸之三分若
灸者可灸三壯

失枕在肩上橫骨間

謂缺盆穴也在肩上橫骨陷者中手陽明
脉氣所發刺可入同身寸之二分留七呼
若灸者可灸三壯刺入深令人逆息○新
校正云按氣府注作足陽明此云手陽明

詳二經俱發於此故王注兩言之

折使揄臂齊肘正炎脊中

揄讀爲搖謂搖動也然失枕非獨取肩上橫骨間亦當正形炎脊中也欲而驗之則使搖動其臂屈折其肘自項之下橫齊肘端當其中間則其處也是曰陽關在第十六椎節下間督脈氣所發刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯○新校正云詳陽關穴甲乙經無

眇絡季脇引少腹而痛脹刺諺譖

眇謂俠脊兩傍空軟處也少腹齊下也
腰痛不可以轉搖急引陰卵刺八髎與痛上
八髎在腰尻分間

八或謂九驗真骨及中誥孔穴經正有八
髎無九髎也分謂腰尻筋肉分間陷下處

宜十

三

鼠瘻寒熱還刺寒府寒府在附膝外解營
膝外骨間也屈伸之處寒氣喜中故名寒
府也解謂骨解營謂深刺而必中其營也
取膝上外者使之拜取足心者使之跪
拜而取者使膝外空開也跪而取之者令

足心宛宛處深定也

任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏上
關元至咽喉上頤循面入目

新校正云按難經甲乙經無上頤循面入
目六字

衝脈者起於氣街並少陰之經

新校正云按難經甲乙經作陽明

俠齊上行至胸中而散

任脉衝脈者竒經也任脉當齊中而上行

衝脉俠齊兩傍而上行然中極者謂齊下



同身寸之四寸也言中極之下者言中極從少腹之內上行而外出於毛際而上熱謂本起於此也關元者謂齊下同身寸之三寸也氣街者穴名也在毛際兩傍鼠鼷上同身寸之一寸也言衝脈起於氣街者亦從少腹之內與任脉並行而至於是乃循腹也何以言之針經曰衝脈者十二經之海與少陰之絡起於腎下出於氣街又曰衝脈任脉者皆起於胞中上循脊裏為經絡之海其浮而外者循腹各行會於咽

喉別而絡胥口血氣盛則皮膚熱血獨盛
則滲灌皮膚生毫毛由此言之則任脈乃
從少腹之內上行至中極之下氣街之內
明矣○新校正云按氣街與氣府論刺熱
篇水熱穴篇刺禁論等注重文雖不同處
所無別備注氣府論中

耳十

四

任脈爲病男子內結七疝女子帶下瘕聚衝
脉爲病逆氣裏急督脉爲病脊強反折
督脉亦奇經也然任脉衝脉督脉者一源
而三岐也故經或謂衝脉爲督脉也何以

明之今甲乙及古經脈流注圖經以任脉循背者謂之督脈自少腹直上者謂之任脈亦謂之督脈是則以背腹陰陽別爲名目爾以任脉自胞上過帶脈貫齊而上故男子爲病內結七疝女子爲病則帶下瘕聚也以衝脈俠齊而上並少陰之經上至胸中故衝脈爲病則逆氣裏急也以督脉上循脊裏故督脈爲病則脊強反折也

督脈者起於少腹以下骨中央女子入繫廷孔

起非初起亦猶任脉衝脉起於胞中也其
實乃起於腎下至於少腹則下行於腰橫
骨圍之中央也繫廷孔者謂竊漏近所謂
前陰穴也以其陰廷繫屬於中故名之
其孔漏孔之端也

五十一

五

孔則竊漏也竊漏之中其上有漏孔焉端
謂陰廷在此漏孔之上端也而督脉自骨
圍中央則至於是

其絡循陰器合募間繞募後
督脉別絡自漏孔之端分而各行下循陰

器乃合篡間也所謂間者謂前陰後陰之兩間也自兩間之後已復分而行繞篡之後

別繞臀至少陰與巨陽中絡者合少陰上股內後廉貫脊屬腎

別謂別絡分而各行之於焦也足少陰之絡者自股內後廉貫脊屬腎足太陽絡之外行者循髀樞絡股陽而下其中行者下貫臀至膍中與外行絡合故言至少陰與巨陽中絡合少陰上股內後廉貫脊屬腎

也。○新校正云詳各行於焦疑焦字誤與太陽起於目內皆上額交顛上入絡腦還出別下項循肩臂內俠脊抵腰中入循督絡腎

接繞脅而上行也

其男子循莖下至篡與女子等其少腹直上者貫齊中央上貫心入喉上顧環脅上繫兩目之下中央

自與太陽起於目內皆下至女子等並督脈之別絡也其直行者自尻上循脊裏而



南京中医药大学图书馆版权所有
1991

至於鼻人也自其少腹直上至兩目之下
中央並任脉之行而云是督脉所繫由此
言之則任脉衝脉督脈名異而同一體也
此生病從少腹上衝心而痛不得前後爲衝
疝

宜十

六

尋此生病正是任脉經云爲衝疝者正明
督脉以別主而異目也何者若一脉一氣
而無陰陽之異主則此生病者當心背俱
痛豈獨衝心而爲疝乎

其女子不孕癃痔遺溺嗌乾