

婦科心法

崩漏門

崩漏總括

崩漏證治

帶下門

帶下總括

帶下證治

癥瘕積痞瘕癖症諸症門

癥瘕積聚痞瘕血蟲總括

癥瘕證治

食癥證治

痞瘕證治

積聚證治

瘕血蟲證治

瘕癖症證總括瘕癖證治

嗣育門

胎孕之原

男女完實

種子時候

分男分女

雙胎品胎

鯀見有子

胎男女論

辨別孕病

分經養胎

受孕分房靜養

安胎母子二法

胎前用藥三禁安胎審宜調治

胎前諸證門

胎前總括

惡阻總括

惡阻證治

胞阻證治

子腫子氣子滿

胎前腳腳證治

子煩證治

子懸胎上逼證治

子癰證治

子嗽證治

轉胞證治

子淋證治

激經胎漏尿血證治

胎不安小產墮胎總括

胎不安產墮胎證治

墮胎下血不止證治

瘕血不出證治

子死腹中證治

辨子母存亡

竹部

卷四十六

御纂

醫宗

金匱

子帝腹內鐘鳴證治藏燥證治鬼胎總括腸覃石瘕證治胎前母子盛衰



御纂醫宗金鑑卷四十五

編輯婦科心法要訣目錄

崩漏門

崩漏總括

崩漏證治

荆芩四物湯

加味四物湯

膠艾四物湯

琥珀散

八珍湯

十全大補湯

益氣養榮湯

補中益氣湯

益胃升陽湯

調經升陽除濕湯

失笑散

地榆苦酒煎



南京中醫藥大學圖書館版權所有

帶下門

五色帶下 總括

帶下證治

吳茱萸湯

補中益氣湯

六君子湯

六味地黃湯

歸脾湯

四物湯

清白散

四君子湯

導水丸

萬安丸

威喜丸

固精丸

加味四物湯

逍遙散

癥瘕積痞痞癖疝諸證門

癥瘕積聚痞瘕血蟲總括

癥瘕證治

大七氣湯

食癥證治

烏藥散

血癥證治

血竭散

痛癥治

助氣丸

積聚證治

開鬱正元散

瘀血血蟲證治

桃奴散

失笑散

玉燭散

疝癖疝證總括

疝癖證治

葱白散

疝病證治



當歸散

治諸積大法

嗣育門

胎孕之原

男女完實

種子時候

分男女論

雙胎品胎

鯀見有子

胎男女論

辨別孕病

分經養胎

受孕分房靜養

安胎母子二法

胎前用藥三禁

安胎審宜調治



御纂醫宗金鑑卷四十五

編輯婦科心法要訣

崩漏門

崩漏總括

淋瀝不斷名爲漏。忽然大下。謂之崩。紫黑塊痛多屬熱。日久行多損任腫。脾虛不攝中氣陷。暴怒傷肝血妄行。臨證審因須細辨。虛補瘀消熱用清。

註婦人行經之後。淋瀝不止。名曰經漏。經血忽然大下不止。名爲經崩。若其色紫黑。成塊。腹脇脹痛者。屬熱瘀。若日久不止。及去血過多而無塊痛者。多係損傷任衝二經所致。



更有憂思傷脾脾虛不能攝血者有中氣下陷不能固血者有暴怒傷肝肝不藏血而血妄行者臨證之時須詳審其因而細細辨之虛者補之瘀者消之熱者清之治之得法自無不愈

崩漏證治

荆芩四物湯

崩漏血多物膠艾。熱多知栢少芩荆。漏瀉香附桃紅破。崩初腹痛琥珀攻。日久氣血衝任損。八珍大補養榮寧。患慮傷脾歸脾治。傷肝逍遙香附清。

註 崩血漏血去血過多者宜用膠艾四物湯補之如屬熱多

者宜用知藥四物湯清之熱少者宜用荆芩四物湯和之
若漏血滯少此屬血滯宜用四物湯加香附桃仁紅花破
之若崩血初起脹痛此屬瘀凝宜用琥珀散攻之崩漏日
久氣血已虧衝任傷損者宜用八珍湯十全大補湯人參
養榮湯量補其損傷若因思慮傷脾者宜用歸脾湯補之
恚怒傷肝者宜用逍遙散加炒香附青皮平之

膠艾四物湯

四物湯

琥珀散

八珍湯

十全大補湯

人參養榮湯

歸脾湯

逍遙散

方俱見前調經彙方內

補中益氣湯

益胃升陽湯

氣陷補中益氣舉。保元升柴。歸水陳。益胃升陽加苓麴。腹痛加

芍嗽減參。

謹

崩漏日久脾傷食少。中氣下陷不能載血者宜用補中益

氣湯。益胃升陽湯升舉之。補中益氣湯。即人參黃耆甘草



保元湯加升麻柴胡當歸白朮陳皮也益胃升陽湯卽補中益氣湯加黃芩神麴也若腹痛者宜加白芍藥有熱者用黃芩無熱者用肉桂調之咳嗽者肺熱也減人參

調經升陽除濕湯

夾水瀉不甚弱調經升陽除濕湯耆草升柴歸蒼朮羌獨藁本蔓荊防

註

崩漏下血夾水或曰水瀉一二次形氣不甚弱者宜用調經升陽除濕湯其方卽黃芩甘草升麻柴胡當歸蒼朮羌活獨活藁本蔓荊子防風也以風藥先勝其濕若形氣虛弱者則當加人參陳皮合補中益氣湯補中勝濕可也



失笑散

地榆苦酒煎

殺血心痛失笑散。蒲黃五靈脂。定疼。崩血不已。防滑脫。地榆苦

酒煎止崩。

註

崩血心腹痛甚者。名曰殺血心痛。乃血滯不散。宜用失笑

散其方。卽蒲黃五靈脂也。先定其痛。痛止然後隨證治之。

若崩血補之。仍然不止者。當防其滑脫。宜用地榆一兩。醋

煎露一宿。次早溫服立止。止後隨證治之。名地榆苦酒煎。

崩漏門彙方

補中益氣湯



黃耆

人參

白朮

甘草

各一錢

當歸

陳皮

各七分

升麻

柴胡

各三分

右剉薑棗水煎服

益胃升陽湯

黃耆

二錢

人參

一錢

神麴

一錢五分

白朮

三錢

當歸

酒洗

陳皮

甘草

各一錢

升麻

柴胡

各五分

生黃芩

二錢

秋涼不用

右為粗末每服三錢或五錢如食添再加之如食減只服



北京中醫藥大學圖書館版權所有

三錢或更減之不可多服永煎去滓熱服

升陽除濕湯

黃耆

蒼朮

羌活 各一錢五分

防風

藁本

升麻

柴胡

甘草 各一錢

獨活 五分

蔓荊子 七分

右咬咀水五大盞煎至一大盞去滓稍熱服空心服畢待

少時以蚕膳壓之

失笑散

五靈脂

蒲黃 各等分

右為末先用醋調二錢熬膏入水一盞煎至七分食前

熱服良驗

地榆苦酒煎

地榆 一兩

醋煎露一宿次蚤溫服立止止後隨證調治之也

苦酒即醋

帶下門

五色帶下總括

帶下勞傷衝與任邪入胞中五色分青肝黃脾白主肺赤血黑
腎赤屬心隨入五臟兼濕化治從補瀉燥寒溫更審瘡膿瘀血
化須別胞膀濁與淫



帶下者由於勞傷衝任風邪入於胞中血受其邪隨人臍
氣濕熱濕寒所化故色青者屬肝爲風濕色赤屬心爲熱
濕色黃屬脾爲虛濕色白屬肺爲清濕色黑屬腎爲寒濕
也其從補從瀉從燥從瀦從寒從溫則隨證治之更審其
帶久淋瀝之物或臭或腥穢乃敗血所化是胞中病也若
似瘡膿則非瘀血所化是內癰膿也若如米泔兼尿竅不
利乃膀胱白濁病也若尿竅通利從精竅出或如膠黏乃
胞中白淫病也

帶下證治

邪入胞中吳茱萸赤黏連梔青防梔白朮益氣黑六味黃淡六

君或歸脾

註帶下因六淫之邪入於胞中者宜吳茱萸湯若色赤色黃而濁黏者熱也色黃者加黃連梔子色青者加防風梔子若色白色黑而清稀者虛寒也色白者用補中益氣湯色黑者用六味地黃湯色黃而淡者宜六君子湯或加味歸脾湯分證調治可也

吳茱萸湯

補中益氣湯

六味地黃湯

六君子湯

歸脾湯

力俱見首卷彙方

加味四物湯

胞中冷痛乃寒濕四物附子桂薑宜臭腥兼合知藥用久滑料

柴龍牡頭

六註帶下而胞中熱痛乃熱濕也今胞中冷痛乃寒濕也宜四

物湯加川附子炮薑官桂服之日久滑脫者加升麻柴胡

舉之龍骨牡蠣赤石脂漬之

四物湯方見前調經門彙方內

清白散

帶下濕熱清白散四物薑炭草蘘椿赤榆荆芥濕二木滑加龍

牡久合石

計帶下五色帶下也皆濕熱所化宜用清白散其方即四物