

加減芍藥湯

桃花湯

當歸附子湯

桂枝六合湯

辨傷寒譫語例第七

辨傷寒鄭聲例第八

辨傷寒懊憹例第九

梔子豉湯

梔子厚朴湯

梔子乾姜湯

辨傷寒發斑例第十

升麻葛根湯

加味羌活散



人參化斑湯

加味小柴胡湯

消毒犀角湯

大青升麻湯

犀角元參湯

元參升麻湯

梔子杏仁湯

黃連一物湯

黃連解毒湯

加減三黃石膏湯

通脈四逆湯

調中湯

大建中湯

人參三百湯

青黛一物湯

苦酒鷄子湯

辨傷寒發黃例第十一



茵陳湯

梔子升麻湯

龍膽湯

得効方

茵陳犀角湯

茵陳五苓散

一方

瓜蒂散

茵陳四逆湯

茵陳茺萸湯

茵陳理中湯

擦黃法

辨傷寒發狂第十二

陽毒升麻湯

升麻湯

升麻六物湯

加味升麻湯



梔子升麻湯

元參升麻湯

梔子仁湯

三黃石膏湯

猪苓散吐法

奪命丹

辨傷寒心下滿例第十三

辨傷寒咳嗽例第十四

人參杏仁湯

三物湯

辨傷寒喘例第十五

麻黃石膏湯

葛根黃芩湯

五味湯

加減五味湯

蘇陳九寶湯

辨傷寒心下悸例第十六

小建中湯

桂枝湯

桂苓甘草湯

辨傷寒身振例第十七

辨傷寒戰慄例第十八

辨傷寒腹滿例第十九

辨傷寒腹痛例第二十

辨傷寒小腹滿例第二十一



辨傷寒小便不通例第二十二

清肺飲

黃芩湯

八正散

清心蓮子飲

滋陰化氣湯

滋腎丸

滋陰益氣湯

辨傷寒小便數例第二十三

辨傷寒小便難少例第二十四

辨傷寒小便自利例第二十五

辨傷寒不大便例第二十六



調胃承氣湯

小承氣湯

大柴胡湯

蜜導法

製大黃法

解大黃芒硝法

四物麻仁湯

當歸潤燥湯

麻仁脾約丸

辨傷寒無表裏証第二十七

小柴胡湯

傷寒全生集卷三目錄終



陶節菴傷寒全生集卷三

長洲葉天士評本

曾孫鍾肇康

元孫潮青來

讀本

朱心傳

門人

顧景文
張亮揆

小門人鍾南紀校讀

吳厚存

門下後學鍾孝存校讀

○辨傷寒呃逆例第一

夫呃逆者俗謂呃忒是也、纔發聲於咽喉則遽止、軋然連續數聲、其聲短促不長、舌謂之噦非也、噦與乾嘔無異、但其聲濁惡而長、比之呃忒大有徑庭矣、若將呃逆紊為噦與咳逆、悞人尤多、然呃逆有因胃



先君子云此症必有頭疼而起

中實熱失下而作有因胃中痰飲而作有因過服寒涼之藥胃中虛冷而作且其氣皆從胃中起至胸膈之間而爲呃忒矣胃熱失下大便不通者承氣湯下之便軟者以瀉心湯主之有潮熱小柴胡湯胃虛有熱者橘皮竹茹湯主之有痰飲者橘皮半夏生薑湯主之加茯苓枳實陳皮桔梗若胃冷者橘皮乾薑湯主之甚者丁附理中湯加吳茱萸主之若過服寒涼藥多胃寒呃忒者丁附理中湯加吳茱萸木香薑汁主之凡其氣自臍下直冲於胸膈間呃忒者此陰症

此証難

羌活湯在此參

呃○忒○也○其○病○不○在○胃○矣○其○病○下○虛○內○伏○陰○火○或○悞○服○
 寒○藥○遂○至○冷○極○於○下○迫○其○相○火○上○冲○卒○集○於○胸○中○而○
 為○呃○忒○亦○欲○盡○也○病○人○煩○躁○自○覺○熱○甚○他○人○以○手○按○
 其○肌○膚○則○冷○此○為○無○根○失○守○之○火○散○亂○為○熱○非○實○熱○
 也○乃○水○極○反○似○火○陰○症○類○似○陽○也○若○不○識○此○悞○用○涼○
 藥○下○咽○即○死○當○用○羌○活○附○子○湯○加○官○桂○人○參○木○香○陳○
 皮○半○夏○砂○仁○急○溫○其○下○令○其○陽○回○陰○火○降○呃○忒○乃○止○
 也○若○陰○証○及○因○胃○寒○呃○忒○不○止○者○外○用○乳○香○硫○黃○散○
 嗅○法○內○用○丁○香○柿○蒂○散○服○之○則○止○再○灸○期○門○中○腕○氣○

三字可疑

劉○云○病○至○于○此○用○大○劑○溫○補○尚○恐○不○及

○若○羌○活○附○子○湯○恐○未○能○勝○任○且○羌○活○之○性○其○散○非○常○
○即○加○人○參○而○香○砂○之○類○終○嫌○其○散○臨○症○者○酌○之○

呃症大都陰寒居多如悞服冷藥者十有一二然胃熱呃忒甚少

全生集

卷三

海關元此良法也但手足溫煖脈重者為有生矣又有瘀血而疙瘀有形之物壅塞其間雖柿蒂亦不應

瀉心湯

治胃熱呃逆而便軟者

半夏下黃芩中乾薑下人參下黃連上甘草

下加茯苓 陳皮○水薑煎服

加味小柴胡湯 本方自有加減法

治陽症口苦脈弦發熱呃忒者或潮熱呃忒者

軟柴胡上黃芩中半夏下炙甘草下人參中



心下痞加枳實黃連。渴加天花粉知母。

心煩加姜汁黃連。水姜煎溫服。

橘皮半夏生姜湯。本方自有加減法。

治伏痰飲呃忒者。

陳皮半夏生姜加茯苓枳實。

桔梗砂仁心煩加姜汁黃連。水姜煎。

加姜汁服。

○羌活附子湯。本方自有加減法。

治陰症寒極嘔逆呃忒者。



羌活_上附子_上茴香_中丁香_中乾姜_下

甚者加吳茱萸官桂砂仁人參陳皮。寒氣

逆上加沉香。腹中痛加良姜。水姜煎磨

木香姜汁溫服之

○丁附理中湯 本方自有加減法

治胃寒呃逆及治服寒涼藥過多傷胃呃忒者

丁香_上附子_中乾姜_中人參_中白朮_中

甘草_下加吳茱萸官桂_中砂仁_中陳皮_中

甚者加良姜。冷氣逆上者加沉香。水姜



煎磨木香姜汁溫服

橘皮乾姜湯

治胃中虛寒呃逆者

橘皮 乾姜 加半夏 白朮 砂仁

人參。寒重不止用前丁附理中湯甚良

乳香硫黃散

治陰寒呃忒不止者用此切法

乳香 硫黃 艾各二錢 爲細末用酒一

鍾煎數沸乘熱氣使病人鼻嗅之外用搗生



姜擦胸前最效

丁香柿蒂散

治陰症呃逆及胸中虛寒呃逆不止者

丁香 柿蒂 各一錢
茴香 乾姜 良姜

陳皮 各一錢
各為細末用熱姜湯調下未止

宜再服

灸期門法

婦人屈乳頭向下盡處骨間動脈是穴男女乳
小者以手一指為率陷中動脈是穴男左女右

先君子常言此症
與時氣相似若一
不痊則皆無治法



灸三五壯

辨傷寒胸脇滿例第二

胸脅滿者、胸滿乃腹間氣塞滿悶、非心下滿也、脇滿者、脇肋脹滿、非腹中滿也、蓋表邪傳裏、必先胸以至腹入胃、是以胸滿多帶表証、宜微汗、脇滿多在半表半裏之間、宜和解之、又有邪熱或痰食結在胸中爲實者、必須湧吐之也、傷寒胸滿心煩者、柴胡陷胸湯、脇下硬、加青皮牡蠣粉、往來寒熱、胸脇滿者、小柴胡加桂白芍藥、脇下痛、加青皮、川芎、木香、若胸中痞氣



滿悶小柴胡加枳桔未效加瓜蒌黃連渴去半夏
貝母乾葛渴甚加天花粉治痞滿瀕用枳殼桔梗爲
要藥經云病人手足冷脉乍緊邪結在中心心下滿
而煩飢不能食病在胸中宜吐之又寸脉微浮或伏
胸中痞硬氣上冲咽喉不得息此爲胸中有寒者宜
吐之有痰實結胸中亦宜吐之用瓜蒂散若胸脇不
快腹滿悶唇青手足冷脉沉細少情緒或腹痛欲嘔
者此因生冷傷于太陰脾土用理中湯去參朮加砂
仁枳殼木香內寒甚者加丁附兼有外感寒者用五