


救偏瑣言

四



救偏瑣言卷之八

論行氣

症之體始終一血而已症之用始終一氣而已血之
體成漿氣之用化血漿之成血之化也血之化氣之
虛也氣之虛血化而漿始成漿老則為膿矣血不得氣
則頑而不化氣不得血則鼓次無地氣血虛饒則寒
凝不振毒火燔騰則氣血沸騰氣為毒鎔則氣不動
逆囊窠不鬆平陷乾焦血為毒鎔則血不融通盤淨
不活乾紅紫滯血足而氣不足氣附厚而囊薄漿不

充溢氣足而血不足稟粒壯而暈淡漿不濃厚以見
虛則乏其本而漿無所化實則受其虐而化不得行
是則行漿之理有當制以減其過有當助以補其不
足不可專以保元為則矣然補與瀉之形色症狀不
可殫詰即逐一指之未必無似是之誤約之於虛實
之的則靡弗齊也虛則斷無熾熱之理熱劇似寒則
有之未有虛而熾熱者也實則斷無皴淫之象虛而
乾焦則有之未有實而皴淫者也是謂江河一點血
辨別虛實之訣不必拘其便與食戰與渴作痒責

以氣咬牙青以血紛紅雜揉之象悉於此而總括矣
痘無可議漿忽停駐此必因調護失宜飲食失節起
居不時香穢阻塞是亦不可不察也

論補氣

問痘如何用補氣形色神情症悉虛氣虛之痘身不
熱縱熱溫和非熾烈冒寒伏火儘多涼形色現症是
迎別氣虛之痘色不紅縱紅嬌艷不蒼實血虛血鬱
白恒多非若氣虛終嫩色內虛不振少亢肥或平或
陷根盤癰皮薄肉軟嫩溶溶到得成漿漿不濃漿未

稠濃頂未滿進退浮沈難忽停輕不肥濃不蒼蠟重
若錫皮如灰白儘有紫色亦堪回到得收回不能結
儘有漿薄望堆沙面不堆沙腫欲斃亦有當頂如針
刺漏出清漿頂陷白亦有痂薄痘疤回疤色淡白無
血澤神情懶倦語話慵重語聲輕音澁澁氣虛之症
不繁多總無烈火灼皮膚惟有溼潤無燥烈脈微緩
弱無數晉此痘若還有別症種種將來作虛論不惟
寒戰助元陽辟病方思固氣分縱有似熱正由寒寒
極生熱古論定毒即留連總屬虛治毒亦須還養正

呻吟不寐莫猜煩累日不解毋虞結眼封日久非毒
塵求飲頻頻豈火渴推之疑似且無差明明虛症尤
易識知其虛寒看輕重重不早圖必虛脫

論補血

問症如何當補血色不榮今嫌淡白囊殼僅僅非空
飄囊竟空今補何益盤暈歸附亦不厚竟若無盤難
轉易補血之功較難氣主神今彼屬體點點有形
難捉致長養工夫由平素放點一見色久紅便慮成
漿漿不濃漿若不濃毒不盡毒一不盡多別症即使

收圓屬必薄症如氣薄死亦白凡見血虛須預補根
得紅分漿自足漿足收圓如自厚死得榮分皆血力
始終得血體無虛體若虧分必令實有孩稟賦素血
虛有兒本質多內熱恒有痘與娘相逢亦有痘與娘
相值又有善血慣腸紅儘有疹後刺方歇此等皆令
致血虧致點雖紅終憲白血熱宜攻毋向體血虛偏
宜顧本質欲審其虛人必清唇口溫潤無燥烈之症無
斑點雖其間按其體膚無熾熱不則縱使色不紅是
為痘中血鬱白的是真虛若與歸倍用酒煎淮熟地

血鬱用芎反提大歸味辛者反助熱甘芍酸斂尤不
堪熟地庶幾終賦陽若使血虛兼滑瀉歸地潤腸亦
不合惟有嫩鹿茸為良佐以川芎功真及參耆同用
亦相宜由來氣有生血力

論實表

何為表腠裡是也何為實表固氣是也氣為一身之
衛內主克塞外護腠裡氣虛于內則餒而不克衛護
無力而致表虛表虛則腠裡不密而氣難存養氣又
因虛而致虛而虛愈甚故表虛之症寒感易侵已發

未發之時若有表証便當疏邪實表以豫防其起發
不振起發之後痘之虛象立見便宜扶元固氣以豫
防其辟癘之患漿得過半稍可以回即宜與斂令氣
還元以豫慮其虛脫之地不拘痘之首尾兒之厚薄
但看神情懶倦身體溫涼面顏皓白二便清利唇口
不乾不燥凡此景象按之體膚有汗者是表虛也若
有表邪不可專以疏散及見裏薄脚軟色或淡白或
嬌紅漿清如薄絕無燥熱雄猛煩躁乾紅板實壅腫
之象即稠密毒盛不宜清涼亦不可專以解毒悉以

固氣實表為先稍兼佐理可也

論健胃

人以飲食為命經云地食人以五味味有所藏以養五氣氣和而生津液乃成津液者誠資生之源成身之本也是以安穀則昌必得胃氣強健乃能受納故人以胃氣為本瘧瘡初放便能食者是為裡實夫固為順即不能食毒尚未透邪害空竅故未之思未足為虞瘧若已齊毒其盡行於肌表而內空矣空則宜思儘有不食者其胃弱也何疑至於成漿則一身之

精神發洩於外一身之氣血耗散於虛其內尤虛矣
尤賴飲食相繼濟其空之度克有終至此猶未作想
即勸勉之而終不知味亦不能多安理其成痼而結
而也宜以保元湯加山藥而益姜棗陳倉米以開助
其胃如身涼體倦重語聲輕漿清色白者保元湯加
白朮木香當歸陳皮姜桂大棗陳冬米以醒豁之更
有淡白皺濕如嫩腐皮頭濕足冷痲後目無精彩者
前方更加熟附以振之虛若虛之劇者不必待其起
齊成漿時方思開胃之地發始之初便當早為之計

者也必須以症為準不見惡形惡色不見一切燥烈之象以症為憑不因毒侵火擾不因一切閉塞之故方可健胃否則不可以常理論也

附一治驗

丁巳先君治一症十二歲皮薄色淡頂平脚癰始以透發繼而大劑保元湯如夢歸淮地膏得以成漿至十朝不思飲食主翁疑以過補先君曰果爾漿必蒼老癰必燥硬體或煩熱種種反是焉得云過以細穀散重以參朮各五錢因腸豁然胃氣大

用無物不想收而活而愈

論安神

心藏神得血而寧神寧則睡自安安睡而神又足兩
相需而兩相輔者諸病剝而之復皆以睡中來也血
虛之體症兼稠密氣虛者有儘血化漿而血無餘地
血熱者有腐爛作臭而侵淫日久皆有以致血空虛
而神無所養恍恍惚惚不能收攝而睡何能安雖日
靜則神藏寐固主靜靜中之神不守始不令其藏矣
驗其症於漿必清於血必薄色必淡白體必溫涼一

切燥熱之症自不相涉即血熱者未必如是然人必
倦乏目必少神重語聲輕色必乾焦一切雄烈之象
自是銷鑠症難悉指類多如此一似傾國之兵一似
強弩之末總歸虛論法當以安神散治之兼別症者
隨其症而損益焉要不外以安神為主

附一治驗

戊午一錢氏女年十五適值經後瘕出甚密鬆而
囊薄紅淡而乾身體溫和人若失志睡中時獨語
二三月氣血兩虛心神不足之症始以養榮透毒

湯四劑後瘡雖起發形與色俱不掀四朝即以保
元拓裏人參每劑二錢至六錢黃芪四錢至一兩
當歸熟地亦俱重劑服及十朝漿僅七分十二朝
寢食得半痲不甚厚疤欠光澤十四晚徹夜不寐
諸言不清而無頭緒父母疑以過補使然果爾身
必熾熱氣必雄猛痲必燥硬渴而思冷脉按洪數
有力如是不寐方是大毒內擾種種反是緣以瘡
本不足而又值經後明屬心舍空虛以寧神解毒
湯加柏子仁用參四錢二劑即愈

論血虛咬牙

齒者骨之餘賴血榮養而得安榮養而欲及其餘其
及亦不易故其生也獨後未衰而即落況血難盈而
易虧者也是以補血之功難當養於平素虛癆初出
一點紅即血之體也得血而載得血而榮血虛之症
八九日後其血悉為斃耗何能有餘地以榮養其餘
所以齒牙妄劇而相齧也此益血虛使然以保元湯
大劑當歸淮熟地更用嫩鹿茸煎膏以補其缺陷斯
為良法此必斃後而見尤無毒火可踪纔合是症

附一治驗

庚申一兒四歲瘧在八朝漿色淡薄而滯根盤紅
淡而乾神倦而不容安似躁而不能逞身凉指冷
咬牙不已兼有戰意斃可立待厥父母呼天號地
始事者曾以保元輕而無效余用參三錢芪四錢
嫩鹿茸膏淮熟地膏各半盞熟附五分佐以苘歸
外山查三錢以行其滯連進二頭汁更以大桑蟲
一枚服後若時雨之化薄者厚淡者濃滯者潤冷
者溫咬牙頓止神情遂開嗣後去茸附前劑分量