

牙疳

疹後走馬牙疳。與痘後走馬牙疳同。甚則落齒爛骨。穿腮透鼻。其勢甚急。一二日能傷命。名爲走馬。言其勢驟也。此係火毒在胃。有七不治。不食舌根爛者不治。黑腐如筋者不治。色白肉浮胃爛者不治。無血牢不可拔者不治。腐肉黃爛。入水泛油如肉羹者不治。牙落腮穿鼻潰。臭不可聞者不治。山根上發紅點者不治。宜急服糞清。又用髮帚洗淨。刷去黑腐。日傳金鞭散。本證三次腐漸去。齒骨動搖者去之。傳三五日愈。內服涼膈散。本證保嬰集云。疹後走馬牙疳。內服養榮解毒湯。本證外敷走馬散。本證金鏡錄云。疹後牙疳紅腫。

者內服加味清胃湯。

證本

青囊書云。疹後口乾。變成牙疳。若不早治。

則有穿腮落齒之患。若加痰喘。醫無及矣。此是毒攻心脾胃三經。

故當疏解毒邪。內服三解散。

證本

外敷清金散。

證本

大抵內治之法。勢

甚猛烈者。服涼膈散一二劑。瀉去火毒。餘則或養榮解毒。或清胃。

或三解。酌用可也。外治之法。勢甚危急者。金鞭散最妙。餘則走馬

清金亦驗。若止于唇瘡舌破。以絳雪散。

證本

敷之。

增張氏廉曰。牙疳由陽明火毒。其證最危。必須內外兼治。內服犀

角地黃湯。

證本

加葛根川連石膏大黃。外以玉阿散。

證本

黃龍散。

證本

調

治。或外面患處用猪肉貼之。再以吹口丹。

證本

調治。

金鞭散 治大人小兒一切牙疳危急。唇口腮鼻爛潰穿破。

人中白

煅三錢

明雄黃

貳錢

冰片

麝香

各壹分

皂礬

入礬內燒為末五錢

右為細末。先用髮帚蘸濃茶攪洗。令血出。將藥傅患處。吐出毒

血。毒涎為妙。

疳熱涼膈散 牙疳甚烈者。須用此方治之。若稍緩者。不可用涼

膈以傷胃氣。還宜養榮解毒湯。卷調之。

大黃

黃連

黃芩

石膏

生地

方解石

元參

連翹

牛旁

枳殼

薄荷

荊芥穗

走馬散 凡牙疳腐爛至喉中。及牙落腮穿。並以此傅之。肉已腐



者剪去傅藥牙欲落者搖去傅藥

白鹽梅

燒灰存性

白明礬

煅各叁錢

人中白

伍錢

共爲末。先將細茶煎濃汁。用髮帚蘸汁。刷去腐肉。洗見鮮血。將藥傅上。令吐毒涎。一日三次。爛至喉中者。用蘆管吹入。雖遍口爛破者。傅之皆愈。惟山根發紅點者不治。忌油膩厚味雞鰲魚腥辛辣一切發毒等物。

加味清胃湯

升麻

黃連

丹皮

生地

當歸

甘艸

桔梗

牛蒡

荊芥

元參

三解散

當歸

川芎

白芍

生地

防風

荊芥

陳皮

枳殼

黃芩

黃連

連翹

牛蒡

清金散

青黛

明礬

雄黃

文蛤

山梔

硼砂

皂角

血餘

冰片

共爲末以鹽湯洗口淨後敷之

絳雪散

治牙疳疼痛。口瘡舌破。喉痛腮腫。并目赤鼻瘡面風等

證。



石膏 貳錢

薄荷

硼砂

血竭 各伍錢

硃砂 叁分

明礬 貳分

冰片 貳分

共爲末敷患處

玉阿散

猫屎在屋上日曬雨濯風吹白色者煨存性不拘多少配冰片青黛少許研爲細末敷上神效如無真青黛用靛青花水飛淨代之又一方用蝸牛連殼煨存性研末吹患處立愈

繆氏黃龍散

黃牛糞尖雄者佳煨存性研末每錢加冰片一分搗勻吹入牙



根自愈。

猪肉貼法

先用黃連煎濃汁。將生精肉切薄片。投入黃連汁內。片時。以猪肉貼患上。拔出積毒。猪肉乾黑再易。數次即效。

吹口丹 治穿腮落齒。鼻崩唇爛。神效。

醋薺草

疑即三葉酸。考詳後。

搗汁。青草鷺扇調汁。將二汁同放于蜆殼內。

炭火煅數次。研末。加冰片。梣子尤妙。

口傳三葉酸方

凡走馬牙疳。用三葉酸搗汁。熬成膏。以白礬末收之。研爲細末。

數患處立愈。此方親試有驗。最宜預備。端午日製尤良。

三葉酸考

苗高一二寸。叢生布地。極易繁衍。一枝三葉。一葉兩片。至晚合貼。整整如一。四月開小黃花。結小角。長一

二分。內有細子。冬亦不凋。其味如醋。故一名酸漿。與燈籠草之酸漿。名同物異。

喉痛

疹後餘毒不散。結于咽喉。破爛腫痛者。甘桔防風湯主之。活幼書

云。斑疹出後。心煩大熱。錯語呻吟。乾嘔咽痛者。犀角大青湯

俱見本證

主之。絳雪散

共

吹之。發微云。痘疹誤服辛熱之藥。以致熱毒蘊結。

咽喉腫痛。口舌生瘡。赤眼腫痛。滋陰潤燥湯

本

主之。綠袍散

本證

之。



增葉氏天士曰王某疹後及暮加喉痛而咳擬用元參犀角湯而愈。

甘桔防風湯 治咽喉腫痛

甘艸

桔梗

防風

薄荷

荊芥

牛旁

射干

元參

連翹

黃芩

銀花

犀角大青湯

犀角

大青

元參

升麻

川連

黃柏

黃芩

山梔

甘艸

滋陰潤燥湯



生地

當歸

白芍

木通

荊芥

連翹

花粉

山梔

薄荷

黃芩

牛蒡

綠袍散

薄荷

伍錢

青黛

貳錢伍分

礪砂

貳錢伍分

兒茶

叁錢

甘艸

叁錢

黃柏

壹錢

銅青

冰片

各壹錢

荊芥

伍錢

元明粉

百藥煎

各貳錢半

共爲細末。每用一字或二字。點舌上。令其自化。或井花水調點。

元參犀角湯

元參

犀角

連翹

花粉

丹皮

鮮生地

喉症



中國醫藥大學圖書館版

發微論云。疹後不出聲音。名爲疰瘧。不治之證也。保嬰集云。疹後

咽乾聲啞者。餘毒留滯于肺也。清肺湯集雪膏。俱見本證主之。

增張氏廉曰。疹後失音而至不能出聲者。名疰瘧。多不治。宜用甘

桔元參牛蒡蟬蛻射干黃芩花粉杏仁腹子沙參麥冬川貝竹肉

山豆根之類。或以竹瀝八匙薑汁二匙冲服。再用丹參茯神石菖

蒲麥冬花粉桔梗陳皮甘草訶子肉之類。痰盛加川連蔓仁羚羊

或牛黃散。本證吹入。終不開聲者不救。若但聲音低微不清。與此不

同。養陰潤肺自愈。

清肺湯

麻黃

壹錢伍分

麥冬

貳錢

桔梗

貳錢

知母

荊芥

花粉

各錢

訶子

捌分

杏仁

十四粒

石菖蒲

捌分

共入薑汁竹瀝各數匙

集雪膏

治疹後火邪尅金。咽喉腫痛。痰涎咳嗽。口渴發熱。欲成

疹怯。

生地

元參

丹皮

杏仁

桔梗

貝母

百部

知母

橘紅

薄荷

麥冬

鼈甲

醋炙

桑白皮

石菖蒲

右藥各一兩。水熬三次。去渣。再熬至三碗。入煉蜜。慢火熬成膏。



埋地出火毒收貯。每服數匙。津液化下。不拘時服。

牛黃散

牛黃

青黛

黃柏

礪砂

雄黃

兒茶

冰片

共爲末。先用薄荷湯漱咽。後吹入神效。

肺痿

按脈訣云。寸數虛瀉。肺痿之形。

增闡註云。疹後久嗽不止。時吐白沫如米糊者。名肺痿。火盛而金消也。宜養血補氣。保肺清火。初用加味二冬湯。後用門子清肺飲。加味二冬湯。

天冬

麥冬

熟地

生地

桔梗

貝母

米仁

萸仁

沙參

紫苑

甘艸

款冬花

門冬清肺飲

麥冬

天冬

知母

貝母

桔梗

地骨皮

粘子

杏仁

冬花

桑皮

甘艸

馬兜鈴

加晚米百粒

肺癰

按脉訣云。寸數而實。肺癰已成。

增闡註云。疹後久嗽。痛引胸脅。或吐膿血。或吐如米粥者。此肺內生毒也。名肺癰。宜瀉熱豁痰。開提升散。解毒排膿。寧肺桔梗湯主。



之證。本蓋痿爲正虛而癰爲外邪不可誤治。

寧肺桔梗湯

桔梗

貝母

枳殼

杏仁

括蕁根

生耆

防風

桑皮

米仁

知母

地骨皮

甘艸節

亭厯子

五味子

加薑引

初起加防風。去黃耆。五味子。咳甚。加百合。身熱。加柴胡。黃芩。小水不利。加木通。燈心。大便不利。加製軍。煩躁痰血。加茅草根。胸痛甚。加人參。白芷。



腹疼

增保赤全生錄云。疹後肚痛。用生薑七片搗爛。加醋合灶心土貼臍上。效。又一鈔本云。肚痛用蘆稭一撮煎服。

腹瘕

青囊書云。疹後發熱依時久不治成瘕瘕。發熱來時身燒口渴少食煩悶。熱過則和。或日發或間一日二日而發。或數日一發與瘕相似但不寒耳。久則腹脇中有塊面黃體瘦。脹滿少食。與瘕母同。宜川芎柴胡湯主之。

川芎柴胡湯

川芎

柴胡

黃芩

茯苓

甘艸

當歸

陳皮

貝母

山查

紅花子

加倍

龜胸

增圍註云。龜胸者。疹後餘毒留于肺經。陽火熏灼而致。宜清肺化

痰降火。先用清氣化毒飲。本或涼膈散。本加蘇子枳殼橘紅麥冬

羚羊地骨葶朮杷葉等藥。以開導其氣。繼用九味平胸丸。本

證

清氣化毒飲

柴胡

桔梗

連翹

去心

桑皮

杏仁

黃芩

黃連

元參

甘草

麥冬

薏仁

加蘆根

