

仲景傷寒補亡論卷第八

河南郭雍撰次

不可發汗四十條

可發汗五十八條

不可發汗四十條

傷寒本論曰夫以爲疾病至急倉卒尋按要者難得故重集諸可與不可方治比之三陰三陽篇中此易見也又時有不止是三陰三陽出在諸可與不可中也

仲景曰少陰病脈細沈數病爲在裏不可發汗

又曰太陽病脈浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不可發汗何以知之以榮氣不足血少故也龐氏云前陽明病脈遲汗出多微惡寒宜桂枝湯不責榮不足蓋尺脈長大而遲此必軟緊而遲不可汗宜小建中湯雍曰桂枝本爲解肌不動經故前陽明證中用之麻黃則發汗動經也常氏云可小柴胡湯雍曰傷寒陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛先與小建中湯不差與小柴胡湯二藥可相須用也故龐氏又曰凡脈緊病必無汗唯濡而緊必有汗勿誤行



桂枝宜建中湯也

又曰少陰病脈微不可發汗亡陽故也

一作瀉而微弱

龐氏

曰汗則厥而煩躁不得眠常氏云可附子湯

又曰脈濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上瀉反在下微則陽氣不足瀉則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩瀉則無血厥而且寒陽微發汗躁不得眠
雍曰宜與小建中湯

又曰動氣在右不可發汗發汗則衄而渴心苦煩飲則吐水龐氏曰動氣者謂心腹中虛氣動若誤汗者

先服五苓散一服次服竹葉湯朱氏曰凡脈濡弱不可發汗諸動氣在心腹上下左右不可發汗諸脈動數微弱不可發汗皆宜小建中湯煩躁者宜竹葉湯雍曰諸動氣不可發汗者皆宜茯苓桂枝甘草大棗湯

又曰動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤龐氏曰此爲逆難治先服茯苓白朮散汗止續與小建中湯朱氏同雍曰汗不止筋惕肉瞤者皆亡失津液證不可茯苓湯也

又曰動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在心端
龐氏云李根湯主之朱氏同常氏云可奔豚湯

又曰動氣在下不可發汗發汗則無汗心中大煩骨

節苦疼目運惡寒食則反吐穀不得前一云穀不消化龐氏

云先服大橘皮湯得吐止服小建中湯朱氏同常氏

云可柴胡桂枝湯茯苓湯小半夏湯雍曰大橘皮湯

茯苓湯小半夏湯皆可用以止吐吐止而心中煩骨

節疼惡寒證不去者服柴胡桂枝湯後服小建中湯

又曰咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣欲絕手足

厥冷欲得蹶臥不能自溫龐氏云甘草乾薑湯主之

常氏曰咽中閉塞可小柴胡湯設經發汗吐血者柏

葉艾葉湯

金匱方

氣微厥逆蹶臥者可當歸四逆湯

又曰諸脈得數動微弱者不可發汗發汗則大便難

腹中乾

一云大便難胞中乾

胃燥而煩其形相象根本異源雍

曰宜小建中湯

又曰脈濡而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反

在下弦為陽運微為陰寒上實下虛意欲得溫微弦

為虛不可發汗發汗則寒慄不能自還常氏云可當



歸四逆湯

又曰欬者則劇數吐涎沫咽中必乾小便不利心中

飢煩晬時而發其形似瘡有寒無熱虛而寒慄欬而

發汗蹇而苦滿腹中復堅

一作蹇而心痛

常氏云可柴胡乾

薑桂枝湯小青龍湯理中丸雍曰脈經以上二證合

而爲一雍謂自欬者之下爲欬者劇證欬者之上爲

不欬未劇之證二證之脈皆濡而弱也欬證裏寒多

宜小建中湯理中丸附子湯微溫之

又曰厥脈緊不可發汗發汗則聲亂咽嘶舌萎聲不



得前雍曰厥陰經緊則引舌與卵故舌卷而囊縮若
緩則舌萎聲不得前故厥脈緊者不可發汗恐其脈
緩也厥脈緊者宜四逆湯緩者宜小建中湯或言宜
白虎小柴胡皆不可用

又曰諸逆發汗病微者難差劇者言亂目眩者死

云一

識語目眩
精亂者死

命將難全

又曰太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒
少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者
爲欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗

也常氏云可小柴胡湯雍曰亦宜先服小建中湯

又曰太陽病發熱惡寒熱多寒少

千金翼云寒多熱少

脈微弱

者此無陽也不可發汗常氏云可小柴胡湯雍曰亦

宜甘草乾薑湯

又曰咽喉乾燥者不可發汗常氏云可小柴胡湯

又曰亡血家不可發汗發汗則寒慄而振常氏云可

小柴胡加芍藥地黃湯

又曰衄家不可發汗汗出必額上陷脈緊急目直視

不能胸不得眠常氏云可犀角地黃湯



又曰汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰疼宜禹餘

糧丸

本闕方

常氏云只取一味禹餘糧石火煨末服之

亦可雍曰禹餘糧不用石殼此火煨末服則是殼也

又曰淋家不可發汗發汗必便血常氏云可猪苓湯

芍藥地黃湯

又曰瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則瘡常氏云可

小柴胡湯瘥者葛根桂枝湯雍曰更詳治瘥門中

又曰下利清穀不可發汗汗出必脹滿雍曰宜溫其

裏後隨證治之



又曰欬而小便利若失小便者不可發汗汗出則四肢厥而逆雍曰設誤發汗宜甘草乾薑湯當歸四逆湯

又曰傷寒一二日至四五日厥者必發熱前厥者後必熱厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗必口傷爛赤雍曰已見厥陰卷中厥論并問

又曰傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗常氏云可小柴胡湯

又曰傷寒頭痛翁翁發熱形象中風常微汗出自嘔

者下之益煩心中懊懣如飢發汗則致瘥身強難以
屈伸熏之則發黃不得小便灸則發欬唾常氏云可
小柴胡湯桂枝加葛根湯茵陳蒿湯小青龍湯雍曰
各隨證用之頭痛發熱汗出卽小柴胡湯心煩喜嘔
亦柴胡瘥而身強用桂枝加葛根湯不得小便而欬
唾則小青龍湯熏之發黃則茵陳蒿湯也

又曰太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胸
心下痞鞭者不可發汗當刺大椎第一間肺俞肝俞
發汗則讖語脈弦五六日讖語不止當刺期門

又曰太陽發汗因致瘥雍曰前本病云太陽病發汗太多因致瘥

又曰少陰病欬而下利讖語者此被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗也常氏云可桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯小便難者五苓散

又曰少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出者是名下厥上竭爲難治常氏云可芍藥地黃湯雍曰仍灸三陰交湧泉二穴三陰交難取湧泉尤奇



王叔和曰冬時發其汗必吐利口中爛生瘡

千金翼同

又曰汗出多熱發其汗亦堅雍曰堅字宜作痊前有云發汗太多因致痊也

又曰病人脈數數爲熱當消穀引食而反吐者以醫發其汗令陽氣微膈氣虛脈乃數也數爲客熱不能消穀胃中虛冷故令吐也常氏云可與小半夏湯温中湯

又曰傷寒四五日其脈沈煩而喘滿脈沈者病爲在裏不可發汗津液越出大便爲難表虛裏實久則譫

語常氏云可麻黃杏仁甘草石膏湯脈沈裏實讖語者調胃承氣湯

又曰傷寒有五皆熱病之類也同病異名同脈異經雖俱傷於風其人自有痼疾則不得同法其人素傷於風因復傷於熱風熱相搏則發風溫四肢不收頭痛身熱常汗出不解治在少陰厥陰不可發汗汗出讖語獨語內煩躁擾不得臥善驚目亂無精治之復發其汗如此死者醫殺之耳

出醫律

朱氏曰風溫不可

發汗宜萎蕤湯雍曰仲景以風溫濕溫爲傷寒四種

傷寒論卷八
壞病難經以濕溫爲五種傷寒皆屬傷寒也餘見風
溫本門

又曰傷寒濕溫其人常傷於濕因而中暍濕熱相薄
則發濕溫病苦兩脛逆冷腹滿又胸頭目痛苦妄言
治在足太陰不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛
所在身青面色變名曰重暍如此死者醫殺之耳
律朱氏曰白虎加蒼朮湯

又曰濕溫多汗其脈陽濡而弱陰小而熱
龐氏曰不當汗而強汗之則津液枯槁而死

可發汗五十八條

仲景曰大法春夏宜發汗龐氏作春宜汗

又曰凡發汗欲令手足俱周時出以熨熨然一時間
許益佳不可令如水流漓若病不解當重發汗汗多
必亡陽陽虛不得重發汗也

又曰凡服湯發汗中病便止不必盡劑也

又曰凡云可發汗無湯者丸散亦可用要以汗出爲
解然不如湯隨證良驗

又曰太陽病外證未解脈浮弱者當以汗解宜桂枝