

紅紫乾枯

紅紫乾枯者必發熱一日即見痘苗報出必稠密
大熱蒸蒸煩躁昏沉不省人事唇焦口干酒大便秘結
小水短澀又黃宜用敗毒和中散一加熟大黃以利
之看其出齊宜調元化毒湯七去參耆白加小川芎清
之即以清毒活血湯三催其長漿其一二壯多係逆漿不
汎起加之身熱煩躁譫語不愈必不可救也

淡紅

暈脚四圍淡紅有嬌嬌之色隱隱山部若紅色不定

將來必變淡白色此乃氣血俱虛荷或身不退熱
有煩躁初見痘苗之時寒涼之藥切不可用宜
和中散一去芩連紫草加羌活白芷蘇葉以托其苗
俟其出齊以內托散五催其長漿

焦紅

初見痘苗頂乃先焦根脚紅些若有芒角不見滋潤暈
脚不圓且帶紅紫乾枯初見痘苗急用敗毒和中散
一倍加芩連紫草俟其出齊清毒活血湯三催其長
漿熱不減不能食兼之神氏曰不省人事水漿不食則



不可救矣

鋪紅

痘無紅暈痘粒淡白通身皮肉盡紅故名鋪紅良由
毒火內盛氣不能統血散漫於皮膚之間宜十全大
補湯五十加白芍若人事昏沉則不救

淡白

痘之根腳四圍無一線紅色止見有淡白之痘蓋因
氣血兩虛或因大病之後初見痘苗宜溫中益氣湯
二托之俟其痘出齊卽用內托散五催其長漿

表虛十九

表虛者自汗汗多惡寒惡風或寒熱往來面青白手足冷脈浮細聲寒咳嗽鼻流清涕宜參蘇飲
當補失補則爲灰白頂陷癢塌倒靨等症

表實二十

表實者面赤唇紫皮乾膚燥遍身斑枯焦熱如火手足極熱脈數實大頭痛寒熱宜疎表表實當解失解則爲紅紫乾燥黑陷等症

裏虛二十一

表虛者困倦嗜臥不思飲食二便清利口鼻氣冷咳嗽無痰脈遲沉細吐瀉青色手足厥冷表虛而乘寒者也凡痘瘡倒靨吐瀉少食爲裏虛破爛灰白爲表虛二者用十二味異攻散二若止裏虛去桂表虛減肉豆蔻裏虛宜補不補則爲泄瀉不食氣冷漿清塌陷等症

裏實二十二

裏實者大便秘小便赤澀口渴氣熱煩躁不睡或胃悶昏睡唇烈咽乾舌燥有苔狂亂譫語裏熱當瀉不

近身要便 二十三 三

瀉則爲喘渴煩亂咽痛腹脹失血等症加之以妄補
恐生癰腫之禍

虛實二十三

虛實之辨必究其真不令有似是之誤斯爲盡善如
瘡色白而身涼者似虛合之于唇裂迸血非虛也類
解不食似虛合之于腹痛乾嘔非虛也羸瘦日久似
虛合之于氣雄壯熱非虛也寒戰咬牙似虛合之于
面赤燥熱黑硬乾痂非虛也痘色紅而時躁時熱者
似實合之于兩眼倦閉重語聲輕非實也便閉思飲



中醫藥大學圖書館藏

毒深必難救也然成婚之後腰痛者可療以其虛於
後天也若童子腰痛難治乃先天之水不足爲真虛
也腰疼胃爛兮一七定受災傷

發熱腹痛毒氣在內未出于外鬱于腸胃故也宜敗

毒和中散一去苓連紫草加羌活白芷主之或至

飲三少加柴胡倍用山查青皮木香按毒附外惟口

臭舌胎發斑而痛者卽胃爛症不治臍以上痛必鬱

熱蓄于心胸故痛宜鬱金陳反半夏桔梗川連山梔

玉竹木香香附厚朴白芷連翹心毒氣作病有作有

止或連腰痛色紅唇紫手足熱停食腹痛其痛多急
疾連綿痛在臍以上面白唇淡手足冷升消平胃散
主之

感冒風寒身體戰動而痛者升麻葛根湯

主之

自利清白而手足冷者虛寒也黃耆建中湯

加木

香青皮

既出稠密而痛者毒滯血瘀也用活命飲十次用四

物湯三加連翹丹皮牛蒡荆芥防風紅花

痘出齊腹痛者毒也兒多不能言但見腰足挺撞形

尖眉蹙知其肚痛山梔湯四十主之

身後疼屬膀胱羌活荆芥甘草主之

身前疼屬肺升麻葛根紫草主之

身側疼屬胆連翹防風湯九十主之

四肢疼屬胃防風白芍甘草主之恐叫號傷氣忍之

傷血也

食雞魚毒物而痛清胃散五十治之

痘粒高脊痛爲實乃吉兆也惟用生白芍三錢爲末

酒調下愈



有毒盛極深入骨髓不能發越多在于八九日間
從脚心痛起漸由兩腿骨中而上痛至心頭發一
笑而死痛未至心者可救急服降魔散二十
有痛如刀刺針刺痛極者涼血活血加木香以行氣
則愈

屬後腹痛者但此時胃虛傷食者痛在上手不可近
木香大安丸三調之痛在中喜用手摩原食少而便
順者虛寒也黃耆建中湯生之
中腕上臍痛熱毒凝滯瘀血作痛也消毒散血湯四十

主之

癰黑毒未出透腹痛甚用蟬退五十個去頭足洗
爲末每服一錢滾湯調下酒亦可其痛卽愈

癢二十五

初出之時身便作癢爬搔不寧者此毒火遊行肌肉
之間欲出不出遊散往來故作癢也升麻葛根湯一
加防風荆芥牛蒡主之或加紫背浮萍又有不能食
淡而致用蟬蛻十二個煎湯服之愈諸瘡爲竇諸瘡
爲虛又云氣愈虛而愈癢所以然者以氣本虛毒原

不熾氣虛則正不勝邪無以制化其毒而固然也
故治痒之法必從補氣用活血散二十加參者或有大
熱毒盛而痒者大相懸矣蓋熱毒壅於皮肉氣為遏
鬱血被煎熬痒之所以作也以清涼攻毒飲十減紅
花加大黃石膏生地以涼解之蓋虛則白實則紅
則嬌實則滯虛者皮薄而溼實者皮厚而燥觀形察
色種種各別或遍身痒甚抓破者不問前後皆服蟬
花散二十外以乳香敗荷葉茵陳燒烟燻之痒忌額
面眉目顴鼻之間此心肺有熱也急用甘桔湯六十



加牛蒡子別處抓破俱不爲害大抵痘初出而皮膚紅艷起發而皮多水多致痒塌自言其痒欲搔者古遍身痒甚搖頭扭項手足顛舞抓破不見膿皮捲起如豆殼乾者不治如痘乾而痒者宜養血而燥四物湯十三加防風黃耆荆芥牛蒡子升麻瘡濕痒者宜補氣除濕四君子湯二十加防風黃耆荆芥牛蒡子升麻如色淡神怯便清此氣血兼脾俱虛也宜內托散五外用茵陳白艾二味搗末燒紙裏燻之如紅紫煩躁大便堅實此邪氣內實正氣外虛也加

味回聖解毒湯

七百零七

主之外用升麻麻黃柳葉桑葉

煎湯乘熱拭之冬用細枝養漿時作痒者危症此時

多屬表虛用內托散

五

外用荆芥爲末紙裹指定痒

痘刺點痒處一下其驗如神又恐不能防其手搔須

令著絹衣袖長者縛其袖口使不得爬搔爲善如未

抓破者將花椒一兩滑石三兩共爲細末用絹袋囊

之摩按痒處能奪其痒有風痒因感冒風邪或半身

或四肢痒止一處是也以荆芥燒煙燻之有觸犯痒

痘必變色如慾氣經血葱蒜之類觸者變灰黑色或

煙煤香氣體氣糞穢之類觸者變粉白色統用平和

湯二十四主之如爬破以松花粉搽之或絲瓜連蒂

燒存性研末搽更妙敗草散蕎麥粉亦可如遍身

破皮脫肉乾疤黑全無血水此內攻外剝血散氣離

死候也得存幾粒好痘爬破處血水淋漓者以內托

散五倍參急救之猶可復起或能食大便堅抓破之

處復灌成膿原無痘處又續出一層贈痘亦可救若

服藥後破處不復腫貫此毒氣深入于裏不可爲矣

痘後發痒此血熱之症宜用黃芩黃柏紫草甘草力

子銀花生地紅花共煎湯搽之即愈

驚搐 二十六

痘欲出而未出或出而初見報痘一二顆忽然驚搐
抽掣眼目斜弔口鼻歪斜面赤唇紫聲大氣粗身熱
手足熱脈洪數此毒氣壅盛於內不能驟發於外宜
敗毒和中散一加熱大黃羌活白芷蘇葉主之有形
色多同前但聲重鼻塞或鼻流清涕脈浮緊而數此
毒盛而爲風寒所束也宜蘇解散五二十主之心經發
痘忽然發驚搐症與急驚風同用桃樹皮葱葉燈心

搗爛顙門肚臍及腳手掌心限一炷香爲度則驚搐
搐自醒痘卽出痘影淡白在皮膚之間不見紅活屬
淡面青白脈遲緩雖煩驚驚搐有似於熱其實因氣
血虛弱送毒不出者也宜溫中益氣湯二以托之小
兒體性怯弱或因吐瀉之後其元愈虧不能勝毒汗
出如珠四肢厥冷似腫非腫眼睛露白症同慢驚此
危候也急用大附子四錢丁香一錢乾姜四錢豆豉
三錢小雄雞一隻生用一同搗爛再用燒酒畧炒濕
卽敷臍上及二足底其痘自出