

御纂醫宗金鑑卷七

訂正仲景全書傷寒論註

辨少陰病脈證并治全篇

少陰腎經水火之藏邪傷其經隨人虛實或
從水化以爲寒或從火化以爲熱水化爲陰
寒之邪是其本也火化爲陽熱之邪是其標
也陰邪其脈沉細而微陽邪其脈沉細而數
至其見證亦各有別陰邪但欲寐身無熱陽
邪雖欲寐則多心煩陰邪背惡寒口中和陽



御纂醫宗金鑑卷七

訂正仲景全書傷寒論註少陰全篇目錄

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

附子湯

四逆湯

四通湯

白虎加豬膽汁湯

真元湯



北京中醫藥大學圖書館版權所有

通脈四逆湯

吳茱萸湯

四逆散

黃連阿膠湯

豬膚湯

甘草湯

桔梗湯

半夏散及湯

苦酒湯



桃花湯



御纂醫宗金鑑卷七

訂正仲景全書傷寒論註

辨少陰病脈證并治全篇

少陰腎經水火之藏邪傷其經隨人虛實或
從水化以爲寒或從火化以爲熱水化爲陰
寒之邪是其本也火化爲陽熱之邪是其標
也陰邪其脈沉細而微陽邪其脈沉細而數
至其見證亦各有別陰邪但欲寐身無熱陽
邪雖欲寐則多心煩陰邪背惡寒口中和陽



邪背惡寒則口中燥陰邪咽痛不腫陽邪咽
痛則腫陰邪腹痛下利清穀陽邪腹痛下利
清水或便膿血也陰邪外熱而色赤裏寒大
便利小便白陽邪外寒手足厥裏熱大便秘
小便赤此少陰標本寒熱之脈證也凡從本
之治均宜溫寒回陽從標之治均宜攻熱救
陰回陽救陰其機甚微總在臨證詳究辨別
標本寒熱以急施其治庶克有濟稍緩則不
及矣

少陰之爲病脈微細但欲寐也

註

少陰腎經陰盛之藏也少陰受邪則陽氣微故脈微細也衛氣行陽則寤行陰則寐少陰受邪則陰盛而行陰者多故但欲寐也此少陰病之提綱後凡稱少陰病者皆指此脈證而言也

集註

方有執曰少陰腎經也居於極下其脈起於小趾之下靈樞曰是主所生病者嗜臥但欲寐蓋人肖天地天地之氣行於陽則闢而曉

行於陰則闔而夜故人之氣行於陽則動而寤行於陰則靜而寐凡病人但欲寐者邪客於陰故也

張璐曰此言少陰之總脈總證也蓋少陰屬水主靜即使熱邪傳至其經在先之脈雖浮大此時亦必變爲沉細在先之證雖煩熱不寧此時亦必變爲昏沉嗜臥但須辨出脈細沉數口中燥爲熱證脈沉微細口中和爲寒證以此明辨萬無差誤矣

程應旂曰凡陰脈皆沉異乎太陽之浮不必言矣陽明脈大微者大之反少陽脈弦細者弦之反沉兼微細陰證定矣

少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯主之

註

少陰病謂但欲寐也脈沉者謂脈不微細而沉也今始得之當不發熱而反發熱者是爲少陰之裏寒兼有太陽之表熱也故宜麻黃附子細辛湯溫中發汗顧及其陽則兩感之



寒邪均得而解之矣

集註

方有執曰發熱邪在表也脈沉少陰位北

居裏也以其居裏邪在表而發熱故曰反也

以邪在表不在裏故用麻黃以發之以其本

陰而標寒故用附子以溫之細辛辛溫通於

少陰用之以佐主治者以其專經而爲向導

也

程知曰三陰表法與三陽不同三陰必以溫

經之藥爲表而少陰尤爲緊關故用散邪溫

經之剗俾外邪之深入者可出而內陽亦不因之外越也

程應旂曰一起病便發熱兼以陰經無汗
有計日按證者類能用麻黃而忌在附子不
知脈沉者由其人腎經素寒裏陽不能協應
故沉而不能浮也沉屬少陰不可發汗而始
得病時卽發熱則兼太陽又不得不發汗須
以附子溫經助陽托住其裏使陽不至隨汗
而越其麻黃始可合細辛用耳



林瀾曰傳邪與陰寒皆有沉脈沉但可爲病
之在裏而未可專以沉爲寒也夫少陰證中
微細而沉與細數而沉其爲寒熱之殊蓋大
有別矣

麻黃附子細辛湯方

麻黃

二兩
去節

細辛

二兩

附子

一枚炮去
皮破八片

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫
內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以
二三日無裏證故微發汗也

註

此詳上條少陰病得之二三日仍脈沉發熱

不解者宜麻黃附子甘草湯微發其汗也蓋

謂二三日不見吐利裏寒之證知邪已衰然

熱仍在外尙當汗之但不可過耳故不用細

辛而用甘草蓋于溫散之中有和意也此二

證皆未曰無汗非仲景畧之也以陰不得有

汗不須言也



集註

張璐曰少陰無發汗之法汗之必至亡陽惟

此一證其外有太陽發熱無汗其內不吐利

躁煩嘔渴乃可溫經散寒取其微似之汗也

程應旆曰旣云微發汗矣仍用以字故字推

原之足見鄭重之意按此二條與太陽篇發

熱頭痛脈沉用四逆者同一證彼以不差則

期過三日可知病已入裏雖尙冒太陽頭痛

直以少陰法律之此少陰病在初得二三日

雖無頭痛證不容竟作少陰治之故仍兼太

陽之法以律之一出一入不啻爰書假令前
條得之二三日後二條過二三日不差則四
逆之與麻黃易地皆然矣

汪琥曰上條反發熱脈沉此亦反發熱脈沉
但上言始得之為急此言得之二三日為緩
病勢稍緩治法亦緩

麻黃附子甘草湯方

麻黃

二兩
去節

附子

一枚炮去
皮破入片

甘草

二兩
炙



右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫
內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服
集解柯琴曰彼太陽病而脈反沉便用四逆以急

救其裏是裏寒陰盛也此少陰脈而表反熱
便於表劑中加附子以預固其陽是表熱陽
衰也夫以發熱無汗太陽之表脈沉但欲寐
少陰之裏設用麻黃開腠理細辛散浮熱而
無附子以固元陽則太陽之微陽外亡惟附
子與麻黃並用則寒邪散而陽不亡此裏病



及表脈沉而當發汗者與病在表脈浮而發汗者逕庭也若表微熱則受寒亦輕故以甘草易細辛而微發其汗甘以緩之與辛以散之者又少間矣

少陰病脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱濇者復不可下之

註

少陰病脈微雖有發熱亦爲少陰裏寒外熱非太陽發熱者可比故不可發汗發汗則亡陽然陽已虛津液已涸卽見少陰口燥咽乾