

明醫雜著卷之二

薛氏醫按

鄞 王節齋集 吳郡薛

已註

新 都 吳中珩校

泄瀉

泄本屬濕然多因飲食不節致傷脾胃而作須看
時令分寒熱新久而施治治法補脾消食利小便
亦有升提下陷之氣用風藥以勝濕亦有久泄腸
胃虛滑不禁者宜收澀之

主方

白朮 二錢

白茯苓

白芍藥

炒各一錢五分已上
三味乃泄瀉必用者 陳皮 一錢

甘草 炙

五分

若傷食瀉黃或食積加神麴麥芽山查

各一錢

黃連

炒七分

若腹中窄狹再加厚朴枳實以消停滯

愚按前症若飲食已消而泄瀉未止此脾胃之氣傷也宜用五味異功散若泄瀉而腹中重墜此脾胃之氣下陷也宜用補中益氣湯若服尅滯之劑而腹中窄狹此脾氣虛痞也宜用六君

子湯若脇脹少食善怒瀉青此脾虛肝所乘也
宜六君子加柴胡升麻朮香若少食體倦善噫
泄黃此脾虛色陷也宜用六君子加升麻柴胡
大凡諸症若脾脈弦長者肝木乘脾土也當補
脾平肝若脾脈沉弦者寒水侮脾土也當溫中
補腎夫黃連枳實雖消停滯開痞悶若人脾胃
充實暴患實痞宜暫用之若人屢患屢服或脾
胃虛痞者而用之則脾胃反傷而諸症蜂起矣
故東垣先生云脾胃實者用黃連枳實瀉之虛

者用白朮陳皮補之須分病之虛實人之南北而治之後倣此

若小便赤澀短少加猪苓澤瀉

各一錢

以分利之夏

月加茵陳

七分

山梔仁

炒四分

愚按前症若津液偏滲於大腸大便瀉而小便少者宜用此藥分利若陰陽已分而小便短少者此脾肺氣虛而不能生水也宜用補中益氣湯加麥門五味陰火土炎而小便赤少者此肺氣受傷而不能生水也用六味地黃丸加麥門

五味腎經陰虛陽無所生而小便短少者用滋
腎丸腎氣丸腎經陽虛陰無所化而小便短少
者用益氣湯六味丸若誤用滲泄分利復傷陽
氣陰無所生而小便不利或目睛凸出腹脹如
鼓或腿膝腫硬或皮膚斷裂者先用滋腎丸益
氣湯每見元氣虛而復用澤瀉猪苓之類因損
真陰以致前症益甚者急投金匱加減腎氣丸
多有復生者若反服牽牛大黃峻劑而通之是
速其危也

若口渴引飲加乾姜

一錢五分

人參麥門冬

各一錢

升麻

四分烏梅肉

五箇

愚按前症若胃氣傷而內亡津液者用七味白
朮散胃氣弱而津液少者用補中益氣湯氣血
俱虛而津液少者用十全大補湯腎虛津液短
少者用六味地黃丸腎水不足而虛火上炎者
用加減八味丸若腎水不足之人患泄瀉或服
分利之濟過多而患口渴者若不用前藥以固
其本源則肺腎復傷矣變小便利肚腹水腫

等危症矣○憲副屠九峯先瀉而口渴尺脉數
而無力恪用解酒毒利小便之劑不應余曰此
腎陰虧損虛火熾盛宜急壯水之主不然必發
疽而不能收斂也不信別服降火化痰之劑果
患疽而歿

若夏秋之間濕熱大行暴注水瀉加黃連蒼朮澤

瀉

各一錢黃疸小便赤加茵陳

一錢山梔木通

各五分

愚按東垣云若值秋燥行令濕熱少退體重節
痛口舌乾燥飲食無味二便不調不欲飲食或

食不化兼灑淅惡寒悽慘面惡此肺之脾胃虛
而陽氣不伸也用升陽益胃湯治之前症若濕
熱內作脾胃不能通調而致者宜用此藥分利
之濕熱已去脾胃虛弱而致者宜用六君子當
歸調補之濕熱已去脾氣下陷而致者宜用補
中益氣湯升舉之其黃疸若小便不利四肢沉
重渴不欲飲此濕勝於熱用大茵陳湯大便自
利茵陳梔子黃連湯若往來寒熱身黃者宜用
小柴胡加梔子若因勞傷形體飲食失節而身

黃者用小半夏湯蓋黃疸爲內傷不足之症宜
調補脾胃元氣爲主若妄用驅逐復傷元氣多
致不起

若久瀉脾胃虛弱飲食難化加黃芪灸各錢人參各錢

神麴麥芽各一錢二分木香煨乾姜灸各五分

愚按前症或作嘔或飲食少思屬脾胃虛弱用
四君子加半夏木香或兼作嘔或腹作痛屬脾
胃虛寒用六君子加炮姜木香若麥芽善損腎
神麴善化胎消腎不宜輕用大抵此症多由泛

用消食利水之劑損其真陰元氣不能自主持
遂成久泄若非補中益氣湯四神丸滋其本源
後必胸痞腹脹小便淋瀝多致不起

若久泄腸胃虛滑不禁加肉豆蔻訶子皮赤石脂

各一錢
木香煨 乾姜炙各五分

愚按東垣先生云中焦氣弱脾胃受寒冷大便秘
滑瀉腹中雷鳴或因誤下未傳寒中復遇時寒
四肢厥逆心胃絞痛冷汗不止此腎之脾胃虛
也用沉香溫胃丸治之竊謂前症若脾胃虛寒

下陷者用補中益氣湯加木香肉豆蔻補骨脂
若脾氣虛寒不禁者用六君子湯加炮姜肉桂
若命門火衰而脾土虛寒者用八味丸若脾腎
氣血俱虛者用十全大補湯送四神丸若大便
滑利小便閉澁或肢體漸腫喘嗽唾痰爲脾腎
氣血俱虛宜用十全大補湯送四神丸若大便
滑利小便閉澁或肢體漸腫喘嗽唾痰爲脾腎
虧損宜用金匱加減腎氣丸

若飲酒便泄此酒積熱瀉也加黃連炒茵陳乾姜

各一錢
木香五

愚按前症若酒濕未散脾氣未虛宜用此藥分
利濕熱若濕熱已去中氣被傷宜用六君子調
補中氣若誤服剋伐分利之劑胸膈漸滿小便
短少或腿足與腹漸腫者急用加減金匱腎氣
丸調補脾胃多有生者夫酒性大熱乃無形之
物無形元氣受傷當用葛花解醒湯分消其濕
往往反服大熱酒癰丸重瀉有形陰血使陽毒
大旺元氣消亡折人長命金匱要畧云酒疸下

之久而爲黑疽每見善飲服酒癰九者多患疽
症不悟其因反服分利化痰以致變症而歿者
多矣

詳見奇效方

○秀水卜封君善飲腹痛便泄服

分利化痰等劑不應其脉滑數皮膚錯甲余謂
此酒毒致腸癰而潰敗也辭不治不信仍服前
劑果便膿而歿○光祿柴黼菴善飲泄瀉腹脹
吐痰作嘔口乾余謂脾胃氣虛先用六君子加
神麴痰嘔已止再用補中益氣加茯苓半夏瀉
脹亦愈○舊僚錢可久素善飲面赤痰盛大便

不實余以爲腸胃濕痰壅滯用二陳芩連山梔
枳實其葛澤瀉升麻一劑吐痰甚多大便始實
此後日以黃連三錢炮湯飲之而安

若寒月溘泄清冷腹痛傷生冷飲食加神麴麥芽

炒

乾姜

灸各一錢

縮砂益智木香

各七分

愚按前症若脾腎虛寒宜用四神丸若脾腎虛
脫用六君姜桂如不應急補命門火以生脾土

○一儒者小腹急痛溘泄清冷大便欲去不去
余謂此命門火衰而脾土虛寒也用八味丸月

餘而愈向後飲食失宜前症仍作小腹重墜此
脾氣下陷也用補中益氣湯而痊

痢疾

痢是濕熱及食積治者別赤白青黃黑五色以屬
五臟白者濕熱傷氣分赤者濕熱傷血分赤白相
雜氣血俱傷黃者食積治法瀉腸胃之濕熱開鬱
結之氣消化積滯通因通用其初只是下下後未
愈隨症調之痢稍久者不可下胃虛故也痢多屬
熱然亦有虛與寒者虛者宜補寒者宜溫年老及

虛弱人不宜下

主方

甘草

炙三分

檳榔

錢一

木香

枳殼

炒各五分

黃芩

炒

黃連

炒各五分

白芍藥

炒二錢已上三藥痢疾必用者

右姜水煎服

若腹痛加當歸

一錢五分

縮砂

錢一

再加木香芍藥

各五分

愚按前症若因濕熱鬱結後重不利宜用此方

若飲食停滯用二陳湯加山查送香連九仲景

先生云脉沉而有力者屬裏實也宜下之沉而

無力者屬裏虛也宜補之元氣虛滑者宜溫之
澁之脉滑而數者有宿食也當下之脉浮大此
爲虛而強下之故也脉浮革者因而腸鳴當溫
之下痢腹堅者當下之下痢譫語有燥屎當下
之下痢三部脉皆平按之心下堅急下之下痢
脉大浮弦當自愈下痢腹滿痛爲實當下之治
者審焉

若後重加滑石

炒五分

再加枳殼檳榔芍藥條芩各

五分