

婦女科醫家必究杏苑生春八卷下

○總說

夫女子十四歲。天真之氣降。壬癸之水合。衝任脉盛。月事以時。下是有形之後。猶有待於乳哺。水穀以養陰氣。必近二十方可與陽氣爲配。可見陰氣之難於成也。調經之道。貴乎耗其氣以行其血。血盛氣衰。是爲之從從。則百病不生。孕育無損矣。蓋衝任二脉。皆起於胞內。爲經絡之海。手太陽小腸。手少陰心之經也。此二經爲表裏。主上爲乳汁。下爲月水。經水者。陰血也。陽必從陽。故其色紅。稟火色也。血爲氣之配。氣熱則熱。氣寒則寒。氣升則升。氣降則降。氣凝則凝。氣滯則滯。氣清則清。氣濁則濁。氣行則行。氣亂則亂。往往見其成塊者。皆氣之凝也。將行而痛者。氣之滯也。來後作痛者。氣血俱虛。色淡者亦虛也。錯經。安行者。

氣亂也。紫者氣之熱也。黑者熱之甚也。或見以紫黑者作痛成塊者。率指爲風冷。殊不知經曰。亢則害。承乃制。熱盛者必兼水化。所以熱則紫盛則黑也。况婦人性執。而見鄙嗜欲。加倍臟腑厥陽之火。無日不升。非熱而何。取之。月經者。爲其一月一次。而有常也。參前者血熱也。遲後者血澁也。且經行之際。與產後一般。將理失宜。爲病不淺。若被驚則血氣錯亂。經水斬然不行。逆於上。則從口鼻出。逆於身。則爲血分勞瘵之疾。若其時勞力太過。則生虛熱。變爲疼痛。恚怒則氣逆。氣逆則血逆。逆於腹腿心腹背脇之間。遇經行時。隨處而痛。過期又安。怒極傷肝。則有眩暈嘔吐之症。加之經脉滲漏於其間。遂成竅穴淋瀝不已。崩中帶下。赤白淋濁。形體瘦弱。自汗潮熱。月水絕閉。七癥八瘕。可立而待。其諸病候。悉與男子治法相同。惟調經胎產崩中帶下。爲

異是故另立女科。然亦不能盡聖人之法者。爲豪足之家。居奧室之中。處幃幔之內。復以帛幪。手臂既不能行。望色聞問之神。又不能殫切脉之巧。有是闕焉。於能盡其術也。黃帝有言。凡治病。察其形色。若色澤。形氣相得。謂之可治。色夭。形氣相失。謂之難治。又云。觀人勇怯。骨。肉。皮。膚。能知其情。方爲診法。既不得見其形聲。止據脉供藥。其可得乎。此醫之通患也。世不能革。醫者不免。盡理質問。病家見所問繁。反爲醫藥不精。往往得藥。亦不肯服。似此甚多。商鵲見齊侯之色。尚不肯信。況其不得見者乎。日其嗜慾多於男子。感病倍於大夫。加之慈戀。愛憎嫉妬。憂。淫。染着。堅牢情不自抑。所以爲病根深勢篤。故難療治。又有寡婦。獨陰無陽。處閨門。慾心萌而不遂。致陰陽交爭。乍寒乍熱。有類瘡疾。或經閉。白淫。痰逆。頭風。膈氣。否悶。面黧。瘦脊。甚則爲勞。其

脉獨部弦出寸口而上魚際。究其脉原其疾皆血盛而然。經云男子精盛則思室。女子血盛則懷胎失遂。其意男則神色先奪。女則月水絕閉。觀其精血思過半矣。其問証候與男子治法稍異者。謹錄於後。

〔治〕血氣攻症。心腹疼痛。以玄胡索散治之。

〔方〕玄胡索散

玄胡索

當歸

川芎

桂心

木香

赤芍藥

枳殼

桃仁

各一錢

熟地黃

三錢

右咬咀。水二鍾。薑三片。煎一鍾。不拘時服。

〔治〕血風身體疼痛。頭昏發熱。煩渴自汗。以人參荊芥散主之。

〔方〕人參荊芥散

赤芍藥

柴胡

牡丹皮

鱉甲

荊芥

羚羊角

醃酸枣仁 枳殼

生地黃 人參

白朮

各七分

肉桂

三分

當歸

七分

防風

甘草

各五分

川芎

七分

生薑

三片

右咬咀。水煎八分。不拘時服。

治

一切血氣不足。虛損羸乏。或自汗腹疼。以當歸建中湯主之。

方

當歸建中湯

白芍藥

四錢

桂枝

二錢

甘草

炙七分

當歸

三錢

生薑

五片

枣子

三枚

飴糖

少許

右咬咀。水煎熟。食前熱服。

治

血氣虛冷。時發刺痛。寒熱往來。以異攻散主之。

方

異攻散

牡丹皮

芍藥

白芷

乾薑

當歸

玄胡索

陳皮

各七分

官桂

四分

烏藥

川芎

桔梗

各八分

生薑

三片

右咬咀。酒一鍾。水一鍾。煎八分。食前熱服。

〔治〕七情所感。血與氣併。心腹疼痛。或健腰脇。以玄胡索湯主之。

〔方〕玄胡索湯

玄胡索

七分

當歸

一錢

二分

蒲黃

八分

赤芍藥

一錢

薑黃

六分

官桂

木香

各五分

乳香

甘草

炙

沒藥

各四分

生薑

三片

如唾逆加半夏

八分

橘紅

一錢

右咬咀。水煎八分。食前熱服。

〔治〕血嘈痰嘈。心下洋洋。嘈雜腸鳴多睡。口中清水。脇肋脹痛。以

旋覆花湯主之。

〔方〕旋覆花湯

旋覆花 一錢 細辛 七分 橘紅 一分 官桂

甘草 各四分 赤茯苓 人參 半夏 各五分

桔梗 五分 白芍藥 六分

右咬咀。用生薑七片。水煎熟。食前服。

〔治〕血氣疼痛。或吐瀉腹滿。以鹽煎散主之。方見四卷內。

〔治〕血海疼痛。以烏藥湯。

〔方〕烏藥湯

當歸 二錢 甘草 炙 木香 各五分 烏藥

香附子 各一錢五分

右咬咀。水煎熟。食前溫服。

〔治〕血風走注。疼痛不常。以虎骨散主之。

〔方〕虎骨散

虎骨

酥炙

敗龜板

醋炙

肉桂

當歸

牛膝

玄胡索

熟地黃

威靈仙

漏蘆

自然銅

煨醋淬七遍各等分

右件依法製度為細末每服二錢熱酒調下。

〔病〕四肢沉重自汗上至頭際頸而還惡風頭疼躁熱以黃芪白

朮湯主之。

〔方〕黃芪白朮湯

黃芪

一兩

吳茱萸

川芎

各五分

柴胡

升麻

黃蘗

酒洗

甘草

炙

羌活

各一錢

當歸

一錢五分

五味子

三錢

白朮

人參

各五分

細辛

三分

右咬咀用生薑二十片水煎食前服分作四服。

〔病〕十月霜冷後四肢無力沉重痠痛醋心合眼麻木惡風寒關

目不麻木頭眩暈近火則有之以溫經除濕湯主之

七卷

〔病〕

勞熱羸瘦四肢煩疼心燥口乾不欲飲食以黃芪地骨皮散或犀角柴胡散。

〔方〕

黃芪地骨皮散

黃芪 一錢二分

地骨皮

柴胡

赤芍藥

生地黃

麥門冬

當歸

赤茯苓

黃芩

各八分

人參 一錢

甘草

炙五分

右咬咀用生薑五片水煎食前服。

〔方〕犀角柴胡散

犀角

赤芍藥

地骨皮

麥門冬

各七分

紅花

甘草

赤茯苓

枳殼

各五分

人參 七分

柴胡

黃芪 各一錢

右咬咀。用生薑三片。水煎食前服。

〔病〕脚氣感發兩脚浮腫小便赤澀腹脇脹滿氣急坐臥不得以

桑白皮散。

〔方〕桑白皮散

桑白皮

郁李仁

赤茯苓 各一錢

木香

防已

大腹皮

紫蘇

木通

檳榔

青皮 各八分

右咬咀。用生薑三片。水煎食前服。

〔治〕寒熱經水適斷熱入血室發狂不認人以牛黃膏或小柴胡

湯 方見三卷內。

〔方〕牛黃膏

牛黃

五分

辰砂

鬱金

各六分

龍腦

甘草

生各二分

牡丹皮

六分

右件依法製度各另研為末和勻煉蜜為丸如皂角子大每服一丸新汲水化開不拘時服。

治水氣乘肺作喘及支飲而喘以神秘湯主之

方見六卷內

病經水弱少四肢懶倦自汗微熱以滋血補氣湯

方滋血補氣湯

丁香末

甘草稍

生

甘草

炙各三分

白芍藥

生地黃

全蠍

各五分

熟地黃

六分

當歸身

人參

防風

羌活

黃蘗

知母

升麻

各七分

柴胡

一錢

黃芪

一錢五分

五味子

三十枚

右咬咀水煎熟空心溫服。

病月經衰少。或閉不行。面黃倦怠。腹脹喘逆。或膨或退。此血不足。必日輕夜甚。以當歸散主之。方見六卷內。

病月水往來。及胎產瘀血不散。成脹腹中覺疼滿悶。以散血消脹湯主之。方見六卷內。

治臟燥。悲傷欲哭。如喪神守。以麥棗湯主之。男子間有患此。
方麥棗湯

甘草 一面

大麥 三合去糠

膠棗 五枚

右件如常煎湯頓服。

治寡婦尼僧。惡風體倦。乍寒乍熱。面赤心煩。或時自汗。肝脉弦長。當抑陰氣。以生地黄丸。

方生地黄丸

赤芍藥 一面

生地黄 二面

比柴胡

黃芩

秦艽 各五

錢

右件依法製為細末煉蜜為丸。如梧桐子大每服三十丸為梅湯食前送下一日三服。

病婦文與鬼交通者由臟腑虛弱神不守舍以風邪鬼魅乘虛而入故鬼氣得為病也其狀不欲見人如有對悟時獨言笑或時悲泣脉息遲伏或如鳥啄或來綿綿不知度數而顏色不變是也以茯神散主之。方見六卷內。

治心脾血氣痛以葱白散。

方葱白散

川芎

當歸

枳殼

厚朴

桂心

乾薑

赤芍藥

小茴香

青皮

苦練子

熟地黃

木香

麥蘖

神麴

三稜

蓬朮

人參

各六分

鹽 五分 葱白 連鬚二根

右咬咀。水煎。若大便閉結。加大黃。去鹽。大便自利。加訶子五分。不拘時服。

病經水適斷。寒熱如瘧。頭疼咳嗽。惡心欲吐。穢逆不已。並以黃龍湯。

方蓄龍湯

柴胡 一錢五分

黃芩

人參

川芎 各一錢

白朮 八分

甘草 一分 橘紅 一錢 竹茹 栗大一團

右咬咀。用生薑五片。枣子一枚。水煎。食遠服。

如不嘔。去竹茹。

石月經斷後。身熱譫妄。日晡尤甚。以柴胡地黃湯。主之。為愈。見方

病神思昏憤。每日上午不得清爽。怕見明處。惡聞人語。至午後方可。常常腹疼。頭亦昏重。睡臥驚惕。但加之勞動。或值月經來時。其症尤劇。此為不得遂意之所致也。主乎血虛。以清神養榮湯主之。

方清神養榮湯

川芎

當歸 各一錢五分

白芍藥

熟地黃

人參

茯神 各一錢

橘紅

柴胡

羌活

甘草 炙

香附子 各五分

如心下不寬。加縮砂仁

七枚

白芷冠 三分

如有痰。加南星半夏。

俱薑製。各五分

如氣升。加沉香磨濃汁加入。

右咬咀。水煎熟。食前溫服。

治血虛榮損以四物湯為婦人之要藥當隨症加減合宜而用之也。方見三卷內。

○月經不調

夫衝為血海任主胞胎腎氣全盛二脉流通經血漸盈應時而下所以謂之月水者平和之氣常以三旬一見以像月盈則虧不失常度故謂之月經也若遇經行最宜謹於將理將理失宜似產後一般受病輕為宿疾重可死矣若勞傷氣血致體胃虛弱外為四氣所干內為七情所鬱則或前或後或色不正或錯經妄行蓋參前者氣熱而速也遲後者氣滯而澁也紫黑者氣熱也色淡者氣虛也將行而痛者氣滯也來後作痛者氣血俱虛也錯經妄行者氣亂也成塊而下者氣凝也治法熱則清之虛則補之亂則調之凝則散之必少佐辛熱以舒其鬱熱雖清

之必用火酒二製此反佐之法乃寒因熱用也。

○脉症備說

脉經曰寸口脉微而濇微則衛氣不足濇則榮氣無餘衛不足其息短其形燥榮不足其形逆榮衛俱虛語言謬誤。

太陽脉微而濇微則胃氣虛虛則短氣咽噪口苦濇則失液。

少陰脉微而遲微則無精遲則陰中寒澁則血不來此乃居經

三月一至。

脉微者氣血俱虛年少者亡血乳子下利者庶幾否則亦為居

經三月一至。

脉微弱而濇年少得此為無子中年得此為絕產。

寸口脉沉而遲沉則為水遲則為寒寒水相搏。

病月候不調或多或少不已或過期不行小腹疼痛並以大溫經湯